ଇକ୍ୱାଏସନସ

ଡ଼ାୟନୋଟେଫ୍ୟୁରାନ 15% + ପାଇମେଟ୍ରୋଜିନ 45% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଜି. କୀଟନାଶକ

ଡ଼ାୟନୋଟେଫ୍ୟୁରାନ 15% + ପାଇମେଟ୍ରୋଜିନ 45% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଜି. ପାଣିରେ ଗୋଳି ହୋଇ ଯାଉଥିବା ଦାନା ସୁଷ୍ଠୁ ଫର୍ମୁଲେସନ ଯାହାକି ସଂସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ଆନ୍ତରପ୍ରବାହୀ କୀଟନାଶକ। ଏହା ଟ୍ରାନସ୍‌ଲେମିନାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା କାଜ କରେ। ଏବଂ ଏଟି ଧାନ ସଫଲରେ ବାଦାମୀ ଏଫିଡ (ନିଲୋପର୍ବତା ଲୁଜେନ), ସାଦା-ବ୍ୟାକଡ ଏଫିଡ (ସୋଗାଟେଲା ଫୁରସିଫେରା), ସବୁଜ ପତାର ଏଫିଡ (ନେଫୋଟେଟିକସ ଭାରିସେଟେନସ) ଏବଂ ଧାରର କାନର ମାଥାର ପତ୍ର (ନେଫୋକୋରିସ ଅକୁଟା) ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅସରପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ପରି ଏହା ମହୁମାଛି ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏହା ମାଛ ଏବଂ ଜଳଜନ୍ତୁ ପ୍ରଜାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ ଅଟେ। ଏହି ଲେବଲ/ପତ୍ରିକାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରାଯାଇଥିବା ଫସଲ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଫସଲରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ।

ଉପଯୋଗ

ଫସଲ	କୀଟର ନାମ	ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ମାତ୍ରା ସ.ଦଷ୍ଟ (ଗ୍ରାମ୍/ହେକ୍ଟର)	ସ୍ପ୍ରେକୃତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ (ଗ୍ରାମ୍/ହେକ୍ଟର)	ପାଣିର ମାତ୍ରା (ଲି./ହେକ୍ଟର)	ଅନ୍ତିମ ଛିଡ଼କାବ ତଥା ଫସଲ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ (ଦିନ)	ପୁନଃ ପ୍ରବେଶର ଅବଧି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛିଡ଼କାବ ପରେ (ଘଣ୍ଟା)
ଧାନ	ଧୂସର ବାଦାମ ଫସଲ ନକ୍ସ କରୁଡ଼ିଆ କୀଟ (ନିଲାପର୍ବତା ଲୁଗେନସ୍), ଧାନ ବାଦାମ କୀଟ, (ସୋଗାଟେଲା ଫୁର ସିଫେରା) ଏବଂ ସାଉଥ ଗ୍ରୀନ ବଗ (ନେଫୋଟେଟିକ୍ସ ଭାରିସେଟେନସ) ଏବଂ ରାଇସ ଇୟର ହେଡ ବର୍ମ କୀଟ (ଲେପ୍ଟୋକୋରିସା ଅକୁଟା)	200	333	500	24	-

ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ: ସିଞ୍ଚନ ଉପକରଣ:

ପ୍ରୟୋଗ ସମୟ: କୀଟପୁଞ୍ଜିକର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅର୍ଥିକ ସ୍ତର ଉପରେ (ଇଏଟିଏଲ୍) ଦେଖାଗଲେଇ ବୁଦ୍ଧସ୍ତ ଷ୍ଟେ କରନ୍ତୁ।

ସତର୍କତା:

1. ଖାଦ୍ୟସାମଗ୍ରୀ, ଖାଦ୍ୟ ଗଚ୍ଛିତିଆ କାରକନ୍ତୁପର, ଏବଂ ପଶୁଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେ ରଖନ୍ତୁ।
2. ମୁହଁ, ଚକୁ ଏବଂ ଅଣିପୋଷୁ ଏହା ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ।
3. ଷ୍ଟେ କରିସାବିବା ପରେ ବୁଣ୍ଡିକ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶରୀରର ସଙ୍ଗକୁ ପରିଷ୍କାର୍ ଲାଗେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
4. ଷ୍ଟେ କରୁଡ଼ିଆ ସମୟରେ ଧୂମପାନ, ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଏବଂ ଚୋବିଥିବା ଚିବିବା ପାଟିରେ ଗୋଟେରକମ ନିଷେଧ।
5. କୀଟନାଶକକୁ ମିଶାଇବା ଏବଂ ଷ୍ଟେ କରିବା ସମୟରେ ଫୁଲ ହାତ ଠିକ ମାସ୍କ, ଚଷମା, କେମିକାଲ ରେପିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ଲୋଭ୍‌ସ, ବୁଟ୍‌ସମ୍ବା, ଚଷମା, ଗୋଡି ଲବଣ୍ଟି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ।

ବିଷାକ୍ତତାର ଲକ୍ଷଣ: ଚଳନ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିବା, ଅତ୍ୟଧିକ ଦୂର୍ବଳତା, ମିଓସିସ୍, ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଳ ଚଢ଼ିବା, ଜାଡ଼ିପିନିଆ, ଡ଼ିସ୍ପନିଆ, ମାଂସପେଶୀ ଫଟୁତନ, ଅତି ଏବଂ ଚକୁରାଲେ ବୁଜନ, ବର ବ୍ରଙ୍ଗର୍, ନାଲି ରଙ୍ଗର ପରିସ୍ରା, ଝର୍ଣ୍ଣ ଜଡ଼ିବାଲେ ହାଇପୋଥେମିକ, ଏରିଥିମା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖା ଦେଇପାରେ।

ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା:

1. **ଯଦି ଖିଆଯାଏ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା:** ବିଷାକ୍ତତାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ଏବଂ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପାଣିରେ ଭୁଲି କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଅଧିକାଂଶ 1 କିମ୍ବା 2 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। କଖିଣ୍ଡ ଦେହୋପରି ହୋଇଥିବେ ବାନ୍ତ କରାଇବେ ନାହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଷାକ୍ତତାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ଯେବେ ସମୟ ଯାଏଁ ବିଷାକ୍ତତାର ନ ଅସିଥିବେ ଯେବେ ସମୟ ଯାଏଁ କଖିଣ୍ଡକୁ ଖାଇ ବରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
2. **ଶ୍ୱାସ ନିଏଇଲେ:** ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସହ ଝିଅଇକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡ଼ୋକ୍ଟର ଖୋଜାକୁ ଖୋଜା ଯତନକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣାଦ୍ୱାରେ ଜରୁରୀକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଡ଼ୋକ୍ଟର୍ଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ବା ମୂଝିଛନ୍ତେ ବି ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଇଁରେ କୃତ୍ରିମ ନିଶ୍ୱାସ ଚଳନ ପାଇଁ ପୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେହୋ ଡ଼ୋକ୍ଟର ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।
3. **ତ୍ୱଚା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ:** ତ୍ୱଚା ଘଷି ଦିଆଯିବେ ଦୂଷିତ ଲାଗନ୍ତୁ ସାବୁନ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଜଳରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦରଦ, ଚକନ ବଢ଼ିଗଲେ, ଜଳି ଉଠିଗଲେ, ଚକନ ଲଗାତାର ଚେଷ୍ଟାକରେ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଦୂଷିତ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଅଲଗା କରି ସାବୁନ ଏବଂ ପାଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
4. **ଆଖି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ:** ଆଖିକୁ ଭଲିଗଲେ ଅତି କମସ୍‌କମ୍ 15 ମିନିଟ୍ ପାଣିକୁ ସଫା ପାଣିରେ ଧୁଅନ୍ତୁ। ଦରଦ, ଚକନ ଏବଂ ଆଖି ଲାଲ ହୋଇଥିବା, ଅପହ୍ନ ଚେହେଲେ ଆଖି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।

ଲହିବ ବିଷାକ୍ତତା:

ବିଷାକ୍ତତାର: ଜୈବିକ ବିଷାକ୍ତତା ପ୍ରତିବିଷ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ।

ବୀଜଦାନ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା:

1. ସର୍ବାଧିକକୁ ପ୍ରଚୁରଶମ୍ବୁଣ କରିବା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷ, ଚରାଣିଖାଦ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ/ଚରାର୍ଣ୍ଣ, ଘରେଇ ପ୍ରଫ କରିବା ଏବଂ ଖାଲି ବୃକ୍ଷବୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗିଥିବ ସୁରକ୍ଷିତ ଛାଡ଼ିଲେ କରନ୍ତୁ।
2. ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ବୃକ୍ଷ/ପ୍ୟାକେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଲାଇ ପିଙ୍ଗିବା ଅନୁଚିତ୍।
3. କୀଟନାଶକ ବୃକ୍ଷ/ପ୍ୟାକେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି କରି ଜନସମୂହରୁ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଗାଡ଼ି ଦିଆଯାଇ ପୁରାଇ ମାଟି ତିରରେ ଗୋଡି ଦେବା ଉଚିତ୍।

ଫୁଡ୍‌ସ କରି ବହିବା ପ୍ରଣାଳୀ:

1. କୀଟନାଶକ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗାମ ସ୍ଥାନରୁ ଖାଦ୍ୟ ମିନିଷ ଫୁଡ୍‌ସ କରି ରଖିବା ଘୋଟର୍ସରୁ ବା ଘରେ ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷ ଘୋଟର୍ସରେ ନିମ୍ନ ଗାଲା ଦେଇ ଅଲଗାଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍। ଅତିରୁ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଲାଭ, ପ୍ରଚୁରଙ୍କୁ ଓ ଗିଲାମନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ।
2. କୀଟନାଶକ ଫୁଡ୍‌ସ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଭଗଦ୍ଧାରେ କରାଯାଇଥିବା ଘୋଟର୍ସ ବା ଜାଲ୍ଲ ମନବୁଦ, ଶୁଖିଲା ଏବଂ ବାୟୁ ଚଳନ୍ତ ହେଉଥିବା ଜାଗିହ ଏବଂ ସେହି ଘୋଟର୍ସରେ ପର୍ଯ୍ୟଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ହେବା ଉଚିତ୍ ଯଦିବା ଚାବିକାଠି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ହେଉଥିବା ଉଚିତ୍। ଉପଯୋଗ ହେବାକୁ ଦିଆଯାଇ ଚାବିକାଠି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ହେଉଥିବା ଉଚିତ୍

ഇക്വേഷൻസ്

ഡൈനോറ്റെഫുറാൻ 15% + പൈമെട്രോസിൻ 45% ഡബ്ലിയു.ജി.

പ്രാണിനാശിനി

ഡൈനോറ്റെഫുറാൻ 15% + പൈമെട്രോസിൻ 45% ഡബ്ലിയുജി സസ്പർക്ക ആന്തരപ്രവാഹ പ്രവർത്തനമുള്ളതും വെള്ളത്തിൽ ചിതറുന്ന ഒരു തരി രൂപീകരണമാണ്. ട്രാൻസ്ലിമിൻ പ്രവർത്തനം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെൽ വിളയിലെ തവിട്ട് ചെടിപ്പേൻ, വെള്ളത്തെ പുറമുള്ള ചെടിപ്പേൻ, പച്ച ഇലപ്പേൻ, നെല്ലിലെ ഇയർ ഹെഡ് ബഗ് എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാണ്.

മുൻകരുതൽ പ്രതിരോധകൾ: ഇത് തേനീച്ചകൾക്ക് വിഷകരമാണ്, തേനീച്ചകൾ ആഹാരം തേടുന്ന സമയത്ത് സ്പ്രേ പ്രയോഗം ഒഴിവാക്കണം. ഈ ഉല്പന്നം മത്സ്യങ്ങൾക്കും തരള്ളിമുത്തം ഇലജീവികൾക്കും അത്യന്തം വിഷകരമാണ്. ജലാശയങ്ങളിലും ലഘുലേഖയിലും എടുത്തുപറഞ്ഞിട്ടുള്ളവ ഒഴികെ മറ്റുവിളകളിലും ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കരുത്.

ഗുപാർശ:

വിള	കീടങ്ങളുടെ സാധാരണ പേര്	ലായനിയുടെ സാന്ദ്രത ഗ്ര.സജീ. (ഗ്രാം/ഹെക്ടർ)		വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിക്കാൻ ഉള്ള അളവ് ലി/ഹെ. (ലി/ഹെ.)		അവസാന ഗോദാ സ്പ്രേ മുതൽ വിളവെടുപ്പ് സമയം വരെ കാത്തിരുപ്പ് സമയം (ദിവസം)	പ്രയോഗത്തിനും കൈമുള്ള പുനഃപ്രയോഗം (ദിനങ്ങളിൽ)
നെല്ല്	തവിട്ട് ചെടിപ്പേൻ (നിലപ്പേൻ ഗ്രൂപ്പിൽ)	200	333	500	24		-
	വെള്ളത്തെ പുറമുള്ള ചെടിപ്പേൻ (യാദാരണ്ണാ ഫർസ്പോറം)						
	പച്ച ഇലപ്പേൻ (നെഫോട്ടാറ്റിക്സ് വിരെസെൻസ്)						
	നെല്ലിലെ ഇയർ ഹെഡ് ബഗ് (ലെപ്പാരാകസീസ് അക്യൂട്ടാ)						

ഉപയോഗത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശം:

പ്രയോഗ സമയം: കീടങ്ങളുടെ എണ്ണം സാമ്പത്തിക പരിധിയിൽ (ETL) എത്തിയാലുടനേ തളിക്കണം.

മുൻകരുതൽ:

1. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, തീറ്റ ഭക്ഷ്യവസ്തു കണ്ടെയ്നറുകൾ, മുറങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം എന്നിവയിൽ നിന്ന് അകറ്റിവയ്ക്കുക.
2. വായ, കണ്ണുകൾ, ചർമ്മം ഇവയുമായി സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക.
3. തളിച്ചതിനു ശേഷം മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങളും ശരീരഭാഗങ്ങളും നന്നായി കഴുകുക.
4. തളിക്കുന്ന സമയത്ത് പുകവലിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും തിന്നുകയോ കുടിക്കുകയോ ചവക്കുകയോ അരുത്.
5. ഉപയോഗിക്കുന്നവർ പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന വസ്ത്രധാരണം ഉപയോഗിക്കണം അതിൽ റബർ കയ്യുറകൾ, ബൂട്ട്സ്, ഒന്നുകിൽ മുഖമറയണം അല്ലെങ്കിൽ മുഖപ്പിടി, ഗോഗിൾ ഗ്ലാസ് എപ്രൺ, ഹുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാറ്റ് ഇൻകൂടുന്നു.

വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ: വെപ്പുപോകുന്ന തരി, തളർച്ച, കുഴഞ്ഞണി ചുരുങ്ങുക, ധാരമുണ്ടായി ഉമിനീർ വരിക, വേദത്തിലുള്ള ശ്വാസതടി, ശ്വാസം കിട്ടാതെ വരിക, ഞരമ്പു വലിച്ച്, കണ്ണുകൾക്കും ചർമ്മത്തിനും ശ്വാസനാളിക്കും അസ്വസ്ഥത, മൂത്രത്തിനു ചുവന്ന നിറം, അതിലധം ശരീരത്തിന്റെ ചുട്ടുകുറയുക, ചർമ്മത്തിലെ തരിപ്പുകൾ.

പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ:

1. **വിഴുങ്ങിയാലിൽ:** ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ വിളിക്കുക. വൃക്തിക്ക് ബോധമുണ്ടായിരിക്കുകയും ജാഗ്രതയോടെ കഴിയുകയുമാണെങ്കിൽ, വെള്ളം കൊണ്ട് വായ കുലുക്കുഴിയിച്ച് 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക. അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരാളിന് ഒരിക്കലും വായിലൂടെ യാതൊന്നും നൽകരുത്. ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ വിളിക്കുക. ചികിത്സിക്കുന്ന ഫിസിഷ്യന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം മാത്രമേ ഛർദ്ദിക്കാൻ പ്രേരിക്കാവൂ.
2. **ശ്വസിച്ചാലിൽ:** രോഗിയെ ശുദ്ധവായുവിലേക്ക് മാറ്റി ശരീരത്തിന്റെ താപനില താഴാതെ നോക്കുക. രോഗി ശ്വസിക്കുന്നിലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം വിഷമകരമാണെങ്കിൽ, വായിലൂടെ കൃത്രിമശ്വാസം നൽകുക. ഫിസിക്കുന്റെ ഉപദേശം തേടുക.
3. **ചർമ്മ സമ്പർക്കമുണ്ടായാലിൽ:** സോപ്പും ധാരാളം വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക. വേദന, ചുവപ്പുനിറം അല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥത തുടരുന്ന പക്ഷം, ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം തേടുക. മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ വേർതിരിച്ച് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുൻപ് അവ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് പ്രത്യേക കഴുകണം.
4. **കണ്ണുകളിൽ പുകഞ്ഞെങ്കിൽ:** ധാരാളം വെള്ളമുപയോഗിച്ച് ചുരുങ്ങിയത് 15 മിനിറ്റ് സാമ്യമായി ഉപ്പുകഴുകുക. വേദന, അസ്വസ്ഥത, ചുവപ്പുനിറം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശത്തോട് ഭയം നിലനിന്നാൽ, നേത്രരോഗ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശം തേടുക.

സസ്യ സംരക്ഷണം:

മറ്റുവസ്തുക്കൾ പ്രതിരോധം: അറിയപ്പെടുന്ന നിരോദിക്കാട്ട മറ്റുമരുന്നിലു ലക്ഷണമനുസരിച്ച് ചികിത്സിക്കുക.

കണ്ടെയ്നറുകൾ നശിപ്പിക്കൽ:

1. പരിസ്ഥിതിയോ വെള്ളമോ മലിനമാകത്തക്ക വിധത്തിൽ പാക്കേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മിച്ചമുള്ള പദാർത്ഥവും കഴുകിയ വെള്ളവും സുരക്ഷിത മായ വിധത്തിൽ നശിപ്പിക്കണത് പ്രാണിനാശിനിയുടെ നിർമ്മാതാക്കളുടെയും രൂപീകരണക്കാരുടെയും പ്രയോഗിക്കുന്നവരുടെയും ചുമതല ആയിരിക്കും.
2. ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ പാക്കേജുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതു തടയാനായി അവ പുഴമ്പ ഉപക്കിക്കാവൂത്.
3. പാക്കേജുകൾ തകർത്ത് ജനസാന്ദ്രതയുള്ള സ്ഥലത്തുനിന്ന് അകലെയായി കുഴിച്ചുമൂടണം.

സ്റ്റോറേജിനുള്ള നിർദ്ദേശം:

1. പ്രാണിനാശിനിയുടെ അവ്വിനെയും സ്വഭാവത്തേയും ആശ്രയിച്ച് പ്രാണിനാശിനി അടങ്ങുന്ന പാക്കേജുകൾ 0ഗ്ര വസ്തുക്കൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മുറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നകലെയായി പ്രത്യേക മുറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടങ്ങളിൽ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക അലമാരയിൽ താഴിട്ടു പൂട്ടിയായിക്കണം സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്.
2. പ്രാണിനാശിനി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മുറി അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടം ഉറപ്പായി നിർമ്മിച്ചതും വരണ്ടതും നല്ല പ്രകാശമുള്ളതും വായുസഞ്ചാരമുള്ളതും പരിപാലിക്കാവ അളവുകളുള്ളതുമായിരിക്കണം.

ഘടന ഘടകം

ഡൈനോറ്റെഫുറാൻ സ.ചേ.	15.00% ഭാ/ഭാ
പൈമെട്രോസിൻ സ.ചേ.	45.00% ഭാ/ഭാ
സിലിക്കോൺ ഡയോക്സൈഡ് പൗഡർ	4.50% ഭാ/ഭാ
മോഡിഫൈഡ് പോളിമെറിക് അനിയോണിക് വിസ്പർസിംഗ് ഏജന്റ്	5.00% ഭാ/ഭാ
അനിയോണിക് പോളിമെറിക് അനിയോണിക് വിസ്പർസിംഗ് ഏജന്റ്	5.00% ഭാ/ഭാ
സൾഫോസറ്റ് ഒൈഡ് അനിയോണിക് വെറ്റിംഗ് ഏജന്റ്	2.00% ഭാ/ഭാ
പൊടിയാക്കിയ ഇനോർഗാനിക് സാൾട്ട്	8.90% ഭാ/ഭാ
മിനറൽ പൗഡർ	2.00% ഭാ/ഭാ
പോളിമെറിക് ബൈൻഡിംഗ് ഏജന്റ്	4.00% ഭാ/ഭാ
സാച്ചുറേറ്റ് ക്ലേ	QS %
ആകെ:	**100.00% ഭാ/ഭാ**

പുനഃപ്രയോഗകാലാവധി: 24 മണിക്കൂർ.

മുന്നറിയിപ്പ് ഈ ലേബലിൽ/ലഘുലേഖയിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവ ഒഴികെ മറ്റ് വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.

ईक्वेशन्स

डाईनोटेफ्यूरान 15% + पाईमेट्रोजिन 45% डब्लिउजि

(कीटनाशक)

डाईनोटेफ्यूरान 15% + पाईमेट्रोजिन 45% डब्लिउजि हैचे पानीत भ्रशीघ्रुत दानादार प्रकृति चि सरंम्पर्क आक माजे माजे होरा कीटनाशक। हे टेन्सलमिनार कार्यकलाप द्वारा काम करे। आक धानर भसात डाउन एफिड, वगा पिठिर एमिड, सेउडोग्रिया पाउन एफिड आक धानर काथर मूवर पोक निग्रक्षन वाद वाहनीय। सावधान:- एही सामग्री मौखाभिर वादे विषाक्त, गतिकर मोभाषि सक्रिय ह'ल वाहाव नकरिव। एही सामग्री माछ आक जलज अकृमिर वादे सामान्य विषाक्त। लेबेल आक प्रछाव पत्रिकाक निर्धारित भस्यर वाहिरे आन भसात वाहाव कविव नालागे।

पवामर्श:

भस्य	लोकर नाम	ड'ज/हेक्टेर			पानीत ग्रहण लि (/हेक्टेर)	अन्तिमवार छिटकाव पिछत भसात भस्य ग्रहण उपयोगरिक्त अन्यथा कविव लगा समय	प्रतिलाव छिटकाव पिछत भसात भस्य ग्रहण समय (घण्टा)
		ए.आई (ग्राम/हेक्टेर)	प्रकृति (ग्राम/हेक्टेर)				
धान	बामान बड्डर उड्डिम हपार (नैलापर्वतक ग्रुपरा), वगा (ईक्रा हाग्रो हपार (मेलानोगास्टर अरुणा), वगा (सेक्रा प्लाण्ट हपार (लाइटोडिला फर्डिलेस), रान्गाजिया पोउक हपार (लेपटोसिस डाइलेक्सेन्स) आर ग्राउन्ड काथ (ग्रेप्टोलेनिया अर्बुटा) (ऐशियाटिकोलिया अर्बुटा)	200	333	500	24		

वाहाबर वादे निर्देशना:

-

वाहाबर समय:

कीट-पतंगर जनसंख्यां अर्थनैतिक सीमा (ETL) पोरार आगते यिमान पारि सोनकालत प्रयोग कविव लागे।

वाहाबकवीर सावधानता:

1) भाग्य थाली भाग्यर पात्र आक पशुर भाग्यर पवा आँतवत वाखिव लागे। 2) मुख, हाकु आक शरीरर सरंम्पर्श पवा विरत थाकिव लागे। 3) वाहाबर समय पिछत दृश्यित काप्रोर आक शरीरर अंग ज्ञानदत्त धुव लागे। 4) वाहाबर कवार समयत धूमपान, पान, खोवा आक चोवाई नाथाकिव। 5) सामग्री वाहाबर कवार समयत बबवर ग्लब्ज, वुट आक गगलष या फेस श्विल्ड आक अछावअल वा बबवर एप्र'न वा केपएल धवि सुरक्षामूलक काप्रोर पिन्धिव लागे।

विषक्रियार लक्षण:

खोज केंपोवार, अतायिक दुर्बलता, माइथ'ष्ठि, अतायिक लाला ग्लेवार, टेप्टिपनिया, श्वास-प्रश्वासत कष्ट, विद्रूपता, हाकु, छाल आक श्वासनलीर विष, वमहाक, प्रसार बड़ा होवा, स्पर्श कविले हाइप'थार्मिक, एविथेमा इत्यादि।

प्राथमिक चिकित्सा:

1) गिलिलेः- तरुक्षणात चिकित्सकर सरंम्पर्क लव लागे। यदि व्यक्तिजन सचेतन आक सज्ञान हे थाके तेन्हे पानीरे मुखन धुव लागे। आक 1 वा 2 गिलाप पानी भावरेंन दिव। अचेतन व्यक्तिर मुखरे कोनो निदिव। डाक्तर माखिल। उपस्थित चिकित्सकर वाधा निनियालेंके नमि कविवलेंत प्रदाचित नकविव। 2) उभाश-निभाशतेः- वेगोनिक रुष्ध वतहारेत ऐ थाबा। आक भवीवर उत्साहार यत्न लएक। यदि वेगोनिरे उभाश-निभाश लोवा नाइ वा उभाश-निभाश लोवात अत्रुविधा पाइेछे तेन्हे कृत्रिम श्वास-प्रश्वास दिव लागे। मुखर पवा मुखरे उभाश लोवातेंत भाल ह'ल चिकित्सकर सरंम्पर्क लएक। 3) छालर सरंम्पर्शलें आहिलेः- भवीवर क्षतिग्रस्त अंश तुलिके धवि आक नखर तलर अंश बानोन आक क्षुद्रम परिमाणें पानीरे धुव लागे। विष, बड़ा पवा वा विक्रिष्ट थाकिले चिकित्सकर सरंम्पर्म लएक। टिक्षणदेत दुषित सकलो काप्रोन पृथक करि वाहाबर आगते ताप्रोन आक पानीरे भालदरे धुव लागे। 4) चकुर सरंम्पर्श आहिलेः- क्षुद्र परिमाणें पानीरे कनेव 15 मिनिट लाइे धुव लागे। यदि विष, बड़ा पवा, विक्रिष्ट वा फटोफ'विया थाके तेन्हे चकुर चिकित्सकर सरंम्पर्म लएक।

फाइटोटक्सिसिटि:

प्रतिषेधक:

कोनो निर्दिष्ट प्रतिषेधक जना नायाय। लक्षण अनुसरि चिकित्सा कवक।

थाली केन निक्षाभन कवा:

1) अपएवनाशक निर्माता आक वाहाबकवीर कर्तव्य ह'ल बाकी थका अपएवनाशक आक सँङ्गलि थाका वस्तुलोव एनेनवे निम्नापन्डाव पेलोवा याते परिवेशर वा पानी प्रदूषित नहय। 2) वाहाव काँनिव टोपोलाजोवे एनेनवे पेलाइे निदिव याते पुनर्न वाहाव कविव नेवारीवे। 3) वाहाव काँनि आक टोपोलाजा ज्ञाडि जनसंख्याव थवा आँतवत माटिरे पुति थव लागे।

सरंक्षणव अवस्था:

1) कीटानाश यूक्त पेकेजसमूह अन्यान्य सामग्री विरोधकेंक थाना सरंक्षणव वादे वाहाबर कवा कोठा आक टोइभव पवा आँतवत पृथक कोठा आक टोइभत वा कीटानाशक परिमाण आक प्रकृतिर ओपरत निर्डर करि पृथक ठला लागेवा आलमावीत वाखिव लागे। 2) कीटानाश सरंक्षणव वादे निर्धारित कोठा आक टोइभ भालदरे निर्माण कवा, शुकान, भालदरे पोहरव दिया, वायु चलाल कवा आक पर्याप्त मात्रार ह'व लागे।

वानासनिक गठन:

डाइनोटेफ्यूरान a.i.	15.00 % w/w
पाईमेट्रोजिन a.i.	45.00 % w/w
सिलिकान डाइऑक्साइड	4.50 % w/w
हिलिकन डाइ अक्साईड पाउडार	4.50 % w/w
परिवर्तित पलिमेरिक एनियनिक विक्षिप्तकवर एजेन्ट	5.00 % w/w
सुगन्धि पलिमेरिक एनिइनिक विक्षिप्तकवी एजेन्ट	5.00 % w/w
छालफनेट धवण एनियनिक एजेन्ट	2.00 % w/w
गुड़ि कवा अर्जेजिक निमथ	8.90 % w/w
थनिज गुड़ि	2.00 % w/w
पलिमेरिक बाइडिंग एजेन्ट	4.00 % w/w
प्राकृतिक माटि	Q.S. %
मेटि	100.00 % w/w

शस्यक्षेत्रत पुनर्व प्रवेशर समय: 24 घण्टा।

सतर्कता: लेबेल/लिफलेटत उल्लेख नकवा शस्यर ওপরत वाहाबर कविव नालागे।

ઇક્વેશન્સ

ડાઈનોટેફ્યૂરાન 15% + પાઈમેટ્રોજીન 45% WG

(કીટનાશક)

ડાઈનોટેફ્યૂરાન 15% + પાઈમેટ્રોજીન 45% WG એ ઘડાતા સંપર્કર અને વ્યવસ્થિત કીટનાશકસ્વરૂપનો દાણા જેવો પદાર્થ છે. આ ઉત્પાદન ટ્રાન્સલેમિનાર કાર્યકલાપ દ્વારા કામ કરે છે. આ ધાનમાં ભૂરા ફોલ્ડર, ઘાસ પિઠિર એફિડ, સેલોગ્રિયા પાઉન એફિડ આક ધાનના કાથર મૂવર પોક નિયંત્રણ માટે વાપરવું. સાવધાન:- એ સામગ્રી મૌખાભિર વાદે વિષાક્ત, ગતિકર મોભાષિ સક્રિય હ'લ વારહાવ નકરિવ। એ સામગ્રી માછ આક જલજ અકૃમિર વાદે સામાન્ય વિષાક્ત। લેબલેર આક પ્રછાવ પત્રિકાત નિર્ધારિત મસ્યર વાહિરે આન મસ્યત વારહાવ કરિવ નાલાગે।

પવામર્શ:

શસ્ય	લોકર નામ	ગ્રા/હેક્ટેર		પાણીમાં ભળવા લિ (/હેક્ટેર)	અંતિમવાર છંટકાવ થયાં પછી પાકનું ફળ ઉપયોગ કરવા અગાઉ રાહ જોવાનો સમય	પ્રતિલાવ છંટકાવ પછી પાકનું ફળ પ્રક્રિયા (ઘણીવાર)
		એ.આઈ (ગ્રામ/હેક્ટેર)	પ્રકૃતિ (ગ્રામ/હેક્ટેર)			
ધાન	બામાન બડ્ડર (ઉડ્ડિમ હપાર (નૈલાપર્વતક ગ્રુપરા), વગા (ઈક્રા હાગ્રો (મેલાનોગાસ્ટર અરુણા), વગા (સેક્રા પ્લાન્ટ હપાર (ફિડોલિયા ફર્ડિલેસ), રાન્ગાજિયા પોઉક હપાર (લેપટોસિસ ડાઇલેક્સેન્સ) આર ગ્રાઉન્ડ કાથ (ગ્રેપ્ટોલેનિયા અર્બુટા) (એશિયાટિકોલિયા અર્બુટા)	200	333	500	24	

વાહાવર વાદે નિર્દેશના:

-

વાહાવર સમય:

કીટ-પતંગર જનસંખ્યાં અર્થનૈતિક સીમા (ETL) પોરાર આગતે યિમાન પારિ સોનકાલત પ્રયોગ કરિવ લાગે।

વારહાવકારીર સાવધાનતા:

1) ખાદ્ય થાલી ખાદ્યર પાત્ર આક પશુર ખાદ્યર પવા આંતવત રાખિવ લાગે। 2) મુખ, હાકુ આક શરીરર સંપર્કર પવા વિરત થાકિવ લાગે। 3) વારહાવર પિછત દૃશ્યિત કાપોર આક શરીરર અંગ જાનદત્ત ધુવ લાગે। 4) વારહાવ કવાર સમયત ધૂમપાન, પાન, ખોવા આક ચોવાઈ નાથાકિવ। 5) સામગ્રી વારહાવ કવાર સમયત બવવર ગ્લોવ, વુટ આક ગગલષ યા ફેસ શ્વિલ્ડ આક અછાવઅલ વા બવવર એપ્ર'ન વા કેપએલ ધવિ સુરક્ષામૂલક કાપોર પિન્ધિવ લાગે।

વિષક્રિયાર લક્ષણ:

ખોજ કેંપોવાર, અતાયિક દુર્બલતા, માઇથ'ષ્ઠિ, અતાયિક લાલા ઓલ્લાવ, ટેપ્ટિપનિયા, શ્વાસ-પ્રશ્વાસત કષ્ટ, વિદ્રૂપતા, કાનુ, છાલ આક શ્વાસનલીર વિષ, વમહાક, પ્રસાર બડા હોવા, સ્પર્શ કવિલે હાઇપ'થાર્મિક, એવિથેમા ઇત્યાદિ।

પ્રાથમિક ચિકિત્સા:

1) ગિલિલેઃ- તરુક્ષણાત ચિકિત્સકર સંપર્ક લવ લાગે। યદિ વ્યક્તિજન સચેતન આક સજ્ઞાન હે થાકે તેન્હે પાનીરે મુખન ધુવ લાગે। આક 1 વા 2 ગિલાપ પાની ખાવેંન દિવ। અચેતન વ્યક્તિર મુખરે કોનો નિદિવ। ડાક્તર માખિલ। ઉપસ્થિત ચિકિત્સકર વાધા નિનિયાલેંકે નમિ કવિવલેં પ્રદાચિત નકવિવ। 2) ઉભાશ-નિભાશતેઃ- વેગોનિક રુષ્ધ વતહારેત ઐ ચાયા। આક શરીરર ઉત્સાહાર યત્ન લએક। યદિ વેગોનિરે ઉભાશ-નિભાશ લોવા નાઇ વા ઉભાશ-નિભાશ લોવાત અસુવિધા પાઇછે તેન્હે કૃત્રિમ શ્વાસ-પ્રશ્વાસ દિવ લાગે। મુખર પવા મુખરે ઉભાશ લોવાતેંત ભાલ હ'લ ચિકિત્સકર સંપર્ક લએક। 3) છાલર સંપર્શલેં આહિલેઃ- શરીરર ક્ષતિગ્રસ્ત અંશ તુલિકે ધવિ આક નખર તલર અંશ બાનોન આક ક્ષુદ્રમ પરિમાણે પાનીરે ધુવ લાગે। વિષ, બડા પવા વા વિક્રિષ્ટ થાકિલે ચિકિત્સકર સંપર્ક લએક। ટિક્ષણદેત દુષિત સકલો કાપોન પૃથક કવિ વારહાવ આગતે તાપોન આક પાનીરે ભાલદરે ધુવ લાગે। 4) ચકુર સંપર્શર આહિલેઃ- ક્ષુદ્ર પરિમાણે પાનીરે કનેવ 15 મિનિટ લાઇે ધુવ લાગે। યદિ વિષ, બડા પવા, વિક્રિષ્ટ વા ફટોફ'વિયા થાકે તેન્હે ચકુર ચિકિત્સકર સંપર્ક લએક।

ફાઇટોટોક્સિસિટિ:

પ્રતિષેધક:

કોનો નિર્દિષ્ટ પ્રતિષેધક જના નાયાય। લક્ષણ અનુસરિ ચિકિત્સા કવક।

ખાલી કેન નિક્ષાભન કવા:

1) અપએવનાશક નિર્માતા આક વારહાવકારીર કર્તવ્ય હ'લ બાકી થકા અપએવનાશક આક સેંલુલિ થકા વસ્તુલોવ એનેનવે નિમાપન્ડાવે પેલોવા યાતે પરિવેશર વા પાની પ્રદૂષિત નહય। 2) વારહાર કાંનિવ ટોપોલાજોવે એનેનવે પેલાઇે નિદિવ યાતે પુનર્ન વારહાર કવિવ નેવારીવે। 3) વારહાર કાંનિ આક ટોપોલાજા જાડિ જનસંખ્યાર વધા આંતવત માટિરે પુતિ થવ લાગે।

સંરક્ષણવ અવસ્થા:

1) કીટાનાશક યુક્ત પેકેજસમૂહ અન્યાન્ય સામગ્રી વિરોધકેંક થાના સંરક્ષણવ વાદે વારહાર કવા કોઠા આક ટોઇભવ પવા આંતવત પૃથક કોઠા આક ટોઇભત વા કીટાનાશક પરિમાણ આક પ્રકૃતિર ઓપરત નિર્ડર કવિ પૃથક ઠલા લાગેવા આલમાવીત વાખિવ લાગે। 2) કીટાનાશક સંરક્ષણવ વાદે નિર્ધારિત કોઠા આક ટોઇભ ભાલદરે નિર્માણ કવા, શુકાન, ભાલદરે પોહરવ દિયા, વાયુ ચલાલ કવા આક પર્યાપ્ત માત્રાર હ'વ લાગે।

વાનાસનિક ગઠન:

ડાઇનોટેફ્યૂરાન a.i.	15.00 % w/w
પૈમેટ્રોઝિન a.i.	45.00 % w/w
સિલિકાન ડાઇઓક્સાઇડ	4.50 % w/w
માર્ગદર્શિકાર કાલોસ્પર્સ અયોગાનિક ડિસ્પર્સિંગ એજેન્ટ	5.00 % w/w
અરોમ્યાટ્રોપ્સ કાલોસ્પર્સ અયોગાનિક ડિસ્પર્સર એજેન્ટ	5.00 % w/w
સલ્ફોસુકેનેટ સુકરસેલ અયોગાનિક વેટનીગ્રોલ્યસ એજેન્ટ	2.00 % w/w
અજૈવિક ઘટ્ટુ ક્ષાર	8.90 % w/w
કાલોસ ક્ષાર	2.00 % w/w
ગ્રેનિલ ગુડિ	2.00 % w/w
કાલોસ બાઈન્ડિંગ એજેન્ટ	4.00 % w/w
ડ્રેસરાન્ટ માટ્ટ	Q.S. %
ઓટ્ટા	100.00 % w/w

મહત્ત્વ-સ્પ્રેયર અવધિ: 24 ગંટાંગ.

ચેતવણીઓ: લેબલ/પેકેજસ્પ્રેયર પર્યાપ્ત ઉપરાંત ઉપર ઉલ્લેખ કરેલ સિવાય અન્ય પાકોમાં ઉપયોગ કરવો નહીં.

ইক্বেশন্স

ডাইনোটেফ্যুরান 15% + পাইমেট্রোজিন 45% ডব্লিউজি

(কীটনাশক)

ডাইনোটেফ্যুরান 15% + পাইমেট্রোজিন 45% ডব্লিউজি হৈছে পানীত দ্রবীভূত দানাদার প্রকৃতি যি সংস্পর্শ আরু মাজে মাজে হোৱা কীটনাশক। ই টেন্সলেমিনার কার্যকলাপ দ্বারা কাম কৰে। আৰু ধানৰ শস্যত ব্ৰাউন এফিড, বগা পিঠিৰ এফিড, সেডেজিয়া পাতৰ এফিড আৰু ধানৰ কাথৰ মূৰৰ পোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা। সাৱধান:- এই সামগ্ৰী মৌখাভিৰ বাবে বিষাক্ত, গতিকৰ মৌমাখি সক্ৰিয় হ'লে ব্যৱহাৰ নকৰিব। এই সামগ্ৰী মাছ আৰু জলজ অকৃমিৰ বাবে সামান্য বিষাক্ত। লেবেল আৰু প্ৰচাৰ পত্ৰিকাত নিৰ্ধাৰিত শস্যৰ বাহিৰে আন শস্যত ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে।

পৰামৰ্শ:

শস্য	লোকৰ নাম	ড'জ/হেক্টেৰ		পানীত ভৰা লি (/হেক্টেৰ)	অন্তিমবাৰ ছিটকাৰ পিছত শস্যৰ ফল উপযোগৰিক্ত অপেক্ষা কৰিব লগা সময়	প্ৰতিলাৰ ছিটকাৰ পিছত শস্যৰ ফল প্ৰসেশ (ঘণ্টাত)
		এ.আই (গ্ৰাম/হেক্টেৰ)	প্ৰকৃতি (গ্ৰাম/হেক্টেৰ)			
ধান	বামান বড্ডৰ উড্ডিম হপাৰ (নৈলাপৰ্বতক গ্ৰুপৰা), বগা (ইক্ৰা হাগ্ৰো (মেলানোগাস্টৰ অৰুণা), বগা (সেক্ৰা প্লাণ্ট হপাৰ (ফিডোলিয়া ফৰ্ডিলেস), ৰাণ্গাজিয়া পোউক হপাৰ (লেপটোসিস ডাইলেক্সেন্স) আৰু গ্ৰাউণ্ড কাথ (গ্ৰেপ্টোলেনিয়া অৰ্বুটা) (এশিয়াটিকোলিয়া অৰ্বুটা)	200	333	500	24	

ব্যৱহাৰৰ সময়:

কীট-পতংগৰ জনসংখ্যা অৰ্থনৈতিক সীমা (ETL) পোৱাৰ আগতে যিমান পাৰি সোনকালে প্ৰয়োগ কৰিব লাগে।

ব্যৱহাৰকাৰীৰ সাৱধানতা:

1) খাদ্য থালী খাদ্যৰ পাত্ৰ আৰু পশুৰ খাদ্যৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব লাগে। 2) মুখ, চকু আৰু শৰীৰৰ সংস্পৰ্শৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে। 3) ব্যৱহাৰৰ পিছত দৃশ্যিত কাপোৰ আৰু শৰীৰৰ অংগ ভালদৰে ধুব লাগে। 4) ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত ধূমপান, পান, খোৱা আৰু চোবাই নাখাকিব। 5) সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত ৰবৰৰ গ্লভছ, বুট আৰু গগলছ বা ফেচ শ্বিল্ড আৰু অছাবঅল বা ৰবৰৰ এপ্ৰ'ন বা কেপএল ধৰি সুৰক্ষামূলক কাপোৰ পিন্ধিব লাগে।

বিষক্ৰিয়াৰ লক্ষণ:

খোজ কঁপোৱা, অতাধিক দুৰ্বলতা, মাইথ'ষ্ঠিছ, অতাধিক লালা ওলোৱা, টেপিপনিয়া, শ্বাস-প্ৰশ্বাসত কষ্ট, বিৱূপতা, চকু, ছাল আৰু শ্বাসনলীৰ বিষ, বমহাক, প্ৰসাৰ বঢ়া হোৱা, স্পৰ্শ কৰিলে হাইপ'থাৰ্মিক, এৰিথেমা ইত্যাদি।

প্ৰাথমিক চিকিৎসা:

1) গিলিলেঃ- তৎক্ষণাত চিকিৎসকৰ সৰম্পৰ্ক লব লাগে। যদি ব্যক্তিজন সচেতন আৰু সজ্ঞান হে থাকে তেন্তে পানীৰে মুখখন ধুব লাগে। আৰু 1 বা 2 গিলাপ পানী খাবলৈ দিব। অচেতন ব্যক্তিৰ মুখৰে একো নিদিব। ডাক্তৰৰ মাখিল। উপস্থিত চিকিৎসকে বাধা নিনিয়ালেকে নমি কৰিবলৈ প্ৰৰোচিত নকৰিব। 2) উভাশ-নিভাশতেঃ- বেগোনিক ৰুদ্ধ বতাহেৰে ঐ যোৱা। আৰু শৰীৰৰ উষ্ণতাৰ যত্ন লওক। যদি বেগোনিৰে উভাশ-নিভাশ লোৱা নাই বা উভাশ-নিভাশ লোৱাত অসুবিধা পাইছে তেন্তে কৃত্ৰিম শ্বাস-প্ৰশ্বাস দিব লাগে। মুখৰ পৰা মুখলৈ উভাশ লোৱাতে ভাল হ'লে চিকিৎসকৰ সৰম্পৰ্শ লওক। 3) ছালৰ সংস্পৰ্শলে আহিলেঃ- শৰীৰৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত অংশ তুলিকে ধৰি আৰু নখৰ তলৰ অংশ বানোন আৰু ক্ষুদ্ৰম পৰিমাণে পানীৰে ধুব লাগে। বিষ, বঢ়া পৰা বা বিৰক্তি থাকিলে চিকিৎসকৰ সৰম্পৰ্ক লওক। টিক্ষণদেত দূষিত সকলো কাপোৰ পৃথক কৰি ব্যৱহাৰৰ আগতে তাপোন আৰু পানীৰে ভালদৰে ধুব লাগে। 4) চকুৰ সংস্পৰ্শ আহিলেঃ- ক্ষুদ্ৰ পৰিমাণে পানীৰে কনেও 15 মিনিট লাহে লাহে ধুব লাগে। যদি বিষ, বঢ়া পৰা, বিৰক্তি বা ফটোফ'বিয়া থাকে তেন্তে চকুৰ চিকিৎসকৰ সৰম্পৰ্শ লওক।

ফাইটোটক্সিচিটি:

প্ৰতিষেধক:

কোনো নিৰ্দিষ্ট প্ৰ