പാരാക്വാറ്റ് ഡൈക്ലോറൈഡ് 24% എസ് എൽ

കാപിക്™

(സ്പർശന കളനാശിനി)

പാരാക്വാറ്റ് ഡൈക്ലോറൈഡ് (കാപിക്) 24% എസ് എൽ എല്ലാവിധ കള കളും സ്പർശത്താൽ നാശം ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ള കളനാശിനിയാണ്. ഇത് മണ്ണിൽചേരുമ്പോൾ നിഷ്ക്രിയമ്

രാസഘടന:

പാരാക്വാറ്റ് ഡൈക്ലോറൈഡ് ടെക്ക് (100% w/w പ്ര.വ. അനുപാതം)	24.00 % w/w
നോണിനിൽ ഫിനോയിൽ എത്തോക്സിലേറ്റ്	01.00 % w/w
കൊക്കോമൈൻ എത്തോക്സിലേറ്റ്	04.00 % w/w
സിലിക്കോൺ ഡിഫോമർ	00.10 % w/w
ഡൈ ആസിഡ് ബ്ലൂ	00.05 % w/w
എമിൽഷൻ ഡൈ	00.05 % w/w
വെള്ളം	ആവശ്യാനുസരണം %
	ആകെ : 100.00% w/w

ശുപാർശ :

വിള	മറ്റുന്നിന്റെ സാധാരണ പേര്	ഓരോ ഹെക്ടറിനും ഡോസേജ് എ.ഐ. (കി.ഗ്രാം)	മിശ്രണം (ലിറ്റർ)	വെള്ളത്തിൽ കളനാശിനി (ലിറ്റർ)	കാത്തിരിക്കേണ്ട സമയം (ദിവസം)
	ബി.ഫൈഡില്ല	വെള്ളത്തിൽ 1-1.5ppm	4.2	600	-
മുന്തിരി	സെപ്രസ് റോട്ടൻഡാ/ സെനനോവൺ ഡാക്ലിലോൺ കണ്ടീഫോർവ്വേസ് എസ്പി ഫോർട്ടുലാക്ക എസ്പി ട്രിഡാക്ക് എസ്പി	0.5	2.5	500	90
ഉറുളക്കിഴങ്ങ്	ഫൊസോഫിയം എസ്പി അൻഡ്രിസ് ആർഫെൻൻസിസ് ഡൈനേന ലാറ്റോഫൈന	0.25-0.51	1.06-2.125	500	100
പഞ്ഞി	സെപ്രസ് റോട്ടൻഡാ/ ടിഡാക ആർവെൻസിസ്	0.3-0.5	1.25-2.125	500	150-180
നാരങ്ങ	സെപ്രസ് ഇറ്റിയ പുള്ളി കൂടാതെ വലിയ ഇലകളുള്ള കളനാശനി	1.0	4.25	500	120-150
ചായ	ഇംപെറാറ്റ സിലിണ്ട്രിക്ക സെറ്റേറിയ എസ് പി. കോംബിന ബെൻഗാൾൻസിസ് ബോർഹാവിയ ഹിസ്പിഡ ബെഹാസംഭല കണ്ടമ്പുറാട്ടം	0.2-1.0	0.85-4.25	200-400	-
ജലത്തിൽ കളകൾ അരി	എ.ഹൈഡ്രോണിയ ക്രാസിപെസ് മങ്ങലാട്ടം കോണിസൈസിസ്	1.0	4.25-1000	600-1000	-
	എച്ചിനോക്ലോവ ക്രസ്ഗലി പാനിക്കമിഫെൻസ് സെപസസ് ഇറിയ ബ്രഡ്ചിയാറിയ മുട്ടാക	0.3-0.8	1.25-4.0	250	
റബ്ബർ	ഡിജിറ്റേറിയ എസ്.പി. ഇറ്റാഗ്രോസ്റ്റിസ് എസ്.പി. പിറ്റാക്ലിസ്സെലിസ് എസ്.പി.	0.3-0.6	1.25-2.5	670	

ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം: ചെടി സംരക്ഷിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുക: സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന നാപ്പാക്ക് സ്പ്രേയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് കംപ്രഷൻ സ്പ്രേയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് സ്പ്രേയർ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സ്പ്രേയർ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കുക.

മുൻകരുതൽ: 1. ഇത് കലക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയോ ചർമ്മത്തിൽ തട്ടുകയോ ചെയ്യരുത്. 2. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ സുരക്ഷാ വസ്ത്രങ്ങളായ റബ്ബർ ഉറകൾ, ബൂട്ട്സ് കൂടാതെ മുഖാവരണം അല്ലെങ്കിൽ ഡസ്റ്റ് മാസ്റ്റ് കൂടാതെ റബ്ബർ ഏപ്രൺ ഹുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാറ്റ് തുടങ്ങിയവ ഏല്ലാറ്റാ ഉപയോഗിക്കണം.

വിഷമേറ്റതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ: ചൊറിച്ചിൽ, മൂക്കിൽ നിന്ന് ചോര വരുക, വയറ്റിൽ അസ്വസ്ഥത, വയറിളക്കം കൂടാതെ ലിവർ, കിഡ്നി തകരാറിലായ ലക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ.

പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ: കഴിക്കൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കഴുത്തിന്റെ ബാക്കിൽ ഇക്കിളിയാക്കി ശർദ്ദിപ്പിക്കുക. വയ്യുങ്ങളിൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാറപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകുക. മദ്യം, വയ്യും കൂടാതെ കണ്ണുകൾ എന്നീവ ധാരാളം വെള്ളമൊഴിച്ച് കഴുകുക. ശ്വാസ തടസ്സം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ രോഗിയെ വായുസഞ്ചാര മുള്ളിടത്തേക്ക് മാറ്റുക.

ഡൈഫ്രോടോക്സിസിറ്റി : ഈ ഉല്പന്നം പറഞ്ഞപോലെ ഉപയോഗിച്ചാൽ വിഷപ്രവാഹം ഉണ്ടാകില്ല.

മറുമരുന്ന് : ഇടക്കിടയ്ക്ക് ശർദ്ദിപ്പിക്കുകയും വയറു കഴുകുകയും ചെയ്യുക. 500എംഎൽ ഓഫ് 30% സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് ഫുറോലൈസിസ് ബെൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളേയ് ഇത് വായിലൂടെ കൊടുക്കുക. രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറിനു ശേഷം ഇത് വീണ്ടും ചെയ്യുക. ലക്ഷണം നോക്കി ശുശ്രൂഷിക്കുക.

ഉപയോഗിച്ച കണ്ടയ്യറുകൾ നശിപ്പിക്കുന്ന വിധം: 1. നിർമ്മാതാക്കളും കളനാശിനിയുടെ ഫോർമുലേറ്റുറും കൂടാതെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരും ഇതിന്റെ പാച്ചുറ്റുകളും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളും നല്ലപോലെ ശരിയായ രീതിയിൽ പരിസര മലിനീകരണമോ ജലമലിനീകരണമോ ഉണ്ടാവാത്ത വിധം കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം. 2. ഉപയോഗിച്ച പാച്ചുറ്റുകൾ പുറത്ത് വലിച്ചെറിയരുത്. ഇത് വിണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കരുത്. 3. ജനവാസ മില്ലാത്ത സ്ഥലം നോക്കി പാച്ചുറ്റുകൾ പൊട്ടിച്ച് കത്തിച്ചു കളയണം.

സൂക്ഷിക്കേണ്ട വിധം : കളനാശിനിയുടെ പാച്ചുറ്റ് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് മാറ്റി സൂക്ഷിക്കണം. മറ്റു ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ അടുത്തുനിന്നും മാറ്റി ഒരു അലമാറയിൽ ഇതിന്റെ ഗുണവും സ്വഭാവവും അറിഞ്ഞ് പൂട്ട് സൂക്ഷിക്കണം. 2. കളനാശിനി സൂക്ഷിക്കുന്ന മുറിയും പരിസരവും നല്ലപോലെ നിർമ്മിച്ചതും, നനവില്ലാത്തതും,നല്ല വെളിച്ചവും കാറ്റുള്ളതും ഇതിന്റെ മണം പുറത്തേക്ക് പരക്കാതിരിക്കുകയും വേണം.

തിരികെ പ്രവേശിക്കേണ്ട സമയം : 48 മണിക്കൂർ

ശ്രദ്ധിക്കുക :: ഈ ലീഫ് ലെറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിളകളിൽ മേൽ അല്ലാതെ മറ്റു വിളകളിൽ ഇത് ഒരു കാരണവശാലും ഉപയോഗിക്കരുത്

Malayalam

ಪ್ಯಾರಾಕ್ವಾಟ್ ಡೈಕ್ಲೋರೈಡ್ 24% ಎಸ್‌ಎಲ್

ಕಾಪಿಕ್™

(ಸಸ್ಯನಾಶಕ ಸಂಪರ್ಕ)

ಇದು ಅಯ, ಸಸ್ಯನಾಶಕ ಸಂಪರ್ಕಮಾಡಿದ ಅದು 24% ಡಿ / ಡಿ ಸಸ್ಯದ ಫಲಕಾಂಡಮಾಡಿದೆ, ಪ್ಯಾರಾಕ್ವಾಟ್ ಡೈಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪ.ಸಿ. ಸಾಮಾನ್ಯಕ ಸಮುದೋಲೆಗೆ ಸಮಾಯಕಗೊಂಡಿದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಪ್ಯಾರಾಕ್ವಾಟ್ ಡೈಕ್ಲೋರೈಡ್ ಟೆಕ್ (100% w/w ಪ.ಪ. ಅನುಪಾತ)	24.00% w/w
ನೊನಿಲಿಲ್ ಫೀನಲ್ ಎಥಿಲೀನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಟ್	01.00% w/w
ಕೊಕೊಮೈನ್ ಎಥಾಕ್ಸಿಲೇಟ್	04.00% w/w
ಸಿಲಿಕೋನ್ ಡಿಫೋಮರ್	00.10% w/w
ಡೈ ಆಸಿಡ್ ನೀಲಿ	00.05% w/w
ಎಮಲ್ಷನ್ ಡೈ	00.05% w/w
ನೀರು	Q.S. %
ಒಟ್ಟು :	100.00% w/w

ಶಿಫಾರಸು :

ಬೆಳೆ	ಕೀಟಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರಿಗೆ ಡೋಸೇಜ್. ಎ.ಐ. ಕೆಜಿ	ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ (ಲೀಟರ್)	ಸಾರದಿಸುವಿಕೆ ನೀರು (ಲೀಟರ್)	ನಿಂತ್ತಿರುವ ಸಮಯ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
	ಬಿ. ಹೈಡ್ರಿಲ್ಲಾ	ನೀರಿನಲ್ಲಿ 1-1.5ppm	4.2	600	-
ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು	ಸೈಪರ್ ರೊಟಂಡಸ್, ಸೈನೋಡಾನ್ ಡಾಕ್ಟಿಲನ್, ಕಾಯೊಬ್ಲಬಾ sp. ಫುಸೆರಿಯಮ್ sp. ಟ್ರಿಡಾಕ್ Sp.	0.5	2.5	500	90
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ	ಚೆನೊಪೊಡಿಯಮ್ sp. ಅಂಗಾರಿಸ್ ಆರ್‌ವೆನ್‌ಸಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಥೆಮ ಪೊರ್ಟುಲಾಸ್ಟ್ರಮ್ ಸೈಪರ್ ರೊಟಂಡಸ್	0.25-0.51	1.06-2.125	500	100
ಹತ್ತಿ	ಡೈಕಾ ಆರ್‌ವೆನ್‌ಸಿಸ್ ಸೈಪರ್ ಎಸ್‌ಪಿ ಮೆಲ್ಲು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಕಳೆಗಳು.	0.3-0.5	1.25-2.125	500	150-180
ಸಾಸಿವೆ	ಇಯೆಯಾ ಸಿರಿಂಜಿಕಾ ಸೆಟೆರಿಯಾ sp.	1.0	4.25	500	120-150
ಗೋಧಿ	ಕಾಮೆಲಿನ ಬೆಂಗಲೆನ್‌ಸಿಸ್ ಯೋಜಾಯಿಯೆ ಬಿಸ್ಪಾ ಪಾಲಿಯಮ್ ಕಾಯಾಗಿಮ್	0.2-1.0	0.85-4.25	200-400	-
ಜಲಚರಗಳು	ಎ. ಸಿಸೊರಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್, ಅಗ್ರಿಯೆಮ್ ಕೋಸಿನ್ಸ್, ಕಾಮೆಲಿನ ಬೆಂಗಲೆನ್‌ಸಿಸ್ ಇಚಿನಾಮ್ಮಾ ಫ್ಲಾಗೆಲಿ, ಪೆನಿಕಾಮಿಲೆಂಸ್ ಸೈಪರ್ ಇರಿಯ, ಬ್ರಾಚಿರಿಯಾ ಮುಟಿಕಾ, ಡಿಜಿಟೆರಿಯಾ Sp. ಎಬಾಗಿಲಿಸ್ Sp. ಫ್ಲಿಂಬ್ರಿಸ್ಟಿಲಿಸ್ Sp.	1.0	4.25-1000	600-1000	-
ಅಕ್ಕಿ		0.3-0.8	1.25-4.0	250	
ರಬ್ಬರ್		0.3-0.6	1.25-2.5	670	

ಬಳಕೆಯ ವಿಧಿಗಳು: ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಕೆಮಾಡಿರಿ: ಕೈಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಪ್ರಾಯರ್ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರ, ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರ, ಅಥವಾ ಕಾಲಿಂದ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರ, ಅಥವಾ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ: 1. ಸರಣಿಯಿಂದಗೆ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಬಿರಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಬೆರೆಸಬೇಡಿ. 2. ಬಳಕೆದಾರರು ರಬ್ಬರ್ ಕೈಗವುಗಳು,ಬೂಟುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ ಕವಚ ಅಥವಾ ಧೂಳಿನ ಮುಖವಾಡ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ರಬ್ಬರ್ ಏಪ್ರನ್,ಗವುಸು ಅಥವಾ ಟೋಪಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.

ವಿಷಕಾರಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ತಿರಿಕಿ, ಮೂಗಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಕರುಳಿನ ಸಡಿಲತೆ ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ನುಂಗಿದರೆ,ಗಟಲಿಗೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆರಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಾಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ. ಬಟ್ಟೆ ಕಳುಚಿಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕಳುಚಿತ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಗೊಳಿಸಿ. ಉಸಿರಾಡಲು ತಾಜಾ ಗಾಳಿ ಇರುವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿರಿ.

ಪ್ರತಿಮರುಹಾಕಿದ: ಧೂಮಿಯ ಕಿಡಿಗಳಿಂದ ಬಳಸಿದಾಗ ಉತ್ಪನ್ನವು ಪ್ರತಿಮರುಹಾಕಿಗೆ ಅಲ್ಲ.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ: ವಾಂತಿಯನ್ನು ಪರೇಸ ಪರೇಸ ಪ್ರಚೋದಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕಿಮಿನಾಶಕ ದೊಡೋಸ್ ಅಥವಾ ಫುಲ್ಲರ್‌ಗಳನ್ನು 30% ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿರುವ 500 ಮಿಲಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನೀಡಿ. 2-4 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ರೋಗಿಗಳಿಗಂದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ.

ಬಳಸದ ಕಂಟೇನರ್ ವಿಲೇವಾರಿ : 1. ಪರೂರ ಅಥವಾ ನಿರಿಂದ ಮಾರಿದ್ದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಗ್ಗಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸರಕ್ಕೆಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಕಡಾಯರು, ಸಸ್ಯನಾಶಕ ಸಂಸ್ಕರಕರು ಮತ್ತು ನಿವಾರಕಗಳ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.2. ಬಳಸದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಗಳ ಮಧ್ಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊಗೆ ಪಡಿಸಬಾರದು.3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮುಂದು ಮಾಸಗಳಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು.

ಶೇಖರಣಾ ವಿಧಾನ: 1. ಸಸ್ಯನಾಶಕವನ್ನು ಹೊರಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಕೋಣೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರಣದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಲೆಬಸನಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಅವರಣಗಳು ನಿರ್ವಹ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಸಸ್ಯನಾಶಕದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಮರದಲ್ಲಿಟ್ಟಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 2. ಸಸ್ಯನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವರಣಗಳು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮಾರಿದ್ದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಶುಷ್ಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ-ಬೆಳಕು, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಆತ್ಮತ್ಯಾಗ ಮರು-ಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿ: 48 ಗಂಟೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಸಸ್ಯನಾಶಕವನ್ನು ಲೇಬಲ್ / ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

Kannada

প্যারাকুয়েট ডাইক্লোরাইড ২৪% এস এল

কাপিক™

স্পর্শজনিত ভেষজনাশক

এটি একটি বাছাই করা, ছোঁয়াচে ভেষজনাশক, যার মধ্যে, ভারের হিসাব অনুযায়ী ২৪ শতাংশ সক্রিয় উপাদান প্যারাকুয়েট ডাই ক্ল'রাইড আছে যা ব্যাপক ভাবে ভারসাম্য রক্ষা করতে সহায়ক।

রাসায়নিক উপাদান:

প্যারাকুয়েট ডাইক্লোরাইড (১০০% ও/ও সক্রিয় উপাদান ভিত্তিক)	২৪.০০ ও/ও
ননিল ফেনল ইথিলিন অক্সাইড কনডেনসেট	০১.০০ ও/ও
কোকোমাইন ইথোক্সাইলেট	০৪.০০ ও/ও
সিলিকন- ডিফোমার	০০.১০ ও/ও
ডাই অ্যাসিড নীল	০০.০৫ ও/ও
ইমেলিক ডাই	০০.০৫ ও/ও
জল	Q.S. %
মোট:	১০০.০০ ও/ও

অনুমোদন :

ফসল	পোকার চলতি নাম	প্রতি হেক্টর মাত্রা সক্রিয় উপাদান (কি.গ্রাম)	ওষুধের পরিমাণ (লিটার)	জলের পরিমাণ (লিটার)	ওষুধ প্রয়োগের পর ফসল তোলা পর্যন্ত অপেক্ষা (দিন)
	বি. হাইড্রিল্লা	জলের মধ্যে ১-১.৫পিপিএম	৪.২	৬০০	-
আঙুর	সাইপ্রাস রোটুন্ডাস সিনডন ডাক্টাইলন, কনভলভুলাস এসপি, পোলিগালা এসপি ট্রাইডাক্স এসপি	০.৫	২.৫	৫০০	৯০
আলু	চেনোপডিয়ম এসপি আঙ্গলিস আলেনসিস ট্রিয়াম্থেমা মনোগোনা সাইপ্রাস রোটুন্ডাস	০.২৫-০.৫১	১.০৬-২.১২৫	৫০০	১০০
আখ	ডিজেরা আর্টেনসিস সাইপ্রাস ইরিয়া	০.৩-০.৫	১.২৫-২.১২৫	৫০০	১৫০-১৮০
গম	ঘাসযুক্ত এবং আগাছা সম্প্রসারিত	১.০	৪.২৫	৫০০	১২০-১৫০
চা	ইম্পেরেটা সিলিন্ড্রিকা সেটেরিয়া এসপি কমুলিনা বেহেনগালেনসিস বোরাহিয়া হিসপিডা	০.২-১.০	০.৮৫-৪.২৫	২০০-৪০০	-
জলজ আগাছা	এ. সিজেনিয়া এ.হাইড্রোনিয়া	১.০	৪.২৫-১০০০	৬০০-১০০০	-
ঢাল	ক্লেসিপস, এজরাটিম কনজিডস, কমুলিনা বেহেনগালেনসিস ইচিনোক্লোয়া ক্রুসগেলি, পেনিকামিলিপেনস সাইপ্রাস ইরিয়া,	০.৩-০.৮	১.২৫-৪.০	২৫০	
বনবর	গ্র্যাটারিয়া নিউটোকা, ডিজিটিরিয়া এসপি ইরাগ্রোস্টিস এসপি ফিমব্রিস্টাইলিস এসপি	০.৩-০.৬	১.২৫-২.৫	৬৭০	

ব্যবহারের পদ্ধতি ঃ উদ্ভিদ সুরক্ষা সরঞ্জাম ম্যানুয়ালী ব্যবহার করা উচিৎ। ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, হেণ্ড কম্প্রেশন স্প্রেয়ার বা পায়ের স্প্রেয়ার বা মোটরযুক্ত স্প্রেয়ারের মাধ্যমে ব্যবহার করুন।

সাবধানতা ঃ (১) পাতলা করার সময় নিশ্বাস ও ত্বকের স্পর্শকে বর্জন করুন। খালি হাতে মিশ্রণ করবেন না। (২) ব্যবহারকারীরা সম্পূর্ণ প্রতিরক্ষামূলক বস্ত্র পরিধান করে যেন ব্যবহার করেন যেমন রাপরের গ্লাভ্স, বুট এবং মুখের ঢাল বা বালুর মুখোশ এবং সামগ্রিক রাবার এ্যাপ্রোন, হুড অথবা টুপি।

বিষক্রিয়ার লক্ষণসমূহ ঃ ফুলন, নাক থেকে রক্তপাত, পেটের যন্ত্রণা, অন্ত্রের শিথিলতা, লিভার এবং কিডনির ব্যর্থতার লক্ষণ ইত্যাদি।

প্রাথমিক চিকিৎসা ঃ গিলে নিলে, গলার পিছনের অংশে সুড়সুড়ি দিয়ে বমি করাতে হবে। কাপড় দূষিত হলে সাবান ও জল দিয়ে ধুয়ে দিন। দূষিত কাপড় ও ত্বক ধুয়ে নিন এবং চোখে প্রচুর জলের ঝাপটা দিন। যদি কীটনাশক নিশ্বাসের মাধ্যমে শরীরের ভিতর চলে গেলে রোগীকে বিশুদ্ধ হাওয়ায় নিয়ে যান।

ফাইটোট'কসিসিটি ঃ ক্ষেত্রের প্রস্তাবনা মতে পণ্যটি তখন ফাইটোটক্সিট হয় না।

প্রতিষেধক ঃ বার বার বমি করিয়ে পেট ধুয়ে দিন। ৫০০ মিলি দিন। মৌখিক ভাবে ৩০% বেন্টো অথবা ফুলারের সাসপেনশন, ২-৪ ঘণ্টা পর পুনরাবৃত্তি করুন। লক্ষণগুলির চিকিৎসা করান।

ব্যবহৃত প্যাকেজের নিষ্পত্তি ঃ (১) নির্মাতা তথা উপযুক্ত কর্তাদের দায়িত্ব হল যে খালি প্যাকেট বা অতিরিক্ত উপাদানগুলির নিষ্পত্তি করা এবং নিরাপদ পদ্ধতির মাধ্যমে ধুয়ে নেওয়া যেন পরিবেশ ও জল দূষিত না হয়। (২) ব্যবহৃত প্যাকেটগুলি যেন পুনরায় ব্যবহার না করা যায় তাই তাদের বাইরে রাখা উচিৎ নয়। (৩) প্যাকেটগুলি ব্যবহারের পর ভেড়ে আবাসন থেকে সরিয়ে জ্বালিয়ে অথবা মাটিতে গেড়ে দিতে হবে।

সংরক্ষণের শর্ত ঃ (১) ভেষজনাশক প্যাকেটগুলিকে আলাদা-আলাদা কক্ষে, খাদ্যবস্তু রাখার কক্ষ থেকে দূরে আলাদা জায়গা অথবা আলমারিতে ভেষজনাশকের প্রমাণ এবং প্রকার অনুযায়ী তালা-চাবি দিয়ে রাখুন। (২) যে কক্ষে বা জায়গায় ভেষজনাশকগুলির সংরক্ষণ করা হবে তা যেন ভালভাবে তৈরী, শুকনো, আলোহাওয়াযুক্ত তথা পর্যাপ্ত ভাবে লম্বা চওড়া হতে হবে।

ছিটিয়ে দেওয়ার ৪৮ ঘণ্টা পর এলাকায় প্রবেশ করুন।

সতর্কতা ঃ এই লেবেল / লিফলেটে নির্দিষ্ট ভাবে লিখিত শস্য ছাড়া অন্য কোন শস্যে এই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না।

Bengali

পারাকোয়াট ডাইক্লোরাইড ২৪% এস. এল

কেপিক্™

স্বর্গ যুক্ত ঘাসবাঙ্গুঙা নাশক

এহা এক বন্ধায়ক নথুবা ঘাস-বাঙ্গুঙা নাশক ঔষধ যাহা মধ্যের মাত্রা হিসাবরে এহার ২৪ % সক্রিয় ৩ব্ধ পারাক্যাট ডাইক্লোরাইডর ত্রুবণ সহিত অবশ্যন্ত উপাদানর মিশ্রণর রহিছি।

রাসায়নিক ৱচনা :-

পারাক্যাট ডাইক্লোরাইড টেক (১০০% ও/ও সক্রিয় উপাদান ভিত্তিক)	২৪.০০ ও/ও
ননানিল ফেনল ইথিলিন অক্সাইড কনডেনসেট	০১.০০ ও/ও
কোকোমাইন ইথোক্সাইলেট	০৪.০০ ও/ও
সিলিকন- ডিফোমার	০০.১০ ও/ও
ডাই অ্যাসিড নীল	০০.০৫ ও/ও
ইমেলিক ডাই	০০.০৫ ও/ও
জল	Q.S. %
মোট:	১০০.০০ ও/ও

অনুমোদিত পরিমাণ :

শস্য	বন	প্রতি হেক্টর মাত্রা এ.আই (কি.গ্রাম)	সাংকেতিক পরিমাণ (লিটার)	পানী পরিমাণ (লিটার)	অপেক্ষা করিবলগীয় সময় (দিন)
	চাইপ্রাছ ব'ডিনডাচ	পানীত ১-১.৫ppm	৪.২	৬০০	-
আঙুর	চিনডন ডেকটাইলন কনভুলুলাস sp পোকটুলা sp ট্রাইডাক্স sp	০.৫	২.৫	৫০০	৯০
আলু	চেনোপডিয়াম sp এঙ্গলিচ আলেনটিং ট্রিয়ানথেমা মনোগোনা চাইপ্রাছ ব'ডিনডাচ	০.২৫-০.৫১	১.০৬-২.১২৫	৫০০	১০০
ফুলা	ডিজেরা আর্টেনটিচ চাইপ্রাছ ইরিয়া	০.৩-০.৫	১.২৫-২.১২৫	৫০০	১৫০-১৮০
গম	তৃনাবৃত অপতৃণবেয়োব	১.০	৪.২৫	৫০০	১২০-১৫০
চা	ইমপেবেটা চিলিড্রিকা সেটেরিয়া sp কমুলিনা বেহেনগেলেনচিচ্ বোরাবিয়া হিপিডা	০.২-১.০	০.৮৫-৪.২৫	২০০-৪০০	-
জলজ অপতৃণ	পাছপালাম কনজুগাটাম আইচোনিয়া ক্লেছিপগ	১.০	৪.২৫-১০০০	৬০০-১০০০	-
চাডিল	এজবাটাম কনজিডছ, কমুলিনা বেহেনগেলেনচিচ্ ইচিনোচোলয়া ক্রুসগেলি পেনিকামিলিপেনচ্ চাইপ্রাছ ইরিয়া ব্রাচারিয়া মিউটোকা	০.৩-০.৮	১.২৫-৪.০	২৫০	
বনবর	ডিজিরিয়া sp ইরাগ্রোচিচ্ sp ফ্রিমব্রিস্টাইলিচ্ sp	০.৩-০.৬	১.২৫-২.৫	৬৭০	

ব্যবহার পদ্ধতি ঃ উদ্ভিদ সুরক্ষা সরঞ্জাম মেনুয়ালি ব্যবহার করা উচিৎ। ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, হেণ্ড কম্প্রেশন স্প্রেয়ার অথবা ভবি স্প্রেয়ার অথবা মোটরযুক্ত স্প্রেয়ারর মাধ্যমত।

সাবধানতা ঃ (১) পাতলা করার সময়ত নিশ্বাস আরু ছালর সংস্পর্শ পরিহার করক। নগ্ন হাতত মিশ্রণ নকরিব। (২) ব্যবহারকারীবোরে সম্পূর্ণ প্রতিরক্ষামূলক কাপোড় পিন্ধি যেন ব্যবহার করে যেনে ৰবৰৰ গ্লাভচ, বুট আরু মুখৰ ঢাল অথবা বালির মুখোশ আরু সামগ্রিক ৰবৰ এপ্রোনে, হেড অথবা টুপি।

বিষক্রিয়ার উপলক্ষণ ঃ ফুলন, নাকৰ পৰা ৰক্তপাত, পেটৰ অসুস্থি, অন্ত্রৰ শিথিলতা, লিভাৰ আরু কিডনিৰ ব্যর্থতাৰ লক্ষণ আদি।

প্রাথমিক চিকিৎসা ঃ গিলি ললে, গ'লৰ পিছৰ অংশত সুৰসুৰা দি বমি কৰাব লাগিব। কাপোড় লেতেবা হলে সাবুন আরু পানীৰে ধুই লব। দূষিত ছাল আরু কাপোড় ধুই লওক আরু চকুত প্রচুৰ পানীৰ সিঞ্চন দিব। যদি কীটনাশক শ্বাসৰ মাধ্যমত দেহাৰ মাজত সোমোৱাল তেন্তে ৰোগীক নির্মল হাওয়

பாராகுவாத் டைகிலோ ரைட் 24% எஸ் எல்

கபிக்™

(தோடர்பு ஹேர்பபி ஸைட்)

இது தேர்வுஇலா தோடர்பு ஹேர்பபி ஸைட் 24 % w/w செயல்படும் உட்பொருட்கள் உடன் . பாராகுவாத் டைகிலோரைட் ஏ ஐ மொத்த துணையுடன் .

ரசாயன கலவை :

பாராகுவாத் டைகிலோரைட் டெக் (அடிப்படை 100% ஏ ஐ	24.00 % w/w
நோனில் பிநாயில் எதிலின் ஆக்ஸைட் சுருக்கியது	01.00 % w/w
கோக்னோ மைன் எதோக்ஸிலேட்	04.00 % w/w
சிலிக்கான -டைஃப்ஒ மர்	00.10 % w/w
டைஆசிட் நீலம்	00.05 % w/w
எடெடிக் டை	00.05 % w/w
தண்ணீர்	கி.கு %
மொத்தம்	100.00 % w/w

பரிந்துரை :

பயிர்	பூச்சியின் பொது பெயர்	டோசேஜ் பிரதி ha ஏ ஐ (kgs)	கலவை லிட்	தண்ணீரில் கலவை லிட்	காக்கும் நேரம் நாட்கள்
	பி ஹைடிரிலா	1-1.5பிபிஎம்		600	-
		தண்ணீரில்	4.2		
திராட்சை	சிபுரஸ் ரோடன்டெஸ்	0.5	2.5	500	90
	சைனோடொன் டாக்டாய்லோன்				
	கோனோபூலஸ் sp.				
	போடுலாகா sp.				
	டாரா டாக்ஸ் Sp.				
உருளை	செனோபோடியம் sp.	0.25-0.51	1.06-2.125	500	100
	அங்கேலிஸ் அரவெனஸில்				
	திரியாண்தேமா மோனோஜைனா				
	சிபுரஸ் ரோடன்டெஸ்	0.3-0.5	1.25-2.125	500	150-180
பஞ்சு	டிகோர அரவெனஸில்				
	சிபுரஸ் இரியா				
கோதுமை	புல் மற்றும் அகண்டஇலை	1.0	4.25	500	120-150
	காளைகள்				
தேயிலை	இம்பேரட்டா சிலிந்தரிக்கா	0.2-1.0	0.85-4.25	200-400	-
	செடேரியா sp.				
	கோமெலினா பெங்காலென்ஸில்				
	போர்ஹாவியா ஹில்பிடா				
	பாஸ்பலும் கொஞ்சுகட்டும்				
	அ எப்கோனியா	1.0	4.25-1000	600-1000	-
நீர் களைகள்	கிராஸ்டிஸ் பில்				
அரிசி	ஏகாட்டும் கோனாசியட்ல்,	0.3-0.8	1.25-4.0	250	
	கொமெலினா பெங்காலென்ஸில்				
	எகினோகோவா கருல்கலி,				
	பனிகம்ரேபென்ஸ்				
	சைபேரஸ்இரியா,				
	பிராசியரா மூட் ஒகா,				
	டிஜிடாரியா Sp.	0.3-0.6	1.25-2.5	670	
ரப்பர்	ஏராகரோஸ்டிஸ் Sp.				
	பிபிபிரில்ஸ்டைலிஸ் Sp.				

உபயோக வழிமுறை : செடி பாதுகாப்பு உபகரணம் உபயோகம் செய்தது. கைகளால் உபயோக நாப்சாக் ஸ்ப்ரேயர் அல்லது ஹேண்ட் காம்ப்ரேஷன் ஸ்ப்ரேயர் அல்லது ஃபுட் ஸ்ப்ரேயர் அல்லது மோட்டார் போடுந்திய ஸ்ப்ரேயர் முதலியன.

பாதுகாப்பு: 1 உள் கவாம் அல்லது சருமதோடு தோடர்பு வருவதை கலவை சமயம் தடுக்கவும். வெறும் கையால் கலக்க வேண்டாம் 2. உபயோகம் செய்பவர் முழு பாதுகாப்பு கை உறை காலன் மற்றும் முகஸ்டி அல்லது பழுதி மாஸ்க் உடன் முழுதான ரப்பர் உடை, கவசம் அல்லது தொப்பி அணியவேண்டும்.

விஷம் ஏறிய அறிகுறி: எரிச்சல் மூக்கில் ரத்தம் அடிவயிறு உபாதை வயிற்று போக்கு மற்றும் குடல் மற்றும் கிட்னி செயல் இழப்பு முதலியவை.

முதல் உதவி: முழுங்கினால் வாந்தி எடுக்க துண்டவும் தொடர்ந்து தொண்டை யை கிளரி.. துணி களங்கம் அடைந்தால் சோப் மற்றும் தண்ணீர் கொண்டு கழுவும் செய்யவும். களங்கபட்ட தோல் மற்றும் துணிகளை நிறைய நீரால் கழுவி. கவாம் செய்தால் நேரம்ஆகுளியை திறந்த வெள்ளிக்கு கொண்டு செல்லவும்.

விஷம்ஏறும் எந்த்ரபம்: பரிந்துரை படி உபயோகம் செய்தால் இந்த பொருள் விஷம் அல்ல.

மற்று மருந்து: தொடர்ந்து வாந்தி எடுக்க செய்து வயிரை கழுவவும். 500 ml ஸ்டோலியல் செய்ய பட்ட பேனடோவின் 500 ml அல்லது புவ்லெர்ஸ் உள்வழி கொடுக்கவும். 2-4 மணி நேரதிற்கு திரும்ப உபயோகம் செய்யவும். அறிகுறி ஏற்ப சிகிச்சை தரவும்.

உபயோகம் செய்த பண்டங்களை கைதைல்: 1) தயார் செய்பவர் ,கலவை செய்பவர் , மற்றும் உபயோகம் செய்பவரின் கடமை உபயோகம் செய்த பண்டங்களை நீரால் கழுவவது கற்றுபற மற்றும் நீர் களங்கத்தை தவிர்பது . உபயோகம் செய்த பண்டங்கள் வெளியே வைக்க படாது மறு உபயோகம் தடுக்க பட வேண்டும். 3)பண்டங்கள் உடைக்கபட்டு மனித இனம் வாழாத இடத்தில் புதைக்க பட வேண்டும்..

சேமிப்பு முறை: பூச்சி கொல்லி உள்ள பண்டங்களை தனிபட்ட அறைமிலோ அல்லது வீட்டிலோ தனிபட்ட அலமாரி யில், பூச்சிகொல்லியின் தன்மை மற்றும் அளவின் ஏற்றபடி சேமிக்க பட வேண்டும். 2). சேமிக்க உபயோகம் செய்யும் அரை அல்லது இல்லம் நான்கு கட்டபட்டு ,காப்பந்து, போதிய வெளிச்சம் உடன் காற்று ஒட்டமாய் போதிய அளவோடு விஷம் மற்றும் ஆவி தடுக்கும்படி இருத்தல் வேண்டும்

பிரத்யேக மறு நுழைவு காலம்: 48 மணி நேரம்.

எச்சரிக்கை: லீக்ஸ்பெட்டில் கூறியது தவிர வேறு எந்த பயிரிலும் பிரயோகம் செய்வது கூடாது.

Tamil

పారాక్వాట్ డైక్లోరైడ్ 24% ఎస్ ఎల్

కపిక్™

స్పర్శిత కలుపు మొక్కల నాశిని

ఇది ఎంపిక చేయబడిన స్పర్శిత కలుపు మొక్కల నాశిని. ఇందులో 24% భా/భా క్రియాశీల చురుకన పారాక్వాట్ డైక్లోరైడ్ ఎ.ఐ. పదార్థంతో పాటు ఇతర సమతూలిత పదార్థాలను కలిగియుంది.

రసాయనిక మిశ్రమము :

పారాక్వాట్ డైక్లోరైడ్ టెక్ (100% w/w ఎ.ఐ. ఆధారితం)	24.00 % భా/భా
నొనిల్ ఫేనల్ ఎథిలైన్ ఆక్సైడ్ కండెన్సేట్	01.00 % భా/భా
కొకువామైన్ ఎథిక్సిలేట్	04.00 % భా/భా
సిలికాన్-డిఫామర్	00.10 % భా/భా
డిఆసిడ్ బ్లూ	00.05 % భా/భా
ఎమెటిక్ డై	00.05 % భా/భా
నీరు	తగినంత %
మొత్తం :	100.00% భా/భా

సిఫారసులు :

పంట	కీటకము యొక్క వాడుక నామము	హెక్టారుకు మోతాదు ఎ.ఐ. (కే.గ్రా)	ఫార్ములేషన్ (లీ.)	నీటిలో కలుపు మోతాదు (లీ.)	పేయండే సమయం (రోజులు)
	బి. హైడ్రిల్లా	1-1.5ppm in water	4.2	600	-
ద్రాక్ష	సైపరస్ రొటుండస్	0.5	2.5	500	90
	సైపరస్ డాక్టిలస్				
	కోన్వాల్వులస్ ఎస్పి				
	పార్టులాక ఎస్పి				
	టిడిక్స్ ఎస్పి				
అలుగడ్డ	సెనోపోడియం ఎస్పి	0.25-0.51	1.06-2.125	500	100
	అంగేలిస్ అర్వెన్సిస్				
	ట్రియాంథెమా మోనోజైన				
	సైపరస్ రొటుండస్				
పత్తి	డిజెరా అర్వెన్సిస్	0.3-0.5	1.25-2.125	500	150-180
	సైపరస్ ఐరియా				
గోధుమ	గడ్డి మరియు వెడల్పు ఆకుల కలిగిన కలుపు మొక్కలు	1.0	4.25	500	120-150
తేయాకు	ఇంపేరాటా సిలిండ్రికా	0.2-1.0	0.85-4.25	200-400	-
	సెటేరియా ఎస్పి				
	కొమెలినా బెంగాలెన్సిస్				
	బోర్హావియా హిర్సిడ				
	పాస్పలమ్ కంజుగాటమ్				
నీటిలోని కలుపు మొక్క	ఎ. ఎచినోకోవా క్రసిపెస్	1.0	4.25-1000	600-1000	-
వరి	అగెరాటమ్ కొనికిడ్స్	0.3-0.8	1.25-4.0	250	
	కొమెలినా బెంగాలెన్సిస్				
	ఎచినోక్లోవా క్రుసిగాలి				
	పనికమ్రెపెన్స్				
	సైపరస్ ఐరియా				
	బ్రచయారియా ముటికా				
రబ్బర్	డిజిటేరియా ఎస్పి	0.3-0.6	1.25-2.5	670	
	ఎరాగ్రోస్టిస్ ఎస్పి				
	ఫిమ్బ్రిస్టిలిస్ ఎస్పి				

వాడుక నిర్జీకము : ప్లాంట్ ప్రొటెక్షన్ ఉపకరణము వాడుక : చేతితో ఉపయోగించే న్యాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్ వాడండి లేదా హ్యాండ్ కంప్రెషన్ స్ప్రేయర్ లేదా ఫూట్ స్ప్రేయర్ లేదా మొటర్ స్ప్రేయర్ మొదలైనవి.

జాగ్రత్తలు : 1. కలిసి సమయాన శ్వసించుటయో లేదా చర్మముపై పడుటయో జరు గరాదు. వట్టి చేతులతో కలుప రాదు. 2. వాడే వ్యక్తులు పూర్తి సురక్షత దుస్తులతో పాటు రబ్బరు గ్లోవ్‌లు, బూట్లు, ఫేస్ షీల్డ్ లేదా డస్ట్ మాస్క్ మరియు పూర్తిగా రబ్బర్ ఆప్రాన్, హుడ్ లేదా హ్యాట్ ధరించవలెను.

విషపూరిత లక్షణాలు : వికారము, ముక్కు నుండి రక్తము కారుట, ఉదరసంబంధమైన నొప్పి, కీళ్ళ నొప్పి మరియు లివర్ మరియు కిడ్నీ పని చేయకపోవుట మొదలైనవి.

ప్రథమ చికిత్స: ఒక చేళ మంగినట్లైతే, వెంటనే గొంతు వెనుక గిలిగింతతో వాంతి అయ్యేటట్లు చేయవలెను. దుస్తులకు మరియు చర్మంపై అంటితే వాటిని నబ్బు మరియు నీటితో బాగా కడుగవలెను. శ్వసించినట్లైతే రోగిని అరుబయట గాలి పీచే ప్రదేశమున కూర్చోబెట్టాలి.

ఫైటోటాక్సిసిటీ : ఫీల్డ్ రికమండేషన్ ద్వారా వాడితే ఈ ఉత్పన్నం ఫైటోటాక్సిక్ కాదు.

విరుగుడు : వాంతి పదే పదే చేయించి కడుపును కడగాలి. స్టెరిలైజ్డ్ బెంటో 30 % సస్పెన్షన్ 500 మి.లీ. ఇవ్వాలి లేదా నోటి ద్వారా ఇవ్వొచ్చు. 2 నుండి 4 గంటలు వ్యవధిలో ఇస్తూ ఉండాలి. అక్షణాన్ని అనుసరించి చికిత్స చేయాలి. వాడిన కంటైనర్లను పారవేయడం : 1. తయారీదారులు, కలుపు మొక్క నాశిని సూత్రీకరణదారులు, ప్రదర్శనకర్తలు ప్యాకేజీలు లేదా కడిగే నీరు పర్యావరణం లేదా నీరు కాలుష్యం కాకుండా తగిన జాగ్రత్తతో వ్యవహరించడానికి భాధ్యులు. 2. వాడిన ప్యాకేజీలు మరల వాడబడకుండా బయట పదిలివేయరాదు. 3. ప్యాకేజీలు పగులకొట్టి జంతువులు మేయు పచ్చిక బయళ్ళ నుండి దూరంగా పాతివేయవలెను.

నిల్వ చేయుట : 1. హార్బిసైడ్ కలిగిన ప్యాకేజీలు వేరు గదులలో నిల్వ చేయవలెను లేదా హార్బిసైడ్ యొక్క పరిమాణము మరియు ప్రభావము ననుసరించి దూరంగా గదులలో ప్రత్యేకముగా వేరు వేరు అల్మారలలో తాళం వేసి ఉంచవలెను. 2. హార్బిసైడ్ కలిగిన ప్యాకేజీలను నిల్వ చేయు గదులు తగిన కొలతలతో బలమైన కట్టడాలై మరియు పరిసరము మంచి వెలుతురు గాలి వస్తూ ఆవరి పోవు సౌకర్యము కలిగినవై యుండాలి.

పీచకారి చేసిన పిదప ప్రవేశించు వ్యవధి : 48 గంటలు

హెచ్చరిక : లేబల్/లీఫ్‌లెట్‌లో పేర్కొనిన పంటలకు కాకుండా ఇతర పంటలకు దీనిని వాడకూడదు.

Telugu

पैराकाट डाइक्लोराइड 24% एस एल

कापिक™

स्पर्शीय खरपतवारनाशक

यह एक अचुनिंदा स्पर्शीय घास-पात नाशक है जिसमें भार के हिसाब अनुसार २४ प्रतिशत सक्रिय तत्व पैराकाट डाई क्लोराइड २४ प्रतिशत घुलनशील तरल है बाकी अन्य सहयोगी पदार्थ है।

रासायनिक संरचना :

पेराकाट डाइक्लोराइड ए.आई भारानुसार १००% स.त. पर आधारित	२४.०० % भार/भार
नोमाइल फिनोल एथीलीन ओक्साइड कन्डेसेनट	०१.०० % भार/भार
कोको अमिनो इथोक्सिलेट	०४.०० % भार/भार
सिलिकोन- डिफोमर	००.१० % भार/भार
डाई एसिड नीला	००.०५ % भार/भार
इमेटिक डाई	००.०५ % भार/भार
पानी	पर्याप्त मात्रा % भार/भार
	कुल : १००.००% भार/भार

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टर मात्रा स.तत्व (किग्रा.)	संरचना (लीटर)	पानी की मात्रा (ली.)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों में)
	ब.हाइडिला	१-१.५ पानी में	४.२	६००	–
		पीपीएम			
अंगूर	मोथा	०.५	२.५	५००	९०
	दूबघास				
	कल्फा				
	फुल्ली				
आलू	बथुआ	०.२५-०.५१	१.०६-२.१२५	५००	१००
	कृष्णा				
	पत्थर चटटा				
	मोथा				
कपास	लहसुआ	०.३-०.५	१.२५-२.१२५	५००	१५०-१८०
	फूला मोथा				
गेंहू	घास व चौड़ी पती	१.०	४.२५	५००	१२०-१५०
	वाले खरपतवार				
चाय	लांगली	०.२-१.०	०.८५-४.२५	२००-४००	जरूरी नहीं
	वदरा-वदरी				
	नकउआ				
	मदन मथी				
	गढीली घास				
जलीय खरपतवार	अ.जलकुभी	१.०	४.२५-१०००	६००-१०००	–
धान	महा-कौआ	०.३-०.८	१.२५-४.०	२५०	
	कनकौआ				
	समां				
	कोच घास				
	मोथा				
	वंदरी				
रबड	क्रेब घास	०.३-०.६	१.२५-२.५	६७०	
	रामदाना				
	बड़ाकोरा				

उपयोग के लिए निर्देश : उपयोग में आने वाले यंत्र: पीठ पर लादने वाला छिड़काव यंत्र या हस्तचालित या पैर चालित यंत्र या शक्ति चालित छिड़काव यंत्र आदि।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां: घासपतनाशक को मूंघे नही तथा स्पर्श से बचे। घासपतनाशक को नंगे हाथों से न मिलाएँ। उपयोगकर्ता को बचाव के पूरे कपडें तथा रबर के दस्ताने, जूते, मूंह ढकने का मुखौटा, कन्टोप तथा एक पूरे शरीर को ढकने वाला ओवर कोट व हैट शामिल है।

विष के लक्षण : खाज खुजली, नाक से खून आना, पेट में गडबडी, जाँडो का ढीला होना, दर्द होना, लिवर तथा मूत्राशय को ठीक से काम न करना आदि।

प्राथमिक चिकित्सा : निगले जाने पर गले के पिछले हिस्से में गुदगुदी करके उल्टी करायें। दूषित त्वचा को अच्छी तरह धो डालें। दूषित त्वचा तथा वस्त्रों को स्वच्छ पानी से धो डालें तथा प्रभावित आंखों को पानी से खूब धोयें। यदि कीटनाशक साँस के दुवारा शरीर में चली गई हो तो रोगी को स्वच्छ और ताजी हवा में ले जायें।

पौधविशक्तता : कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है, लक्षणानुसार इलाज करें।

विष नाशक : रोगी को बार बार उल्टी कराकर पेट साफ करायें। स्टेरिलाइज़ड बेन्टोनाइट या मिट्टी का ३० प्रतिशत का घोल ५०० मिली. मूंह से दें। २ से ४ घंटों बाद यह प्रक्रिया दुहरायें। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. निर्माताओ तथा उपयोगकर्ताओ का कर्तव्य है कि खाली डिब्बों या बची हुई दवाओ और धोवन का निपटारा सुरक्षित तरीके से इस प्रकार करें कि जिससे पीने के पानी तथा वातावरण के प्रदूषण को रोका जा सके। २. प्रयोग किये गये डिब्बों को दुवारा प्रयोग के लिये बाहर खुला न छोडें। ३. पैकेटो को उपयोग के बाद तोडफोड़ कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ दें।

संग्रहण की शर्तें: १. घासपतनाशक के पैकेटों को अलग – अलग कमरो में खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले कमरो से दूर अलग जगह पर या आलमारियो में दवा के प्रमाण एवं प्रकार के हिसाब से ताला चाबी में अलग-अलग रखें। २. जिस कमरें या जगह में घासपतनाशक का भण्डारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाशयुक्त, हवादार तथा पर्याप्त लम्बा चौडा होना चाहिये।

छिडकाव के ४८ घंटे बाद क्षेत्र में प्रवेश करें।

चेतावनी: लेबल/लीफलेट में दी गयी फसलों व कीटों पर इसका उपयोग न करें।

Hindi

PARAQUAT DICHLORIDE 24% SL

KAPIQ™

(Contact Herbicide)

It is non selective, contact herbicide which containing 24% w/w active ingredient, Paraquat Dichloride a.i. by mass balance adjuvants.

Chemical Composition:

Paraquat Dichloride Tech (based on 100% w/w a.i.)	24.00 % w/w
Nonyl phenol ethylene oxide condensate	01.00 % w/w
Cocoamine ethoxylate	04.00 % w/w
Silicone- Difoamer	00.10 % w/w
Dye acid blue	00.05 % w/w
Emetic Dye	00.05 % w/w
Water	Q.S. %
Total :	100.00% w/w

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage per ha. a.i. (kgs)	Formulation (Ltrs.)	Dilution in Water (Ltrs.)	Waiting Period (days)
	B. Hydrilla	1-1.5ppm in water	4.2	600	-
Grapes	*Cyperus rotundus, Cynodon dactylon, Convolvulus sp. portulaca sp. Tridax Sp.*	0.5	2.5	500	90
Potato	*Chenopodium sp. Angallis arvensis Trianthema monogyna*	0.25-0.51	1.06-2.125	500	100
Cotton	*Cyperus rotundus Digera arvensis*	0.3-0.5	1.25-2.125	500	150-180
Wheat	*Cyperus iria* Grassy & Broadleaved weeds.	1.0	4.25	500	120-150
Tea	*Imperata cylindrica Seteria sp. Commelina benhgalensis Boerhavia hispida Paspalum conjugatum*	0.2-1.0	0.85-4.25	200-400	-
Aquatic Weeds	*A. Eichhonia crassipes,*	1.0	4.25-1000	600-1000	-
Rice	*Ageratum conyzides, Commelina benhgalensis Echinochloa crusgalli, Panicumrepens Cyperus iria, Brachiaria mutoca,*	0.3-0.8	1.25-4.0	250	
Rubber	*Digitaria Sp. Eragrostis Sp. Fimbristylis Sp.*	0.3-0.6	1.25-2.5	670	

Direction of Use : Plant Protection equipment used: Use manually operated Knapsack sprayer or hand compression sprayer or foot sprayer or motorized sprayer etc.

Precaution : 1. Avoid inhalation and skin contact while diluting.Do not mix with bare hands. 2. The users should use full protective clothings which include rubber gloves, boots and either face shield or dust mask and overall rubber apron, hood or hat.

Symptoms of Poisoning : Irritaion, nose bleeding, abdominal discomfort, looseness of bowels & signs of liver and kidney failure etc.

First Aid : If swallowed, induce vomiting by tickling the back of the throat. If clothing is contaminated, wash the same with soap and water. Wash contaminated skin and clothes and irrigate eyes with plenty of water. If inhales, remove the patient in the fresh air.

Phytotoxicity : The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Antidote : Induce vomiting repeatedly and wash out stomach. Give 500ml. of 30% suspension of sterilized bento or fullers each orally. Repeat after 2-4 hours. Treat Symptomatically.

Disposal of used container : 1. It shall be the duty of manufactures, formulators of herbicide and operators to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and burried away from habitation.

Storage Conditions : 1. The packages containing the herbicide shall be stored in seperate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing of the articles particularly articles or shall be kept in seperate almirahs under lock and key depend upon the quantity and nature of the herbicide. 2. The rooms or premises meant for storing the herbicide shall be well built, dry, well -lit, ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapours.

Optimal re-entry period : 48 hrs.

Caution: Not to be used on Crops other than specified on this Label/Leaflet.

English

Read Instructions Leaflet before use

उपयोग से पहले निर्देश पत्रिका पढ़े।

For Agricultural use only

केवल कृषि उपयोग के लिए

Store in a cool, dry and well ventilated place.

ठंडी, सूखी और अच्छी तरह हवादार जगह में संग्रह करें।

PARAQUAT DICHLORIDE 24% SL

KAPIQ™

(Contact Herbicide)

पैराकाट डाइक्लोराइड २४% एस एल

कापिक™

(स्पर्शीय खरपतवारनाशक)

CIR-158049/2019-Paraquat Dichloride (SL) (394)-491

TRADITION • INNOVATION • TRUSTESHIP

KRISHI RASAYAN GROUP

SINCE 1966 IN AGROCHEMICALS

Manufactured and Marketed By:

KR Lifesciences Pvt. Ltd.

29, LALA LAJPAT RAI SARANI,

KOLKATA - 700 020, INDIA

E-mail : kr@krishirasayan.com

निर्माता एवं विपणनकर्ता :

केआर लाईफसाईन्सेस प्रा.लि.

29, लाला लाजपत राय सारनी, कोलकाता – 700020

For manufacturing unit address see first three characters of batch no. and see below :

KRR :

Maitapur, P.O. Ranital, Balasore,

Orissa, PIN - 756 111

Mfg. Lic. No. e-Lic/INSECTI/MAN-PP-2

KRK :

Joykrishnapur, P.O. Bonhoogly II

Sonarpur, South 24 Parganas,

West Bengal, PIN - 700 103

Mfg. Lic. No. MPP/ILC/145/K-2

Customer Care Detail :

KR LIFESCIENCES PVT. LTD.

29, Lala Lajpat Rai Sarani, Kolkata - 700 020

Toll Free No. : 18001211800

email : customercare@krishirasayan.com

Not to be used on crops other than specified on this leaflet

DANGEROUS TO RE-USE EMPTY CONTAINERS/PACKAGES