தியோடிகார்ப் 75% W.P.
(பூச்சிக்கொல்லியை தொடர்பு கொள்ளவும்)

முட்டைக்கோசின் வைர முதுகு அந்துப்பூச்சி, கத்திரிக்காயை சுட்டு காய்த்து துளைப்பான், மிளகாயில் காய் துளைப்பான் மற்றும் உருளுத்து பயிர்களில் காய் துளைப்பான் பருத்தியின் காய்ப்புழுக்களை கட்டுப்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

பரிந்துரை:

பயிர்	பூச்சிகளின் பொதுப் பெயர்	டோஸ்/ஹெ		நீரில் கரைசல் (லிட்டர்)	கடைசி தெளிப்புக்கும் அறுவடைக்கும் இடையேயான காத்திருப்பு காலம்
		ஏ.ஐ. (கிலோ)	ஃபார்மு-லேஷன் (கிலோ)		
உளுந்து	காய் துளைப்பான் (ஹீலியோதிஸ் எஸ்பீ.) மருகா எஸ்பீ.	0.468-0.562	0.625-0.750	373-500	17
பருத்தி	பருத்தி காய்ப்புழுக்கள்	0.75	1.0	500	30
முட்டைக்-கோஸ்	வைரம் பிண்டும் அந்துப்பூச்சி	0.75-1.00	1.0-1.33	500	7
கத்திரிக்-காய்	பழம் & கூட்டு துளைப்பான்	0.47-0.75	0.625-1.000	500	6
மிளகாய்	பழம் துளைப்பான்	0.47-0.75	0.625-1.000	500	6

பயன்பாட்டின் திரை:
PP உபகரணம்: திருப்திகரமான பூச்சிக் கட்டுப்பாட்டுக்கு, நாப்சாக், ஏர் பிரஷர் ஃபுட் பம்ப், ஹேண்ட் ராக்கர் அல்லது பவர் ஓபன் ஸ்ப்ரேயிங் மிஷின்களுக்கு தரப்படுத்தப்பட்ட அதிக அளவு தெளிப்பான்களைப் பயன்படுத்துவது நல்லது.

தெளிப்பு தயாரிப்பு:
தேவையான அளவு தியோடிகார்ப் 75% W.P. ஒரு சிறிய அளவு தண்ணீரில் சேர்க்கவும். மற்றும் ஒரு பெல்லிய பேஸ்ட் போன்ற கலவையை தயார் செய்ய நன்கு கலக்கவும். பிறகு பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவு தண்ணீரைச் சேர்த்து மீண்டும் ஒரு மரக் குச்சியின் உதவியைக் கலக்கவும். கை பயன்படுத்த வேண்டாம்.

தெளிப்பு எம்பய:
ஒரே மாதிரியான தெளிப்பு இலையின் மேற்பரப்பைக் கொடுக்கவும். நாளின் சில பகுதிகள் வடாகவோ அல்லது காற்றோட்டமாகவோ அல்லது பக்கமாக ஈரமாகவோ இருக்கும் வரை தெளிப்பதைத் தவிர்க்கவும். காற்றின் திசைக்கு எதிராக தெளிக்க வேண்டாம். வேலை முடிந்ததும் ஸ்ப்ரேயரை தண்ணீரில் நன்கு சுத்தம் செய்யவும்.

விண்ணப்பிக்கும் ஏரம்:
முட்டைக்கோஸ்: விதைத்த 40 முதல் 45 நாட்களுக்குப் பிறகு முதல் தடவலாம். பூச்சியின் தீவிரத்தைப் பொறுத்து 7 முதல் 10 நாட்கள் இடைவெளியில் அடுத்தடுத்த தெளிப்புகளை (2 முதல் 3 வரை) கொடுக்கலாம். பருத்தி: விதைத்த 40 முதல் 45 நாட்களுக்குப் பிறகு முதல் தடவலாம். பூச்சியின் தீவிரத்தைப் பொறுத்து 10 முதல் 15 நாட்கள் இடைவெளியில் தெளிப்பான் (3 முதல் 4 வரை) கொடுக்கலாம். கத்தரிக்காய்: முதல் தெளிப்பு 45-55 DAT (நாற்று நடவு செய்த நாட்கள்) துளிர் மற்றும் காய் துளைப்பான் தாக்குதலின் போது கொடுக்கப்பட வேண்டும், பின்னர் பூச்சித் தாக்குதலின் அளவைப் பொறுத்து 3-4 தெளிக்கலாம்.

முன்னெச்சரிக்கை:
1. உணவுப் பொருட்கள், வெற்று உணவுப் பொருட்கள் கொள்கலன்கள் மற்றும் விலங்குகளின் உணவு ஆகியவற்றிலிருந்து விலகி இருங்கள். 2. வாய், கண்கள் மற்றும் தோலுடன் தொடர்பு கொள்ளுதைத் தவிர்க்கவும். 3. ஸ்ப்ரே மிஸ்ட்டை உள்ளிழுப்பதைத் தவிர்க்கவும். காற்று வீசும் திசையில் தெளிக்கவும். 4. தெளித்தபின் அசுத்தமான ஆடைகள் மற்றும் உடலின் பாகங்களை நன்கு துவைக்கவும். 5. தெளிக்கும் போது புகைபிடிக்க காதீர்கள் , குடிக்காதீர்கள் , சாப்பிடுங்கள் மற்றும் மெல்லாதீர்கள். 6. கலந்து தெளிக்கும் போது முழு பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணியவும்.

விஷத்தின் அறிகுறிகள்:
தலைவலி, தலைச்சுற்றல், தலைச்சுற்றல், குமட்டல், மங்கலான பார்வை, வயிற்றுப் போக்கு, வலிப்பு, சிறுநீர் அடங்காமை , வியர்வை, அதிகப்படியான கண்ணீர் மற்றும் உமிழ்நீர் ஏற்படலாம்.

முதலுதவி :
1. விழுங்கினால், தொண்டையின் பின்புறத்தில் கூச்சலிடுவதன் மூலம் வாந்தியெடுக்க வேண்டும். வாந்தி தெளிவாகும் வரை அதை மீண்டும் செய்யவும். நோயாளி சுயநினைவிழந்தி இருந்தால் வாந்தி எடுக்க வேண்டாம். 2. ஆடை மற்றும் தோல் பாகப்பட்டிருந்தால், ஆடைகள் மற்றும் துணிகளை அகற்றி, அதத்தமான தோலை ஏராளமான சோப்பு மற்றும் தண்ணீரில் கழுவவும். 3. கண்கள் மாசுபட்டிருந்தால், 10 முதல் 15 நிமிடங்களுக்கு ஏராளமான உப்பு/சுத்தமான தண்ணீரில் கழுவவும். 4. உள்ளிழுத்தால், நோயாளியை புதிய காற்றுக்கு அகற்றவும்.

மாற்று மருந்து:
1. நோயாளியை உடனடியாக அட்ரோபினைஸ் செய்து, 2 முதல் 4 மி.கி வரை மீண்டும் மீண்டும் அளவு அட்ரோபினைசேஷனைப் பராமரிக்கவும். 5 முதல் 10 நிமி. இடைவெளியில் அட்ரோபின் சல்பேட் நரம்பு வழியாக. 25 முதல் 50 மி.கி. ஒரு நாளில் அட்ரோபின் தேவைப்படலாம். மேலும் அட்ரோபின் நிர்வாகத்தின் தேவை அறிகுறிகளின் தொடர்ச்சியால் வழிநடத்தப்படுகிறது. உமிழ்நீரின் அளவு அளவை சரிசெய்வதற்கான ஒரு பயனுள்ள அளவுகோலாகும். 2. 2 PAM போன்ற எந்த ஆக்சிமையும் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

பயன்பாட்டு கொள்கலனை கையாளுதல்:
1. வெற்றுப் கொள்கலன்கள் உடைக்கப்பட்டு, குடியிருப்பில் இருந்து புதைக்கப்பட வேண்டும். 2. பயன்படுத்திய கொள்கலன் அல்லது பொட்டலம் மீண்டும் பயன்படுத்துவதைத் தடுக்க வெளியில் விடக்கூடாது. 3. சுற்றுச்சுவரும் அல்லது நீர் மாசுபாட்டைத் தடுக்கும் வகையில் வெற்றுப் பொட்டலங்கள் அல்லது உபரிப் பொருட்கள் மற்றும் கழுவுதல் ஆகியவற்றை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்த வேண்டும்.

களஞ்சிய நிலைமை :
1. பொருளைக் கொண்ட பேக்கேஜர்கள் மற்ற பொருட்களைச் சேமிப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் அறை அல்லது வளாகத்திலிருந்து தனித்தனி அறைகள் அல்லது வளாகங்களில் சேமிக்கப்படும் அல்லது அளவு மற்றும் தன்மை மற்றும் தன்மை அல்லது பொருள் ஆகியவற்றைப் பொறுத்து பூட்டு சாவியின் கீழ் தனி அல்மிராக்களில் வைக்கப்படும். 2. பொருளைச் சேமிப்பதற்கான அறை அல்லது வளாகம் நன்கு கட்டப்பட்டதாகவும், உலர்ந்ததாகவும், நன்கு வெளிச்சமாகவும், காற்றோட்டமாகவும், நீராவிகளால் மாசுபடுவதைத் தவிர்க்க போதுமான அளவுகளைக் கொண்டதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

வேதியியல் கலவை:

தியோடிகார்ப் (a.i.)	75.00% w/w
சிதறல் முகவர் (டீனாப்தில் மெத்தனால் சல்போனிக் ஆமில்தி சோடியம் உப்பை அடிப்படையாகக் கொண்ட அயோனிக் சர்பாக்டாண்ட்)	5.00% w/w
ஈரமாக்கும் முகவர் (நாப்தலீன் சல்போனேட்.)	3.00% w/w
செயலற்ற பொருள் (சீனா களிமண்)	Q.S.% w/w
மொத்தம்	100.00% w/w

மறு நுழைவு காலம்: 48 மணி.
எச்சரிக்கை: இந்த லேபிள்/துண்டறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைத் தவிர வேறு பயிர்களில் பயன்படுத்தக்கூடாது.

தயோடிகார்ப் 75% W.P.
(கீடநாசினியுமாயி பண்டவுபுடுக)

காபேஜிலை வயரன் ஸாக் ஸிசாபலம், வசுதினியுக்க வெடியும் கய் துரபும், மூதுகின் கய் துரபுன், ஊழுன் விதுகதிலை கய் துரபுன் பருமுதியிலை பழுகமக் எஃனாபி நியுரன்மிசாரன் ஶுபாரன் சுடுழுாரு.

ஶுபாரன்ஶ:

விதுகன்	கீடனின் பேர்	டோஸேர்/HA		வெதுமுதன் ஸேர்லிகன்	அவஸா-னஸ்ப்ரே முருதன் விதுவெடுர் வரையுதுது வெர்ரிஸ் பிரிய் திவாமுதன்
		AI (kg)	ஃபோர்மூலேஷன் (KG)		
ஊழுாா்	பொட் துரபுன் (ஹீலியோதுதிஸ் எஸ்பி.) மரூக எஸ்பி.	0.468-0.562	0.625-0.750	373-500	17
பரபுத்தி	பரபுத்தி பழுகமக்	0.75	1.0	500	30
காபேஜிட்	஡யமன்ட் ஸிரிலெக் பழுகு	0.75-1.00	1.0-1.33	500	7
வசுதுன	பழம் & ஷுட் பொரன்	0.47-0.75	0.625-1.000	500	6
ஶுதுக்	கய் துரபுன்	0.47-0.75	0.625-1.000	500	6

உபயோகமுள்ளதின் நிலை:
பிபி உபகரணங்கள்: சூபூரிகரமாய கீடனியுந்ரணுளுதின், நாப்சாக், ஏர் பிரஷர் ஃபுட் பம்ப், ஹேண்ட் ராக்கர் அல்லது பவர் ஓபன் ஸ்ப்ரேயிங் மிஷின்களுக்கு தரப்படுத்தப்பட்ட அதிக அளவு தெளிப்பான்களைப் பயன்படுத்துவது நல்லது.

ஸ்ரேயு தயுராமகுவுக்கலி:
ஒரு சுபாரிய அளவிலி வெதுமுதன் ஸேர்லிகன் 75% W.P. ஒரு சிறிய அளவு தண்ணீரில் சேர்க்கவும். மற்றும் ஒரு பெல்லிய பேஸ்ட் போன்ற கலவையை தயார் செய்ய நன்கு கலக்கவும். பிறகு பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவு தண்ணீரைச் சேர்த்து மீண்டும் ஒரு மரக் குச்சியின் உதவியைக் கலக்கவும். கை பயன்படுத்த வேண்டாம்.

ஸ்ரேயு பெசுதுன விலிமு:
ஒரே மாதிரியான தெளிப்பு இலையின் மேற்பரப்பைக் கொடுக்கவும். நாளின் சில பகுதிகள் வடாகவோ அல்லது காற்றோட்டமாகவோ அல்லது பக்கமாக ஈரமாகவோ இருக்கும் வரை தெளிப்பதைத் தவிர்க்கவும். காற்றின் திசைக்கு எதிராக தெளிக்க வேண்டாம். வேலை முடிந்ததும் ஸ்ப்ரேயரை தண்ணீரில் நன்கு சுத்தம் செய்யவும்.

விண்ணப்பிக்கும் ஏரம்:
முட்டைக்கோஸ்: விதைத்த 40 முதல் 45 நாட்களுக்குப் பிறகு முதல் தடவலாம். பூச்சியின் தீவிரத்தைப் பொறுத்து 7 முதல் 10 நாட்கள் இடைவெளியில் அடுத்தடுத்த தெளிப்புகளை (2 முதல் 3 வரை) கொடுக்கலாம். பருத்தி: விதைத்த 40 முதல் 45 நாட்களுக்குப் பிறகு முதல் தடவலாம். பூச்சியின் தீவிரத்தைப் பொறுத்து 10 முதல் 15 நாட்கள் இடைவெளியில் தெளிப்பான் (3 முதல் 4 வரை) கொடுக்கலாம். கத்தரிக்காய்: முதல் தெளிப்பு 45-55 DAT (நாற்று நடவு செய்த நாட்கள்) துளிர் மற்றும் காய் துளைப்பான் தாக்குதலின் போது கொடுக்கப்பட வேண்டும், பின்னர் பூச்சித் தாக்குதலின் அளவைப் பொறுத்து 3-4 தெளிக்கலாம்.

முன்னெச்சரிக்கை:
1. கசடுபாறுமுக்கலி, ஶுமுமாய கசடுபாறுமுக்கலி பாத்ரங்கள், மூருகங்களுக்கு கலனை எஃனாவலிகி ஸிரா் ஹுகாரிர்ணுக. 2. பாய, கணுக்கலி, பாக்கை எஃனாவலுமாயுள்ள ஸஸ்பர்கை ஶெரிபாலுக. 3. ஸ்ரேயு மிஸ்ஸ் ஶஸ்கிலுாரன் ஶெரிபாலுக. காபாரெகி திசையலி தஜிகுக. 4. ஸ்ரேயு பெயுதிரா் ஶேஷம மலிநமாய பாரூரணுதுமு ஶரீரமாபாணதுமு நாரானாயி கழுகுக. 5. ஸ்ரேயு பெயுதிரபோல் புகவலிகிலுரு, கூடுகிலுரு, ஃபக்ஷணம கழிகிலுரு, பாரயுகிலுரு. 6. கிஜிகிலு பெயுதிபோயு ஸ்ரேயு பெயுதிபோயு பூரணு, ஸம்ரக்ஷண பாரூமு ஶரிகிலுக.

விஷயுமாயுமுக உபகுணாணங்கலி:
தலைவோன, தலைசுற்றுக, தலைசுற்றுக, குமட்டல், மங்கலான பார்வை, வயிற்றுப் போக்கு, வலிப்பு, சிறுநீர் அடங்காமை , வியர்வை, அதிகப்படியான கண்ணீர் மற்றும் உமிழ்நீர் ஏற்படலாம்.

ப்ரமத ஶுஶ்ரூஷுக :
1. விழுங்கியாலும், தொண்டையுதை பின்ஶாமுதின் இக்கிஜிவுடுத்தி ஷுசிரி ஜுனாகுக. ஷுசிரி பூக்தாகுாாாதுபாக ஜுன் ஆுவதிண்கலி. ரோமி அணோயாபாபமலியாணங்கலி ஷுசிரி ஜுனாகுரூா். 2. பாபூகுணுதுமு சர்ஜாபு மலிநமாயலி, பாபூகுணுதுமு பாபூகுணுதுமு ரீக்கை பெயுதுக, மலிநமாயு சர்ஜாபு ஶாரமுதா ஸோபூமு வெஜுதாபு ஶாரமுதா பெயுதுக்கி கழுகுக. 3. கணுமுக்கலி மலிநமாயலி, ஶாரமுதா ஜெழுாவுதுமு/ஶுரமுஜலுப ஶாரமுதா ஏகுவேஶாம 10 தமுதல 15 மிநிடு பாபூகுணுதுமு கழுகுக. 4. ஶபாசிகுகுகயாரணங்கலி, ரோமியா ஶுமுவாபயுயாலுவுக்கி மாரூக.

ரூமுவுராா்:
1. ரோமியா ஜுநாடி அடுக்ரோபினைஸ் பெயுதுகயும 2 தமுதல் 4 மிஜுிஶாரம பாவ ஆுவதிண்தாலுதுமு ஶுமாபூகுணுக ஶாரமுதா பூரணு அடுக்ரோபினைஸேஷன் ஸிபாரிர்ணுதுகயாயு பெயுதுக. 5 தமுதல் 10 மிநிடு/ வாவ ஜுநாவுதுமலி அடுக்ரோபின் ஸுல்ஹேரு ஸிரயலியுதுக. 25 தமுதல 50 மிஜுிஶாரம பாவ. ஒரு நிரபாமுதினாலுதுமலி அடுக்ரோபின் ஆுவஶுமாயி வாரேக்கானு. கூடுதுமலி அடுக்ரோபின் அடுஜிநிஸ்ரேஷனுதி ஆுபஶுகுக ரோமுகுகயாணதுமு துமுரீகுதுமலி நாயிகுவுபூகுநு. ஶுமாரு (க்ரீகுரிக்குாாதுமினுமு ஜுவுயாபாபாயாவு மாரனுஜுபயாரா் ஜுலிநரீலிநு ஸுபாபூி. 2. 2 PAM பாபலுயுமு ஒரு ஒஜுிஜுாு ஜுபயோகாரிக்குரூா்.

ஜுபயோகா கஜுனயூா் ரீகுக பெயுதுமு:
1. ஶுமாரு பாத்ரங்கள் பாரஸ்ஸபலத்ா் நிநா் பூபாடுடுா் கூயிபூடுகிறுனாு. 2. ஜுபயோபாபூடு கஜுனயுாோ பாகுகுகோ அவயுதுக பூபாருபுபயோகமு தூகயுாாாதுா் பூபாா் பயுதுகுரூா். 3. பாரிபாபிதி அலுதுமலி ஜுல மலிநமீகுகமாு தூகயுாாாதுா் ஶுமாரு பாகுகுகுமுகுகி அலுதுமாலி கிபூபாமுதுமு பாபூகுணுதுமு கஜுனயுாமு கஜுனயுாலி ஸுரகுகயிகுமாயு ரீதியிலி ரீகுகுக பெயுதுமு.

**ஸுகுகுரமா வுபயோபகுகுகலி

ಥಿಯೋಡಿಕಾರ್ಬ್ 75% W.P.
(ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ)

ಎಲೆಕೋಸಿನ ಡೈಮಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪತಂಗ, ಬದನೆ ಚಿಗುರು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪುಬೇಳೆ ಬೆಳಗಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು ಹತ್ತಿಯ ಬಾಳುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆ	ರೋಗಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಎ.ಐ. (ಕೆಜಿ)	ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಕೆಜಿ)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ (ಎಲ್ಟರ್)	ಹಿಂದಿನ ಸಿಂಪರಣೆ–ಯಾದ ನಂತರ ಕಟಾವಿನವರೆಗಿನ ನಿರೀಕ್ಷಣ ಅವಧಿ (ದಿನ)
ಕಪ್ಪು ಗ್ರಾಂ	ಕಾಯಿ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು (ಹೆಲಿಯೊಥಿಸ್ ಎಸ್ಪಿ.), ಮಚಕಾ ಎಸ್ಪಿ.	0.468-0.562	0.625-0.750	373-500	17
ಹತ್ತಿ	ಹತ್ತಿ ಬೊಲ್ವರ್ಮ್	0.75	1.0	500	30
ಎಲೆಕೋಸು	ಡಬ್ಬ ಮತ್ತೆ ಹುಳು	0.75-1.00	1.0-1.33	500	7
ಬದನೆಕಾಯಿ	ಹಣ್ಣು & ಶೂಟ್ ಬೋರರ್	0.47-0.75	0.625-1.000	500	6
ಮೆಣಸಿನ–ಕಾಯಿ	ಹಣ್ಣು ಕೊರೆಯುವ ಕೀಟ	0.47-0.75	0.625-1.000	500	6

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ:

ಪಿಪಿ ಸಲಕರಣೆಗಳು: ತ್ರಿಕ್ಷರವಾದ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ, ನ್ಯಾಪ್‌ಸಾಕ್, ಪಿರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಫೂಟ್ ಹಂಪ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಾಕರ್ ಅಥವಾ ಪವರ್ ಓಪನ್ ರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದ ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್‌ಗಳಂತಹ ಹಿಜ್ಜನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಸ್ಪ್ರೇ ತಯಾರಿಕೆ:

ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಥಿಯೋಡಿಕಾರ್ಬ್ 75% W.P. ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಣದಂತಹ ತೆಳುವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮರದ ಕೋಲಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮತ್ತೆನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಕೈಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.

ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ:

ಎಲೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಆವರಿಸುವ ಏಕರೂಪದ ತುಂತುರು ನೀಡಿ. ದಿಶದ ಭಾಗಗಳು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳು ತೇವವಾಗಿರುವವರೆಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಅನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಮಯ:

ಎಲೆಕೋಸು : ಪಕ್ವಿತ 40 ರಿಂದ 45 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮೊದಲ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ನಂತರದ ಸಿಂಪರಣೆಗಳನ್ನು (2 ರಿಂದ 3) ಕೀಟಗಳ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 7 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದು. ಹತ್ತಿ : ಪಕ್ವತೆ ಮಾಡಿದ 40 ರಿಂದ 45 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮೊದಲ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ನಂತರದ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ (3 ರಿಂದ 4) ಕೀಟಗಳ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 10 ರಿಂದ 15 ದಿನಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದು. ಬದನೆಕಾಯಿ : ಚಿಗುರು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಕೊರೆಯುವ ಹುಳುವಿನ ಬಾಧೆಯು ಸುಮಾರು 45-55 DAT (ನೆಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರದ ದಿನಗಳು) ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀಡಬೇಕಾದ ಮೊದಲ ಸಿಂಪರಣೆ ನಂತರ 3-4 ಸಿಂಪರಣೆಯನ್ನು ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನೀಡಬಹುದು.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ:

1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಖಾಲಿ ಆಹಾರ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. 2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. 3. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂಜನ್ನು ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. 4. ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 5. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅಗಿಯಬೇಡಿ. 6. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಂತಾನಹರಣಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ.

ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು:

ತಲೆನೋವು, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ವಾಕರಿಕೆ, ಮಂದ ದೃಷ್ಟಿ, ಅತಿಸಾರ, ಸೆಳೆತ, ಮೂತ್ರದ ಅಸಂಯಮ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಅತಿಯಾದ ಲ್ಯಾಕ್ರಿಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಹೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವುದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ :

1. ಸಿಂಗಿದರೆ, ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಚಿಗುಳಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ ವಾಂತಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಂತಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ರೋಗಿಯು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. 2. ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. 3. ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು/ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿ. 4. ಉಸಿರಾಡಿದರೆ, ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.

ಪ್ರತಿವಿಷ:

1. ರೋಗಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಟ್ರೋಪಿನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 2 ರಿಂದ 4 ಮಿಗ್ರಾಂನ ಹುನರಾವರ್ತಿತ ಡೋಸಿಗಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಟ್ರೋಪಿನೈಸೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ. 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಅಭಧಮನಿ ಮೂಲಕ ಆಟ್ರೋಪಿನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. 25 ರಿಂದ 50 ಮಿಗ್ರಾಂ. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಟ್ರೋಪಿನ್ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಟ್ರೋಪಿನ್ ಅಡಚಣೆದ ಆಗತ್ಯವು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ನಿರಂತರತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣವು ಡೋಸ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. 2. 2 PAM ನಂತಹ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಸಿಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.

ಬಳಕೆಯ ಕಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿರೋಧಾಭಾಸ:

1. ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಖಾಸಗೃಹದಿಂದ ಹೂಳಬೇಕು. 2. ಬಳಸಿದ ಕಂಟೇನರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರು-ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊರಗೆ ಬಡಬಾರದು. 3. ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಖಾಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು:

1. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ಷೇಪ ಕೊಡಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸಿದ ಕೊಡಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣದಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಲಾಕ್ ಕೀ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷೇಪ ಅಲ್ಲಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. 2. ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಕೊಡಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಶುಷ್ಕ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗಿದ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಅಪಾಗಳಿಂದ ಮಾರಿಗೆನ್ನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಥಿಯೋಡಿಕಾರ್ಬ್ (a.i.)	75.00% w/w
ಪ್ರಸರಣ ಏಜೆಂಟ್ (ಲೈಗ್ನೊಸ್ಲ್ಫೇಟ್ ಮೆಥನಾಲ್	5.00% w/w
ಸಲ್ಫೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಸೋಡಿಯಂ ಉಪ್ಪನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಅಯಾನಿಕ್ ಸಕ್ರಿಯಕಾರಕಗಳು)	
ತೇವಗೊಳಿಸುವ ಏಜೆಂಟ್ (ಸೋಡಿಯಲೀನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್)	3.00% w/w
ಜಡ ವಸ್ತು (ಚೀನಾ ಕ್ಲೇ)	Q.S.% w/w
ಒಟ್ಟು	100.00% w/w

ಮರು–ಪ್ರವೇಶದ ಅವಧಿ: 48 ಗಂಟೆಗಳು.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲೇಬಲ್/ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

थायोडिकार्ब 75% द्रवणीय पाउडर
(स्पृश्य कीटनाशक)

एटि बींधाकपिर डायमण्ड ब्याक मथ, वेण्डनेर कान्ड एवं फलर पोका, मरिचिर फलर बोंठा, उराद एवं छोला बोलওयार्म, (मारूका एवं हिलिसाथिस) तूला बोलार प्रतिरोधेर जन्य व्यवहृत हय।

व्यवहार:

फसल	छत्राकनाशकेर नाम	प्रति हेक्टेर मात्रा ए आई (केजि)	गठेन (केजि)	जलेर परिमाण (लिटार)	शेष छेटोनार समय एवं फसल काटार मध्ये समयेर व्यवधान (दिन)
उराद	वेसन, मारूका, हिलिसाथिस	0.468-0.562	0.625-0.750	373-500	17
तूला	कटन बोल वोरर	0.75	1.0	500	30
फुलकपि हीरा फिरे मथ		0.75-1.00	1.0-1.33	500	7
वेण्डन	कान्ड एवं फल पोकार	0.47-0.75	0.625-1.000	500	6
मरिच	फल काटार	0.47-0.75	0.625-1.000	500	6

व्यावहारेर निर्देशना:

थामार सुरक्षा सरञ्जाम: पोकामाकड़ेर सहोयजनक नियन्त्रणेर जन्य उच्च क्षमतार स्प्रे करार सरञ्जाम येमन न्याप्‌साक, चापयुक्त वायु, फुट पाम्प, हात चालित पाम्प, यान्त्रिक शक्ति चालित स्प्रेयार।

स्प्रे करार प्रक्रति: प्रयोजनीय परिमाण पानिते द्रवणीय पाउडार योग करे एकटि द्रवण प्रस्तुत करुन। परे अवशिष्ट जल योग करुन एवं आवार भालभाबे मेशान। मिश्रणटि तैरि करते काठ व्यावहार करुन। हात व्यावहार करबेन ना।

येखाबे स्प्रे करबेन- पानिर निचेर अंशे सठिकभाबे शोषण करते छिटाबेन ना। दिनेर उच्च तापमात्रा, प्रबल वायु एवं वृष्टिते वा भेजा पाताय स्प्रे करा उचित नय। वातासेर विपरीत दिके स्प्रे करबेन ना। काज शेषे, परिष्कार जल दिये उपादान धोया।

व्यवहारेर समय:

बींधाकपि: बींधाकपि लागानोर 40-45 दिन पर प्रथम स्प्रे करुन। एर पर पोकामाकड़ेर कार्यकारिता बिवेचना करे 7 थेके 10 दिनेर व्यवधाने 2-3 बार स्प्रे करा येते पारे। तूला- तूला लागानोर 40 थेके 45 दिन पर प्रथम स्प्रे करुन। एरपर पोकामाकड़ेर प्रभाव देखे 10-15 दिनेर ब्यवधाने 3 थेके 4 बार स्प्रे करा येते पारे। वेण्डन - कान्ड ও फलेर पोकार 45-55 दिन पर आक्रान्त हले प्रथमे स्प्रे करुन। एरपर रोगेर मात्रार उपर निर्ङर करे 3-4टि स्प्रे करा येते पारे।

व्यवहारकारीदेर जन्य सतर्कता:

1. थावार, खालि थावारेर पात्र एवं पशुखाद्य थेके दूरे राखुन। 2. मुख, त्वक एवं चोखेर साथे योगायोग एड़िये चलुन। 3. स्प्रे बाष्पेर इनहेलेशन एड़िये चलुन। बातासेर दिके स्प्रे करुन। 4. स्प्रे करार परे दूषित पोशाक एवं शरीरेर अङ्गगुलि भालभाबे धुये फेलुन। 5. स्प्रे करार समय धूमपान, थावेन, पान करबेन ना वा चिबबेन ना। 6. स्प्रे वा मिश्रित करार समय सम्पूर्ण प्रतिरक्षामूलक पोशाक परुन।

विषक्रियार उपसर्ग:

माथाव्यथा, माथा घोरा, झापसा दृष्टि, वमि बमि भाव, बमि, डायरिया, कांपुनि (मृगी), प्रस्राव धरे राखा, प्रचुर घाम, छिंड़े याओया एवं मलत्याग हते पारे।

प्राथमिक चिकित्सा:

1. गिले फेला हले, गलार पिछने सुड़सुड़ि दिये वमि करान। वमि हওয়া উপাদান পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তি করতে থাকুন। রোগী অজ্ঞান হলে বমি করবেন না। 2. যদি পোশাক এবং ত্বক দূষিত হয়, তাহলে পোশাক সরিয়ে ফেলুন এবং দূষিত ত্বককে প্রচুর সাবান এবং জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। 3. চোখ দিয়ে ধুয়ে হলে, প্রায় 10-15 মিনিটের জন্য প্রচুর স্যালাইন/পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। 4. শ্বাস নেওয়া হলে, রোগীকে তাজা বাতাসে নিয়ে যান।

প্রতিষেধক:

1. রোগীকে অবিলম্বে এট্রোপিন দিন এবং এর 2 থেকে 4 মিলিগ্রাম। 5 থেকে 10 মিনিটের ব্যবধানে অবিচ্ছিন্ন শিরায় ইনফিউশন দিয়ে সম্পূর্ণ অ্যাট্রোপিনাইজ বজায় রাখুন। দিনে সর্বোচ্চ 25 থেকে 50 মিলিগ্রাম অ্যাট্রোপিন সালফেট। টাকা পর্যন্ত একটি পরিমাণ উপসর্গ অব্যাহত থাকলে এট্রোপিন সালফেটের আরও ডোজ দেওয়া যেতে পারে। অ্যাট্রোপিনের ডোজ নির্ধারণের জন্য লালা একটি দরকারী মানদণ্ড। 2. যেকোনো ওকজাইম যেমন 2 P.A.M ব্যবহার করবেন না।

খালি ক্যান নিষ্পত্তি:

1. খালি ক্যান, অবশিষ্ট উপাদান এবং মেশিন ধোয়া সাবধানে নিষ্পত্তি করুন যাতে জল এবং বায়ু দূষণ না হয়। 2. খালি ক্যান ভেঙ্গে জনসংখ্যা থেকে দূরে মাটিতে পুঁতে দিন।

স্টোরেজ শর্ত:

1. এই পদার্থের পাত্রে খাবার বা পশু খাদ্য সংরক্ষণ করা হয় এমন কক্ষ থেকে দূরে আলাদা করে রাখুন। এর প্রকৃতি এবং শ্রমদের উপর নির্ভর করে, এটি একটি বন্ধ আলমারিতে সংরক্ষণ করুন। 2. এর স্টোরেজ রুমটি দীর্ঘ-প্রশস্ত হওয়া উচিত যেখানে আলো অপর্যাপ্ত বাতাস রয়েছে। স্টোরেজ রুমটি শক্তিশালী, শুষ্ক, শীতল এবং বায়ুচলাচল হওয়া উচিত। ঘরটি বড় হওয়া উচিত এবং বায়ু দূষণ হওয়া উচিত নয়।

রাসায়নিক রচনা:

थायोडिकार्ब (a.i.)	75.00% w/w
বিচ্ছুরণকারী এজেন্ট - (অ্যানিওনিক সারফ্যাক্ট্যান্ট সোডিয়াম সল্ট আফাদি ন্যাফথালিন মিথানল	
সালফোনিক অ্যাসিডের উপর ভিত্তি করে)	5.00% w/w
ভেটিং এজেন্ট (ন্যাপথালিন সালফেনেটে)	3.00% w/w
জড় উপাদান চিন ক্লে	পর্যাপ্ত পরিমাণ % w/w
মোট:	100.00% w/w

পুনরায় ভর্তির সময়কাল - 48 ঘণ্টা।

সতর্কতা: এই লেবেলে নির্দেশিত ফসল ব্যতীত অন্য ফসলে ব্যবহারের জন্য নিষিদ্ধ।

থিওডিকার্ব 75% দুবণীয় পাউডর
(স্পর্শ কীটনাশক)

এহা জোণ্ডি হীরা ব্যাক্ড্ ডোক, বৃণ্ডজ্ ক্ষেত্র এবং ফল বোরর, চিলি ফল বোরর্, উরাড আৰু গ্রাম ব'লরর্ম, (মোৰুকা আৰু হিলিয়াথিছ) কপাহী ব'ৰ্ম প্রতিৰোধৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

ব্যবহার:

ফসল	ছত্রাকনাশকের নাম	প্রতি হেক্টরে মাত্রা এ.আই (কেজি)	গঠন (কেজি)	জলের পরিমাণ (লিটার)	শেষ ছেটোনার সময় এবং ফসল কাটার মধ্যে সময়ের ব্যবধান (দিন)
কলা	গ্রাম মরুদা, মাকুকা, হিলিয়াথিস্	0.468-0.562	0.625-0.750	373-500	17
কপা	কপাহী বোল বোরর্	0.75	1.0	500	30
ফুলকোবি হীরা	পত্র ভোক	0.75-1.00	1.0-1.33	500	7
ভাঙনেন	ষ্টেম্ এবং ফল বোরর্	0.47-0.75	0.625-1.000	500	6
লঙ্কা	ফল কতর	0.47-0.75	0.625-1.000	500	6

ব্যবহার ক্ষেত্রের নির্দেশ:

ভাগ্ৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা: জীৱনাশক সংৰক্ষণজনক নিয়ন্ত্ৰণৰ জন্য উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন স্প্ৰে কৰাৰ সৰঞ্জাম যেনে ন্যাপ্‌সাক্, চাপযুক্ত বায়ু, ফুট পাম্প, হাতৰে চলোৱা পাম্প, যান্ত্ৰিক শক্তিৰে চলা স্প্ৰেয়াৰ।

স্প্রে করার প্রক্রিয়া:

প্রয়োজনীয় পরিমাণের পানীতে দ্রবীভূত গুড়ি দি দ্রব প্রস্তুত করুন। পিছত বাকী থকা পানী দি পুনৰ ভালদৰে মিহলাই লওক। মিশ্ৰণটো বনাবলৈ কাঠ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। হাত ব্যৱহাৰ নকৰিব।

কেনেকৈ স্প্রে করিব:

পানীৰ তলৰ অংশ সঠিকভাৱে শোষণ কৰি ছটিয়াই নিদিব। দিনটোৰ উচ্চ উষ্ণতাত, প্ৰচণ্ড বতাহ আৰু বৰষুণত বা তিতা পাতত স্প্ৰে' কৰিব নালাগে। বতাহৰ বিপৰীত দিশত স্প্ৰে' নকৰিব। কামৰ শেষত সামগ্ৰীখিনি পৰিষ্কাৰ পানীৰে ধুব লাগে।

ব্যবহারের সময়:

কবি: কবি বোপণৰ 40-45 দিনৰ পিছত প্ৰথমে স্প্ৰে' কৰিব লাগে। ইয়াৰ পিছত পোক-পকৰাৰ ফলপ্ৰসূতা বিবেচনা কৰি 7ৰ পৰা 10 দিনৰ ব্যৱধানত 2-3 বাৰ স্প্ৰে' কৰিব পাৰি। কপাহ-কপাহ বোৱাৰ 40ৰ পৰা 45 দিনৰ পিছত প্ৰথমে স্প্ৰে' কৰিব লাগে। ইয়াৰ পিছত পোক-পকৰাৰ প্ৰভাৱ দেখাৰ পিছত 10-15 দিনৰ 3ৰ পৰা 4 ব্যৱধানৰ পিছত স্প্ৰে' কৰিব পাৰি। ব্ৰিঞ্জাল - কাণ্ড আৰু ফলৰ ব'ৰ্মাৰ 45-55 দিনৰ পাছত যদি আক্ৰমণ হয়, তেন্তে প্ৰথমে স্প্ৰে' কৰিব লাগে। ইয়াৰ পিছত ৰোগৰ পৰিসৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি 3-4 টা স্প্ৰে কৰিব পাৰি।

ব্যবহারকারীর বাবে সাবধানতা:

1) খাদ্য, খালী খাদ্যৰ পাত্ৰ আৰু পশুৰ খাদ্যৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব লাগে। 2) মুখ, ছাল আৰু চকুৰ সংস্পৰ্শৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে। 3) স্প্ৰেৰ বাষ্প উশাহ লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক। বতাহৰ দিশত স্প্ৰে কৰিব। 4) স্প্ৰে কৰাৰ পিছত দূষিত কাপোৰ আৰু শৰীৰৰ অংগ ভালদৰে ধুব লাগে। 5) স্প্ৰে কৰাৰ সময়ত ধূমপান, খোৱা, পানীয় বা কোনো বস্তু চোবাই নাখাকিব। 6) স্প্ৰে বা মিহলোৱাৰ সময়ত সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষামূলক কাপোৰ পিন্ধিব লাগে।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ:

মূৰৰ বিষ, মূৰ ঘূৰোৱা, দৃষ্টিশক্তি ম্লান হোৱা, বমি, বমি, ডায়েৰিয়া, কঁপনি (মৃগীৰোগ), প্ৰস্ৰাৱ ৰক্ষ হোৱা, প্ৰচুৰ ঘাম ওলোৱা, চকুলো ওলোৱা, উপ হোৱা আদি হ'ব পাৰে।

প্রাথমিक चिकित्सा:

1) গিলিলে ডিঙিৰ পিছফালে টিকটিকিয়াই বমিৰ সৃষ্টি কৰিব লাগে।বমি কৰা বস্তু পৰিষ্কাৰ নোহোৱালৈকে এই প্ৰক্ৰিয়াটো পুনৰাবৃত্তি কৰি থাকিব। যদি ৰোগী অচেতন হৈ থাকে তেন্তে বমিৰ প্ৰশ্নেচনা নকৰিব। 2) কাপোৰ আৰু ছাল দূষিত হ'লে কাপোৰ আঁতৰাই দূষিত ছাল প্ৰচুৰ পৰিমাণে চাবোন আৰু পানীৰে ধুব লাগে। 3) চকু দূটা দূষিত হ'লে প্ৰচুৰ পৰিমাণে চেলাইন/পৰিষ্কাৰ পানীৰে 10-15 মিনিটমান ধুব লাগে। 4) উশাহ ল'লে ৰোগীক শুদ্ধ বতাহলৈ লৈ যাব লাগে।

প্रतिषेधक:

1) ৰোগীক তৎক্ষণাত এট্ৰপিন আৰু ইয়াৰ 2ৰ পৰা 4 মিলিগ্ৰাম দিব লাগে। 5ৰ পৰা 10 মিনিটৰ ব্যৱধানত অবিৰতভাৱে শিৰাত ইনফিউজন দি সম্পূৰ্ণ এট্ৰ'পিনাইজ বজাইৰ ৰাখিব লাগে। এদিনত সৰ্বাধিক 25ৰ পৰা 50 মিলিগ্ৰাম এট্ৰপিন ছালফেট। 50 টকা পৰ্যন্ত পৰিমাণ। লক্ষণসমূহ থাকিলে এট্ৰপিন ছালফেটৰ অধিক মাত্ৰা দিব পাৰি। এট্ৰপিনৰ মাত্ৰা নিৰ্ধাৰণৰ বাবে লালা ওলোৱাটো এটা উপযোগী মাপকাঠী। 2) যিকোনো অকজাইম যেনে 2 P.A.M. ব্যৱহাৰ নকৰিব।

খালী কেন নিষ্পাশন:

1) খালী কেন, বাকী থকা সামগ্ৰী আৰু মেচিনত সাৱধানে ধুই পেলাব লাগে যাতে পানী আৰু বায়ু প্ৰদূষণ নহয়। 2) খালী কেনবোৰ ভাঙি জনসংখ্যাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব পুতি থব লাগে।

संरक्षण अवस्था:

1. এই পদাৰ্থৰ পাত্ৰগুড়িকু অন্নজা কোঠাৰে ৰখাৰু যেঠাঁৰে খাদ্য কিম্বা পশু ফিড্ ৰক্ষিত সিঠি। এহাৰ প্ৰকৃতি এবং ৰুগনৰ ওপৰে নিৰ্ভৰ কৰি এহাকু এক বন্ধ আলমিৰাৰে ৰখাৰু। 2. এহাৰ ষ্টোৰেজ ৰুম্ লম্বা-প্ৰশস্ত হেবা উচিত যেঠাঁৰে আলোৰ অপৰ্যাপ্ত বাৰবায়ু সিঠি ই ষ্টোৰেজ্ ৰুম্ দুৰ্, শুখিলা, ঠাণ্ডা এবং ভেন্টিলেট্ হেবা উচিত। কোঠাৰাটি বড় হেবা উচিত এবং বায়ু প্ৰদূষণ হেবা উচিত নুহেঁ।

রাসায়নিক গঠন:

থিওডিকার্ব (a.i.)	75.00% w/w
বিছিন্নকারক এজেন্ট-(অনিয়নিক সর্ফাক্টান্ট	5.00% w/w
সোডিয়াম লরণ আফাদাই নাফথালিন মিথানল	
সালফোনিক্ এসিড্ ভিত্তি করে)	
ভেন্টিং এজেন্ট (নেফথালিন ছালফেটে)	3.00% w/w
নিষ্ক্রিয় পদার্থ 'চীন মাটি'	পর্যাপ্ত পরিমাণ% w/w
মুঠ:	100.00% w/w

पुनर प्रवेश समय: 48 घण्टा

सावधान: এই লেবেল/লিফলেটত উল্লেখ কৰা ব্যতীত অন্য শস্যত ব্যৱহাৰ নকৰিবা

थाइअ'डिकार्ब 75% द्रवणीय गुडि
(स्पर्श कीटनाशक)

ইয়াক কবিৰ হীৰা পিঠিৰ মথ, ব্ৰিঞ্জালৰ কাণ্ড আৰু ফলৰ ব'ৰ, চিলি ফলৰ ব'ৰ, উৰাদ আৰু গ্ৰাম ব'লৰ্ম, (মোৰুকা আৰু হিলিয়াথিছ) কপাহী ব'ৰ্ম প্ৰতিৰোধৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

ব্যবহার:

| शस्य | कीटर साधारण