ক্রিপকর্ড ১০% ই.সি.

কীটনাশক

সাইপারমেথ্রিন ১০% ই.সি.

এটি একটি সিথেটিক পাইরেথ্রোযেড় কীটনাশক যাতেপারমেথ্রিন স.উ. মাসদ্বারা ১০ এবংঅন্যান্যপ্রাসঙ্গিকউপাদানভার্সাম্যভাবেরয়েছে।

ব্যবহার জন্য অনুমোদন (ফরমুলেশন স.উ. X ১০০) / ১০ X এসপি.জিআর (০.৯১)

ফসল	পোকার নাম	মাত্রা /হে. এ.আই (গ্রাম)	ফরমুলেশন (এম.এল.)	দ্রবণের মাত্রা (লি.)	কীটনাশক ব্যবহারের পর ফসল তোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করার দিন
তুলো	স্পটেডবোলওয়ার্ম আমেরিকানবোলওয়ার্ম গোলাপীবোলওয়ার্ম	৫০-৭০	৫৫০-৭৬০	১৫০-১০০০	৭
বাঁধাকপি	হীরে পিটওয়ালা মথ	৬০-৭০	৬৫০-৭৬০	১০০-৪০০	৭
ঢেঁড়স	ফল ছিদ্রকারী পোকা	৫০-৭০	৫৫০-৭৬০	১৫০-৫০০	৩
বেগুন	ফল ও ডগা ছিদ্রকারী পোকা	৫০-৭০	৫৫০-৭৬০	২০০-৬০০	৩
গম	কাণ্ডের মাছি	৫০-	৫৫০-	৩০০-৮০০	১৪
সূর্য্যমুখী	শুঁয়ো পোকা	৬০-৭০	৬৫০-৭৬০	৫০০-৭০০	

ফসলের বয়স অনুযায়ী জলের মাত্রা নির্ভর করে।

অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহৃত সরঞ্জাম : ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, ন্যাপস্যাক পাওয়ার স্প্রেয়ার, মাটরচালিত ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার কামডাস্টার, কম্প্রেশন ন্যাপস্যাক ব্যাটারি স্প্রেয়ার, হুইলব্যারো স্প্রেয়ার।

প্রাথমিকচিকিৎসা ব্যবস্থা : বিষাক্তলক্ষণ দেখাদিলে অবিলম্বে চিকিৎসককে কল করুন। লক্ষণগত ভাবে চিকিৎসাকরুন। যদিত্বকদূষিতহয়, আক্রান্ত হওয়াস্থানটিপ্রচুরজল এবং সাবান দিয়ে ধুয়েফেলুন। যদি চোখ কন্ট্যামিনেট হয় তাহলে সাধারণ স্যালাইন বাজলদিয়ে প্রায় ১৫ মিনিটের জন্য ধুয়ে ফেলুন এবং এক জন ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন।

ঔষুধিচিকিৎসা : লক্ষণগতভাবেচিকিৎসাকরুন।

স্প্রেকরারপরেসতর্কতা : দূষিত হওয়া হাত, ত্বক, নখ এবং চুলপ্রচুর জল ওসাবানদিয়ে ধুয়েফেলুন। চোখদূষিতহলেপ্রায় ১৫ মিনিটের জন্য সাধারণ স্যালাইন বা জলদিয়ে ধুয়েনিন এবং ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন। দূষিত কাপড় পরিবর্তন করুন। প্রচুর জল এবং সাবান দিয়ে স্প্রেকরার জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জামগুলি পরিষ্কার করুন।

পরিবহন : রেল পথে পরিবহণের জন্য প্রস্তাবিত উপাদান সম্বলিত প্যাকেজগুলি, রেল ওয়েমন্ত্রককর্তৃকজারিকরা রেডট্যারিফ–এউল্লেখিত শর্তাবলী অনুসারে প্যাক করাহবে, উপাদানগুলি এমনভাবে পরিবহন বা সংরক্ষণকরাহবে যাতেখাবারের জিনিস এবং পশুখাদ্যের সাথে সরাসরিসংস্পর্শনা হয়।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ : অসাবধানতাবশতঃ কাঁপুনি, উত্তেজনা, বুক ধড়পড়, স্কিন এলার্জি, হাঁচি, নাক দিয়ে জল ঝরা ও নাক এঁটে যেতে পারে।

সতর্কতা : ১. দ্রবণ তৈরি করার সময় উপচে পড়ে বা ছিটের সাহায্যে ত্বকের ছোঁয়াচ যেন না লাগে, সতর্ক থাকুন । ২. খালি হাত দিয়ে দ্রবণ তৈরি করবেন না। ৩. প্রয়োগের সময় খাওয়া, পান করা, চিবানো বা ধূমপান করা নিষেধ। ৪. ছোঁয়াচ লাগা ত্বকের অংশ ও পোশাক ধুয়ে ফেলুন। ৫. ব্যবহারের পরে খালি পাত্রগুলিকে বিনষ্ট করুন।

সংগ্রহ করার শর্তাবলী : ১. যেসব প্যাকেজে এই কীটনাশকটি আছে, সেগুলিকে এগুলির প্রকৃত প্যাকেজের মধ্যে কীটনাশকের পরিমাণ এবং ধরণের উপর নির্ভর করে আলাদা একটি ঘরে অথবা আলমারীর মধ্যে তালা চাবি দিয়ে, শিশু এবং গৃহপালিত পশুদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে। ২. এই কীটনাশক যেখানে রাখা হবে সেই ঘরটি হতে হবে দৃঢ়, পোক্ত, আলো হাওয়া এবং যথেষ্ট আয়তনযুক্ত যাতে জলীয়বাষ্পের সাহায্যে ছড়িয়ে না পড়ে।

ব্যবহৃত পাত্রের বিনষ্টিকরণ : ১. ব্যবহৃত প্যাকেজ অথবা অতিরিক্ত বস্তু এবং কীটনাশক ধোয়া জল এবং পাত্রগুলিকে সাবধানতার সাথে নষ্ট করতে হবে যাতে পরিবেশ অথবা জলদূষণ না হয়। ২. দ্বিতীয়বার যাতে ব্যবহার না করা যায় এজন্যে ব্যবহৃত প্যাকেজগুলিকে বাইরে ফেলে রাখবেন না। ৩. প্যাকেজগুলিকে ভেঙে জনবসাতি থেকে দূরে মাটির তলায় পুঁতে ফেলতে হবে।

রাসায়নিকগঠন :

সাইপেমেথ্রিন টেক (৫০% ও/ও স.উ. এর উপরভিত্তিকরে)	২০.০% ও/ও
ইমালসিফায়ার (অ্যালকাইলফেনল এবং সালফোনেট অ্যালকাইল বেনজিনের ইথিলিনঅক্সাইডকনডেনসেটেরমিশ্রণ)	৮.৮% ও/ও
দ্রাবক (জাইলিন)	৭১.২% ও/ও
মোট :	১০০.০% ও/ও

ছিটিয়ে দেওয়ার ৪৮ ঘণ্টা পর এলাকায় প্রবেশ করুন।

সাবধানতা ঃ এই লেবেল/লিফ্লেটে নির্দিষ্ট ফসল ছাড়া অন্য ফসলে ব্যবহার করা উচিৎ নয় ।

Bengali

କ୍ରିପକୋର୍ଡ ୧୦% ଇ.ସି.

କୀଟନାଶକ

ସାଇପର୍‌ମେଥ୍ରିନ୍ ୧୦% ଇ.ସି.

ଏହାଏକସିନ୍ଥେଟିକ୍ପାଇରେଥ୍ରୋଏଡ୍କୀଟନାଶକଯେଉଁଥିରେଘନ୍ ଭାବରେ ସାଇପରମେଥ୍ରିନଏ.ଆଇ.୧୦% ଏବଂଅବଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟପ୍ରାସଙ୍ଗିକଉପାଦାନରହିଛି।

ପ୍ରୟୋଗ ଲାଗି ସୁପାରିଶ : (ଫର୍ମୁଲେଶନ ସ.ଉ X ୧୦୦) / ୧୦ X ଏସ୍.ପି.ଜିଆର (୦.୯୧)

ଫସଲ	କୀଟର ସାଧାରଣ ନାମ	ପରିମାଣ / ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଏ.ଆଇ. (ଗ୍ରାମ୍)	ଫର୍ମୁଲେଶନ (ଏମ୍.ଏଲ.)	ପାଣିରେ ମିଶିଯାଏ (ଲିଟର)	ପ୍ରଥମ ସ୍ପ୍ରେ ଓ ଫସଲ କାଟିବାର ଅପେକ୍ଷା ସମୟ
କପା	ଦାଗଯୁକ୍ତ ବୀଜକୋଷ କୀଟ ଆମେରିକୀୟ ବୀଜକୋଷ କୀଟ ଗୋଲାପି ବୀଜକୋଷ କୀଟ	୫୦-୭୦	୫୫୦-୭୬୦	୧୫୦-୧ ୦	୭ ୦ ୦
ବନ୍ଧାକୋବି	ଡାୟମଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ ମଥ୍	୬୦-୭୦	୬୫୦-୭୬୦	୧୦୦-୪୦୦	୭
ଭେଣ୍ଡି	ଫଳ ଛିଦ୍ରକାରୀ	୫୦-୭୦	୫୫୦-୭୬୦	୧୫୦-୫୦୦	୩
ବାଇଗଣ	ତଥା କାଣ୍ଡ ଛେଦକ	୫୦-୭୦	୫୫୦-୭୬୦	୨୦୦-୬୦୦	୩
ଗହମ	ପାଣି ମାଛି	୫୦-	୫୫୦-	୩୦୦-୮୦୦	୧୪
ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ	ସଂବାଳୁଆ (କ୍ୟାଟରପିଲାର)	୬୦-୭୦	୬୫୦-୭୬୦	୫୦୦-୭୦୦	

ଫସଲର ବୟସ ଉପରେ ପାଣିର ମାତ୍ରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ ।

ପ୍ରୟୋଗକରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଉପକରଣ : ନାପସାକ୍ ସ୍ପ୍ରେୟର, ନାପସାକ୍ ପାୱାର ସ୍ପ୍ରେୟର, ମୋଟରାଇଜଡ୍ ନାପସାକ୍ ସ୍ପ୍ରେୟର ସହ ଡଷ୍ଟର, କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ନାପସାକ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍ପ୍ରେୟର, ହ୍ୱିଲ୍ ବ୍ୟାରୋ ସ୍ପ୍ରେୟର।

ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଉପାୟ: ବିଷାକ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚର୍ମ ଦୂଷିତ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ଓ ସାବୁନରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଖି ପରିସର ଦୂଷିତ ହୁଏ ତେବେ ସାଧାରଣ ସାଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ପାଣିରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଦା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ।

ଔଷଧୀୟ ଉପଚାର :ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ ।

ସିଞ୍ଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସତର୍କମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା:ଦୂଷିତ ସ୍ଥାନ ଯେପରିକି ହାତ,ତ୍ୱଚା, ନଖ ଓ କେଶକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ଓ ସାବୁନରେ ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଖି ଦୂଷିତ ହୁଏ ତେବେ ସାଧାରଣ ସାଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ପାଣିରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଦା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ପୋଷାକ ବଦଳାନ୍ତୁ। ସିଞ୍ଚନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ଏବଂ ସାବୁନରେ ସଫା କରନ୍ତୁ।

ପରିବହନ: ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ''ରେଡ୍ ଟାରିଫ୍'' ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ରେଳ ଦ୍ୱାରା ପରିବହନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସାମଗ୍ରୀ ଥିବା ପ୍ୟାକେଜଗୁଡିକ ପ୍ୟାକ୍ କରାଯିବ । ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏପରି ଭାବରେ ପରିବହନ କିମ୍ବା ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ ଯେପରି ଏହା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ ନାହିଁ।

ବିଷକ୍ରିୟାର ଲକ୍ଷଣ :

କମ୍ପନ, ଭୟ, ଟାଣିଧରିବା ସ୍କିନ୍ ଏଲାର୍ଜି, ଛିଙ୍କ ନାକରୁ ପାଣି ବହିବା, ଫୁଲି ଯିବା ଇତ୍ୟାଦି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଯାଇ ପାରେ ।

ସାବଧାନତା : ୧. ମିଶ୍ରଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଢାଳି ହୋଇଯିବା କିମ୍ବା ପଡ଼ିଯିବା କାରଣରୁ ଚର୍ମରେ ଲାଗିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନାକରେ ଶୁଙ୍ଘନ୍ତୁ ନାହିଁ । ୨. ଖାଲି ହାତରେ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ୩. ଏହି ଉତ୍ପାଦକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସମୟରେ କଦାପି ଧୂମପାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପାନ ବା ତମାଖୁ ଚୋବାନ୍ତୁ ନାହିଁ । ୪. ବ୍ୟବହାର କରିସାରିବା ପରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୁଗାପଟାକୁ ଓ ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ଅଂଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାବୁନ୍ ଓ ପାଣିଦ୍ୱାରା ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ । ୫. ବ୍ୟବହାର କରିସାରିବା ପରେ ଖାଲି ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ।

ଭଣ୍ଡାରଣ : ୧. କୀଟନାଶକ ରହିଥିବା ପାତ୍ରକୁ ଏକ ପୃଥକ ଗୃହରେ କିମ୍ବା ପରିସରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଗୃହଠାରୁ ବିଶେଷକରି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା ସାମଗ୍ରୀ ଠାରୁ ଦୂରେଇ କରି ରଖନ୍ତୁ ଓ ତାହାକୁ ଚାବି ଓ ତାଲା ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ ଯେପରି ଘରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ କେହି ନ ଆସନ୍ତି । ୨. ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖାଯାଉଥିବା ଏହି ରୁମ୍ ବା ପରିସରଟି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବ । ସ୍ଥାନଟି ଶୁଷ୍କ ଥିବ, ଏହା ମଧ୍ୟକୁ ଉତ୍ତମ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଓ ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବ ଓ ସ୍ଥାନଟି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରହିଥିବ ।

ବ୍ୟବହୃତ ଖାଲି ପାତ୍ରକୁ ଫିଙ୍ଗିବା : ୧. ପ୍ୟାକେଜ୍‌କୁ ଫିଙ୍ଗିବା କିମ୍ବା ମେସିନ୍‌ରୁ ଓ ପାତ୍ରରୁ ବଳକା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଫୋପାଡ଼ିବା ଓ ଧୋଇବା ସମୟରେ ଏପରି ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେପରି ତାହା ପରିବେଶ ତଥା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି ନ କରେ । ୨. ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ୟାକେଜ୍‌କୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ପାଇଁ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ୩. ପ୍ୟାକେଜ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ବାସସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଦୂରରେ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ।

ରାସାୟନିକ ସଂରଚନା :

ସାଇପରମେଥ୍ରିନ ଟେକ. .(୫୦% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ/ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏ.ଆଇ. ଉପରେଆଧାରିତ)	୨୦.୦% ଓ/ଓ
ଏମଲସିଫାୟାର୍ (ଆଲକାଇଲ୍‌ଫିନୋଲ ଏବଂ ସଲ୍ଫୋନେଟ ଆଲକାଇଲ ବେଞ୍ଜିନ୍ ର ଘନୀଭୂତ ଇଥାଇଲ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କଣ୍ଡେନସେଟ୍ ର ମିଶ୍ରଣ)	୮.୮% ଓ/ଓ
ଦ୍ରବଣ (ଜାଇଲିନ)	୭୧.୨% ଓ/ଓ
ମୋଟ :	୧୦୦.୦୦% ଓ/ଓ

ଘାସ-ବାଳୁଙ୍ଗା ନାଶକ ବ୍ୟବହାର ର ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପରେ ହିଁ ଖେତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ।

ସାବଧାନତା : ଏହି ଲେବେଲ/ଲିଫ୍ଲେଟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫସଲ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫସଲରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

Oriya

ক্ৰিপকৰ্ড ১০% ই.চি.

কীটনাশক

ছাইপাৰমেথ্ৰিন ১০% ই.চি.

ই হৈছে ভৰ অনুসৰি চাইপাৰমেথ্ৰিন এ.আই. ১০ যুক্ত আৰু অন্যান্য প্ৰাসঙ্গিক উপাদানবোৰৰ সন্তুলন ৰক্ষা কৰা এবিধ কৃত্ৰিম পাইৰিথ্ৰইড কীটনাশক।

ব্যৱহাৰৰ বাবে অনুমোদন : (ফৰ্মুলেশ্বন এ.আই. X ১০০) / ১০ X এসপি.জিআৰ (০.৯১)

শস্য	পোকৰ নাম	মাত্ৰা/হেক্টৰ এ.আই (কেজি)	ফৰ্মুলেশ্বন (এম.এল.)	দ্ৰবণৰ মাত্ৰা (লিটাৰত)	ব্যৱহাৰৰ পিচত শইচ চপোৱা পৰ্যন্ত অপেক্ষা কৰাৰ দিন
তুলা	ছিদ্ৰকাৰী পোক	৫০-৭০	৫৫০-৭৬০	১৫০-১০০০	৭
বন্ধা কবি	হীৰা পিটৱালা	৬০-৭০	৬৫০-৭৬০	১০০-৪০০	৭
ভেণ্ডি	ফল ছিদ্ৰকাৰী পোক	৫০-৭০	৫৫০-৭৬০	১৫০-৫০০	৩
বেগেনা	ফল আৰু আগলি ছিদ্ৰকাৰী পোক	৫০-৭০	৫৫০-৭৬০	২০০-৬০০	৩
ঘেঁহু	গা-গছৰ মাখি	৫০-	৫৫০-	৩০০-৮০০	১৪
সূৰ্যমুখী	বিছা পোক	৬০-৭০	৬৫০-৭৬০	৫০০-৭০০	

শস্যৰ বয়স অনুযায়ী পানীৰ মাত্ৰা নিৰ্ভৰ কৰে।

প্ৰয়োগত ব্যৱহাৰ কৰা সঁজুলি : নাপচাক স্প্ৰেয়াৰ, নাপচাক পাৱাৰ স্প্ৰেয়াৰ, মটৰচালিত নাপচাক স্প্ৰেয়াৰ ও ডাষ্টাৰ, কম্প্ৰেশ্যন নাপচাক বেটেৰী স্প্ৰেয়াৰ, হুইল বেৰৌ স্প্ৰেয়াৰ।

প্ৰাথমিক চিকিসাৰ ব্যৱস্থাসমূহ : বিষক্ৰিয়াত ভোগাৰ লক্ষণবোৰে দেখা দিলে, তৎক্ষণাত চিকিসকক মাতিব। লক্ষণ অনুসৰি চিকিসা কৰিব। যদি ছালখন দূষিত হয়, তেন্তে আক্ৰান্ত অংশটো প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ পানী আৰু চাবোনেৰে ধুই পেলাব। যদি চকু আৰু তাৰএ আশে-পাশে থকা অংশবোৰ দূষিত হয় তেন্তে ১৫ মিনিট সময় চকুত সাধাৰণ চেলাইন বা পানী মাৰিব আৰু এজন চিকিসকৰ ওচৰলৈ নিব।

ঔষধ চিকিসা: লক্ষণ অনুসৰি চিকিসা কৰিব। স্প্ৰে কৰাৰ পিছত ল'বলগীয়া আগতীয়া সাৱধানতা হাত, ছাল, নখ আৰু চুলিৰ দৰে দূষিত হৈ পৰা অঙ্গ-প্ৰত্যঙ্গবোৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ পানী আৰু চাবোনেৰে ধুই পেলাব। যদি চকু দুটা দূষিত হয় তেন্তে ১৫ মিনিট সময় চকুত সাধাৰণ চেলাইন বা পানী মাৰিব আৰু চিকিসকৰ ওচৰলৈ নিব। দূষিত কাপোৰ-কানিবোৰ সলাই পেলাব। স্প্ৰে কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা সঁজুলিবোৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ পানী আৰু চাবোনেৰে ধুব।

পৰিবহন : ৰেলযোগে পৰিবহণৰ বাবে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা সামগ্ৰী থকা পেকেজবোৰ, ৰেল মন্ত্ৰলয়ে জাৰি কৰা RED TARRIF ত উল্লেখ কৰা চত্ৰ অনুসৰি পেক কৰিব লাগিব, সামগ্ৰীসমূহ এনেদৰে পৰিবহণ বা সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব যাতে খাদ্য সামগ্ৰী আৰু পশুৰ খাদ্যৰ প্ৰত্যক্ষ সংস্পৰ্শলৈ নাহে।

বিষক্ৰিয়াৰ লক্ষণ : অসাৱধানতাবশত: কঁপনি, উত্তেজনা, বুকু ধড়ফৰ, স্কিন এলাৰ্জি, হাঁচি, নাকেৰে পানী সৰা আৰু নাক বন্ধ হৈ যাব পাৰে।

সতৰ্কতা সমূহ: ১. মিশ্ৰণ কৰোতে উশাহত যাবলৈ নিদিব আৰু ছিটিকি আহি ছালত লাগিবলৈ নিদিব। ২. শুদা হাতেৰে মিশ্ৰণ নকৰিব। ৩. প্ৰয়োগৰ সময়ত কোনো বস্তু, পানীয় নেখাব, কোনো বস্তু নুচুবাব বা ধূম্ৰপান নকৰিব। ৪. প্ৰয়োগৰ পিচত, দূষিত হোৱা অংগসমূহ আৰু কাপোৰ ধুই পেলাওক। ৫. প্ৰয়োগৰ পিচত খালী পাত্ৰসমূহ নষ্ট কৰি পেলাওক।

সংগ্ৰাহালয়ন অৱস্থা: ১. কীটনাশক থকা পেকেটবোৰ অন্য সামগ্ৰী বিশেষকৈ খাদ্যবস্তু থোৱা কোঠালি বা চৌহদৰ পৰা আঁতৰত সুকীয়া কোঠালি বা চৌহদত জমা কৰি থোৱা উচিত বা কীটনাশকৰ পৰিমাণ আৰু প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সুকীয়া আলমাৰিত তলা মাৰি থোৱা উচিত । ২. কীটনাশক সংগ্ৰহ কৰি থোৱা কোঠালি বা চৌহদ ভালকৈ নিৰ্মিত, শুকান, ভালকৈ পোহৰ পৰা, বতাহ চলাচল কৰিব পৰাকৈ আৰু যথেষ্ট আহল-বহল হোৱা উচিত যাতে এইবোৰ জলবাষ্প লাগি নষ্ট নহয়।

খালী পাত্ৰসমূহৰ নিষ্পত্তি: ১. বাতাবৰণ আৰু পানী দূষিত নহবৰ বাবে ব্যৱহৃত পেকেট বা থাকি যোৱা সামগ্ৰী আৰু কীটনাশক ধোৱা পানী তথা পাত্ৰসমূহ নিৰাপদভাবে নিষ্পত্তি কৰা উচিত। ২. ব্যৱহৃত পাত্ৰসমূহ পুনৰ ব্যৱহাৰ নহ'বৰ বাবে বাহিৰত থ'ব নেলাগে। ৩. পেকেটবোৰ ভাঙি-ছিঙি বসতিপূৰ্ণ ঠাইৰ পৰা আঁতৰত পুতি পেলাব লাগে।

ৰসায়নিক বিন্যাস :

চাইপাৰমেথ্ৰিন টেক। (৫০ ও/ও স.উ.ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি)	২০.০% ওজন/ওজন
ইমালছিফায়াৰ (এলকাইল ফেনল আৰু ছালফনেট এলকাইল বেনজিনৰ ইথাইলিন অক্সাইড কণ্ডেনছেটৰ মিশ্ৰণ)	৮.৮% ওজন/ওজন
প্ৰাৱক (জাইলিন)	৭১.২% ওজন/ওজন
মুঠ :	১০০.০০% ওজন/ওজন

ছটিয়াই দিয়াৰ ঃ ৪৮ ঘণ্টা পিছত এলেকাত প্ৰবেশ কৰিব।

সাৱধানতা : এই লেবেল/পুস্তিকাত নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া শস্যৰ বাহিৰে অন্য শস্যত ব্যৱহাৰ নকৰিব ।

Assamese

ക്രിപ്കോർഡ് 10% ഇ.സി.

കീടനാശിനി

സൈപർമെത്രിൻ 10% ഇ.സി.

ഇത് സൈപർമെത്രിന് എ.ഐ അടങ്ങിയ സിന്തറ്റിക് പൈറെത്രോയിഡ് കീടനാശിനിയാണ്. 10% പിണ്ഡവും മറ്റ് പ്രസക്തമായ ചേരുവകളും സന്തുലിതമാക്കുക.

ഉപയോഗത്തിനുള്ള ശുപാർശ : (ഫോർമുലേഷൻ എ.ഐ. X 100) / 10 X എസ്പി. ജിആർ (0.99)

വിള	കീടത്തിന്റെ സാധാരണ പേര്	അളവ്/ഹെക്ടർ എ.ഐ. (ഗ്രാം)	ഫോർമുലേഷൻ (മിലി.)	കലർത്തേണ്ട വെള്ളം (ലിറ്റർ)	അവസാന സ്പ്രേക്കും വിളവെടുപ്പിനും ഇടയിൽ കാത്തിരിക്കേണ്ട ഇടവേള
പരുത്തി	പുള്ളി ബോൾവേം അമേരിക്കൻബോൾവേം പിങ്ക് ബോള്വോം	50-70	550-760	150-1000	7
മുട്ടക്കോസ്	ഡയമണ്ട് ബ്ലാക്ക് മോത്ത്	60-70	550-760	100-400	7
വെണ്ട	ഫ്രൂട്ട് ബോറർ	50-70	550-760	150-500	3
വഴുതന	ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് ഷൂട്ട് ബോറർ	50-70	550-760	200-600	3
ഗോതമ്പ്	ഷൂട്ട് ഫ്ലൈ	50-	550-	300-800	14
സൂര്യകാന്തി	ബിഹാർ ഹെയറി കാറ്റർപില്ലർ	60-70	650-760	500-700	

വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് വിളയുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ആയിരിക്കണം തീരുമാനിക്കുന്നത്.

അപേക്ഷയിൽ ഉപയോഗിച്ച ഉപകരണങ്ങൾ: നാപ്സാക്ക് സ്പ്രേയർ, നാപ്സാക്ക് പവർ സ്പ്രേയർ, മോട്ടറൈസ്ഡ് നാപ്സാക്ക് സ്പ്രേയർ കം ഡസ്റ്റർ, കംപ്രഷൻ നാപ്സാക്ക് ബാറ്ററി സ്പ്രേയർ, വീൽ ബാരോ സ്പ്രേയർ.

പ്രഥമശുശ്രൂഷാ നടപടികൾ: വിഷ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ, ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ വിളിക്കുക. രോഗലക്ഷണമായി ചികിത്സിക്കുക. ചർമ്മം മലിനമാണെങ്കിൽ, ബാധിത പ്രദേശം ധാരാളം വെള്ളവും സോപ്പും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക. മലിനമായ കണ്ണുകളുടെ പ്രദേശം സാധാരണ ഉപ്പുവെള്ളമോ വെള്ളമോ ഉപയോഗിച്ച് ഏകദേശം 15 മിനിറ്റ് നനച്ച് ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക.

ഡ്രഗ് തെറാപ്പി: രോഗലക്ഷണമായി ചികിത്സിക്കുക.

സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതിനു ശേഷമുള്ള മുൻകരുതലുകൾ: ധാരാളം വെള്ളവും സോപ്പും ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ, ചർമ്മം, നഖങ്ങൾ, മുടി എന്നിവ പോലെ മലിനമായവ കഴുകുക. കണ്ണുകൾക്ക് മലിനമായാൽ സാധാരണ ഉപ്പുവെള്ളമോ വെള്ളമോ ഉപയോഗിച്ച് ഏകദേശം 15 മിനിറ്റ് നനച്ച് ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക. മലിനമായ തുണികൾ മാറ്റുക. സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ധാരാളം വെള്ളവും സോപ്പും ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുക.

ഗതാഗതം : റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച റെഡ് ടാറിഫിൽ വ്യക്തമാക്കിയ വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി റെയിൽ ഗതാഗതത്തിനായി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയ പാക്കേജുകൾ പായ്ക്ക് ചെയ്യണം, ഭക്ഷണവുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്താത്ത വിധത്തിൽ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുപോകുകയോ സൂക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യണം. സാധനങ്ങളും മൃഗങ്ങളുടെ തീറ്റയും.

വിഷബാധ ലക്ഷണങ്ങൾ : കമ്പനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും, ആയാസരഹിതമായി അനുഭവപ്പെടുകയും, ആശങ്ക, അപസ്മാരം, സ്കിൻ അലർജി, തുമ്മൽ, ഒലിക്കുന്ന മൂക്ക്, മൂക്കടപ്പ് എന്നിവ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം.

മുൻകരുതലുകൾ : 1.നേർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് തുളുമ്പിയോ തെറിച്ചോ വീണ് കീടനാശിനിയുമായി സമ്പർ ക്കത്തിലാകുന്നതും ശ്വസിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കുക.2. നഗ്നമായ കൈകൾ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത്. 3. സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ പുകവലിക്കുകയോ, കുടിക്കുകയോ, കഴിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചവയ്ക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. 4. സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് മലിനമായ വസ്ത്രവും ശരീര ഭാഗങ്ങളും സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകുക. 5. ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞ കണ്ടയിനറുകൾ നശിപ്പിക്കുക.

സംഭരണ വ്യവസ്ഥകൾ: 1. ഈ കീടനാശിനി അടങ്ങിയ പാക്കറ്റുകൾ പ്രത്യേക മുറികളിൽ പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് വേണം സൂക്ഷിക്കാൻ, ഇതിന്റെ അടുത്ത് മറ്റു സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ പ്രത്യേക അലമാറയിൽ ഇതിന്റെ അളവിനും പ്രകൃതത്തിനും അനുസരിച്ച് താഴും താക്കോലുമിട്ട് പൂട്ടി സൂക്ഷിക്കണം. 2. കീടനാശിനി സൂക്ഷിക്കുന്ന മുറിയും സ്ഥലവും നല്ലപോലെ ഉറപ്പുള്ളതായിരിക്കണം, കാറ്റുകിട്ടുന്നതും, വെളിച്ചമുള്ളതുമായിരിക്കണം കൂടാതെ നീരാവിയുമായികലർന്ന് മലിന മാകാതിരിക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വലിപ്പമുള്ളതായിരിക്കണം.

കണ്ടയിനറുകൾ നശിപ്പിക്കുന്ന വിധം : 1.പാക്കേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയായ പദാർത്ഥങ്ങൾ കൂടാതെ മെഷീനും കണ്ടയിനറും കഴുകി വരുന്ന വെള്ളം പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണവും ജലമലിനീകരണവും ഒഴിവാക്കാൻ സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ നശിപ്പിക്കണം. 2. പുനരുപയോഗം തടയുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച പായ്ക്കറ്റുകൾ പുറത്തു കളയരുത്. 3. ഉപയോഗിച്ച പായ്ക്കറ്റുകൾ പൊട്ടിച്ച് ജനവാസമില്ലാത്തിടത്ത് കുഴിച്ച് മൂടുകയും വേണം.

കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ :

സൈപർമെത്രിൻ ടെക്ക് (50% w/w a.i. അടിസ്ഥാനമാക്കി)	:	20.0% w/w
എമൽസിഫയർ (ആല്ക്കൈൽ ഫിനോൾ, സൾഫോണേറ്റ് ആല്ക്കൈൽ ബെൻസിൻ എന്നിവയുടെ എഥിലീൻ ഓക്സൈഡ് കണ്ടൻസേറ്റ് മിശ്രിതം)	:	8.8% w/w
ലായക (സൈലീൻ)	:	71.2% w/w
ആകെ	:	100.0% w/w

തിരികെ പ്രവേശിക്കേണ്ട സമയം : 48 മണിക്കൂർ

അപകടം : ഈ ലേബൽ/ ലീഫ്‌ലെറ്റിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിളകളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കരുത്.

Malayalam

ಕ್ರಿಪ್ ಕಾರ್ಡ್ 10% ಇ.ಸಿ.

ಕೀಟನಾಶಕ

ಸೈಪರ್ ಮೆಥ್ರಿನ್ 10% ಇ.ಸಿ.

ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಪೈರೆಥ್ರಾಯ್ಡ್ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೈಪರ್ಮೆಥ್ರಿನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ 10% ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಿ.

ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು : (ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ ಎ.ಐ. X 100) / 10 X ಎಸ್‌ಪಿ. ಜಿಆರೇಪಿ (0.99)

ಫಸಲು	ಕ್ರಿಮಿಗಳ ಹೆಸರು	ಪರಿಮಾಣ/ಹೆ. ಎಐ ಗ್ರಾಮ್	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಎಮ್.ಎಲ್)	ದ್ರವಿಣದ ಮಾತ್ರ (ಲೀಟರ್)	ಫಸಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರೆಗೆ ಕಾಲ ಅವಧಿ
ಹತ್ತಿ	ಮಚ್ಚೆಯುಳ್ಳ ಗೋಲಾಕಾರದ ಹುಳು ಅಮೇರಿಕನ್ ಬಾಲ್ವರ್ಮ್ ಪಿಂಕ್ ಬಾಲ್ವರ್ಮ್	50-70	550-760	150-1000	7
ಎಲೊಕೋಸು	ಡೈಮೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಥ್	60-70	650-760	100-400	7
ಬೆಂಡೆ	ಫಲ ನಾಶಕ	50-70	550-760	150-500	3
ಬದನೆ	ಫಲ ಮತ್ತು ಬೆರು ನಾಶಕ	50-70	550-760	200-600	3
ಗೋದಿ	ನೀರಿನ ನೊಣ	50	550	300-800	14
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ	ಬಿಹಾರ್‌ಸೊಂಡಿ (ಕಾಟರ್‌ಪಿಲರ್)	60-70	650-760	500-700	

ಫಸಲಿನ ಆಯುಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವುದು.

ಅನ್ವಯಿಸಲು ಬಳಸಿದ ಉಪಕರಣಗಳು: ನ್ಯಾಪ್ ಕಿನ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ನ್ಯಾಪ್ ಕಿನ್ ಪರ್ವ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಮೋಟಾರೈಸ್ಡ್ ನ್ಯಾಪ್ ಕಿನಗ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಕಮ್ ಡಸ್ಟರ್ , ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ನ್ಯಾಪ್ ಸಾಕ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ವೀಲ್ ಬ್ಯಾರೋ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ರಮಗಳು: ವಿಷಕಾರಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ. ರೋಗಲಕ್ಷಣಗದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯರಿ. ಚರ್ಮವು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಪೀಡಿತ ಭಾಗವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕಣ್ಣುಗಳ ಭಾಗವು ಕಲುಷಿತವಾದರೆ ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲವಣಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ.

ಡ್ರಗ್ ಥೆರಪಿ : ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ ಅನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಸ್ಪ್ರೆಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು : ಕಲುಶಿತವಾಗಿರುವ ಕೈಗಳು, ಚರ್ಮ , ಬೆರಳಿನ ಉಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ್ನು ನೀರು ಮತ್ತು ಸೋಪ್ ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯುವುದು. ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಲುಶಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಂದ ತೊಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸರ್ಕಿಸಿರಿ. ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಬಳಸಲಾದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿ.

ಸಾಗಾಣಿಕೆ: ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಲು ನೀಡಲಾಗುವ ವಸ್ತುಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಹೊಡಿಸಿದಿ ರೆಡ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಶು ಆಹರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಷ ಲಕ್ಷಣ : ಕಂಪನ, ಭಯ, ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ, ಸೀನು, ಹೆದರಿಕೆ, ಮೂಗಿನಿಂದ ನೀರು ಸುರಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಮೂಗು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಂಭವ ಉಂಟು.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು : 1. ಹರಡುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಚೆಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಉಸಿರಿನ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ. 2. ಬರಿಗೈಯಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ. 3. ಅಳವಡಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸೇವಿಸುವುದು, ಪಾನೀಯ ಕುಡಿಯುವುದು, ಅಗಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. 4. ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ. 5. ಖಾಲಿ ಕಂಟೈನರನ್ನು ಒಳಕೆಯ ನಂತರ ನಾಶಪಡಿಸಿ.

ಸಂಗ್ರಹದ ವಿಧಾನ: 1 ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಇತರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಡುವ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಪಾರ ಪದಾರ್ಥವನ್ನಿಡುವ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಸಂಥಳದಿಂದ ದೂರ ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕೀಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಲ್ಮೇರಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಡಬೇಕು. 2. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನಿಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಕೊಠಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಒಣಗಿದಂತಿರಬೇಕು, ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಹೆಚ್ಚು ಬರುವಂತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆವಿಯಾದಾಗ ಕಲುಷಿತವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು.

ಖಾಲಿ ಕಂಟಾನರ್‌ಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ : 1. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಉಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಕಂಟೈನರ್ ಗಳಿಂದ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯವಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. 2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಮರುಬಳಕೆಗಾಗಿ ಹೊರಗಿಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಒಡೆದು, ವಾಸಸ್ಥಾನದಿಂದ ದೂರ ಹೂಳಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮ್ಮಿಲನ :

ಸೈಪೆಮೆಥ್ರಿನ್ ಟೆಕ್ (ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಮಾಣ 50%)	:	20.0% w/w
ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯರ್ (ಆಲ್ಕೈಲ್ ಫೀನಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫೊನೇಟ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಬೆಂಜೀನ್ ಎಥಲೀನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಟ್ ಮಿಶ್ರಣ)	:	8.8% w/w
ದ್ರಾವಣ (ಕ್ಸೈಲೀನ್)	:	71.2% w/w
ಒಟ್ಟು :		100.0% w/w

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮರು-ಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿ: 48 ಗಂಟೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲೇಬಲ್/ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಾರದು.

Kannada

க்ரிப் கார்ட் 10% ஈ. ஸி

பூச்சி நாசினி

ஸைபர்மெத்ரின் 10% ஈ. ஸி

இந்த செயற்கை பைரெத்ராய்டு பூச்சிக்கொல்லியில் செயலில் உள்ள மூலப்பொருட்களின் நிறையில் 10% சைபர்மெத்ரின் மற்றும் பிற தொடர்புடைய பொருட்கள் உள்ளன.

உபயோகத்திற்கு பரிந்துரை : $\frac{\text{(கலவை எ.ஐ. X 100)}}{\text{10 X எஸ்பி. ஜி.ஆர்.(0.99)}}$

பயிர்	பொதுவான பூச்சிகளின் பெயர்	அளவு/ஹெக்டேர்			கடைசி ஸ்ப்ரேயிற்கும் அறுவடைக்கும் இடையில் காத்திருக்கும் காலம்
		ஏஐ (கிராம்)	கலவை (மில்லி-லீட்டர்)	தண்ணீர் கலரல் (லீட்டர்)	
பத்தி	புள்ளிகள் உள்ள பருத்திப்புழு	50-70	550-760	150-1000	7
	அமெரிக்க பருத்திப்புழு				
	இளஞ்சிவப்பு புருத்திப்புழு				
முட்டைகோஸ்	வைரமுதுகு பூச்சி	60-70	650-760	150-400	7
வெண்டைக்காய்	ஃப்ரூட் போரர்	50-70	550-760	150-500	3
கத்திரிக்காய்	ஃப்ரூட் மற்றும் ஷூட் போரர்	50-70	550-760	200-600	3
கோதுமை	ஷூட் ஃப்லை	50	550	300-800	14
ஸன்ஃப்ளவர்	பிஹார் ஹேயிரி கொம்பழுகு	60-70	650-760	500-700	

பயிரின் வயதிற்கேற்ப தண்ணீர் அளவு மாறுபடும்.

பயன்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் உபகரணங்கள் : முதுகேந்தும் ஸ்ப்ரேயர், முதுகேந்தும் பவர் ஸ்ப்ரேயர், மோட்டார் பொருத்தப்பட்ட முதுகேந்தும் ஸ்ப்ரேயருடன் உள்ள டஸ்டர், கம்ப்ரஷன் முதுகேந்தும் பேட்டரி ஸ்ப்ரேயர், வீல் பேரோ ஸ்ப்ரேயர்.

முதலுதவி நடவடிக்கைகள்: நச்சுத்தன்மை அறிகுறிகள் ஏற்பட்டால், உடனடியாக மருத்துவரை அழைக்கவும். அறிகுறிக்கு ஏற்ப சிகிச்சையளிக்கவும். தோலில் மாசுபட்டிருந்தால், பாதிக்கப்பட்ட பகுதியை ஏராளமான நீர் மற்றும் சோப்பால் கழுவவும். கண் பகுதி மாசுபட்டிருந்தால், சாதாரண உப்பு அல்லது நீரில் சுமார் 15 நிமிடங்கள் நன்றாக கழுவிய பிறகு மருத்துவரை அணுகவும்.

மருந்து சிகிச்சை: அறிகுறிக்கு ஏற்ப சிகிச்சையளிக்கவும். தெளிப்பதற்கு பிறகு தேவையான முன்னெச்சரிக்கைகள் அசுத்தமான கைகள், தோல், விரல் நகங்கள் மற்றும் முடி போன்றவற்றை ஏராளமான நீர் மற்றும் சோப்பால் கழுவவும். கண்களில் மாசுபட்டால், சாதாரண உப்பு அல்லது நீரில் சுமார் 15 நிமிடங்கள் நன்றாக கழுவிய பிறகு மருத்துவரிடம் ஆலோசிக்கவும். அசுத்தமான துணிகளை மாற்றவும். தெளிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படும் உபகரணங்களை ஏராளமான நீர் மற்றும் சோப்பால் சுத்தம் செய்யவும்.

கொண்டு செல்லுதல்: இரும்பில் கொண்டு செல்வதற்காக வழங்கப்படும் பொருட்களைக் கொண்ட பேக்கேஜ்கள், இரும்பில்வே அமைச்சத்தால் வழங்கப்பட்ட ''ரேட் டாரிஃப்'' இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகளுக்கு ஏற்ப பேக் செய்யப்பட வேண்டும், உணவு மற்றும் கால்நடை தீவனங்களுடன் நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளாத வகையில் பொருட்கள் கொண்டு செல்லப்படும் அல்லது சேமிக்கப்படும்.

விஷத்தின் அறிகுறி : நடுக்கம், கவலை, இழுப்பு, ஸ்கின் அலர்ஜி, தும்மல், மூக்கிலிருந்து தண்ணீர் வடிதல், மூக்கு விறைப்பு போன்ற அறிகுறிகள் தோன்றலாம்.

முன்னெச்சரிக்கைகள்: 1. கலவை தயாரிக்கும்போது தெறித்தல் அல்லது சிதறல் காரணமாக தெளிப்புப்படலம் உட்சுவாசிக்கப்படுவது மற்றும் சருமத்தில் படுவதைத் தவிர்க்கவும். 2. வெறும் கைகளால் கலக்கக்கூடாது. 3. தெளிக்கும் போது புகைபிடித்தல், எதையும் பருகுதல், உண்ணுதல் மற்றும் மெல்லுதல் கூடாது. 4. தெளித்து முடித்த பிறகு மாசுபட்ட ஆடைகள் மற்றும் உடல் பாகங்களை நன்றாக கழுவவும். 5. உபயோகித்த பிறகு காலி கொள்கலன்களை அழித்துவிடவும்.

சேமிப்பு நிலவரங்கள்: 1. பூச்சிகொல்லி அடங்கிய பேக்கேஜ்கள், இதர பொருள்கள் குறிப்பாக உணவுப்பண்டங்கள் சேமிக்கப் பயன் படுத்தப்படும் அறைகள் அல்லது இடங்களுக்கு அப்பால் தனி அறைகள் அல்லது இடங்களில் சேமித்து வைக்கப்பட வேண்டும் அல்லது பூச்சிக்கல்லியின் அளவு மற்றும் தன்மை பொருத்து தனி அலமாரிகளில் பூட்டி வைக்கப்பட வேண்டும். 2. பூச்சிகொல்லி சேமித்து வைக்கப் பயன்படும் அறைகள் அல்லது இடங்கள் நன்றாக கட்டப்பட்டதாக, நல்ல வெளிச்சமுள்ளதாக, காற்றோட்டமுள்ளதாக மற்றும் ஆகியுடன் கலந்து மாசுபடுவதைத் தவிர்க்க போதுமான அளவுடையதாய் இருக்க வேண்டும். சேமிப்பு நிலவாரம் நன்கு உலர்ந்தும் குளிர்ச்சியாகவும் இருக்க வேண்டும்.

காலியான கொள் கலனை அப்புறப்படுத்துதல்: 1. பேக்கேஜ் அல்லது உபரிப் பொருள்கள் மற்றும் இயந்திரங்களையும் கொள்கலன்களையும் கழுவிய நீர் இவற்றை சுற்றுப் கூழல் அல்லது நீர்நிலை மாசு படாதவாறு பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டும். 2. உபயோகப்படுத்தப்பட்ட கொள்கலன்கள் மற்றும் பேக்கேஜுகள் அதன் மறு உபயோகத்தை தவிர்க்க வெளியே விட்டு வைக்கக்கூடாது. 3. பேக்கேஜுகள் வசிப்பிடங்களுக்கு அப்பால் உடைத்து புதைக்கப்பட வேண்டும்.

வேதியியல் கலவை:

சைப்மெத்ரின் டெக். (செயலில் உள்ள பொருட்கள் எடைக்கு எடை 50% w/w a.i.உள்ள அடிப்படையில்)	:	20.0% w/w
பாலம்மாக்கி (எத்திலீன் ஆக்சைடு செறிபொருளில் அல்கைல் பீனால் மற்றும் சல்போனேட்		
அல்கைல் பென்சீன் கொண்ட கலவை)	:	8.8% w/w
கரைப்பான் (சைலீன்)	:	71.2% w/w
மொத்தம்	:	100.0% w/w

பிரத்யேக மறு நுழைவு காலம்: 48 மணி நேரம்.

எச்சரிக்கை : இந்த லேபிலில்/கையேட்டில் குறுப்பிட்டு இருக்காத பயிர்கள் மீது பயன்படுத்தக்கூடாது.

Tamil

క్రిప్‌కార్డ్ 10% ఇ.సి.

క్రీటకనాశని

సైపర్‌మెథ్రిన్ 10% ఇ.సి.

ఇది సైపర్‌మెథ్రిన్ మరుకైన పదార్థం కలిగి ఉన్న సింథటిక్ పైరెథ్రాయిడ్ పురుగుమందు. ద్రవ్యరాశి ద్వారా 10% మరియు ఇతర సంబంధిత పదార్థాలను సమతుల్యం చేయండి.

వాడుటకై చేయబడిన సిఫారసులు : $\frac{\text{ఫార్ములేషన్ ఎ.ఐ. X 100}}{\text{10. X ఎస్పీ. జీఆర్ (0.99)}}$

పంట	కీటకం యొక్క సాధారణ పేరు	మోతాదు/హె			చివర చల్లడం మరియు పంట తీగుబడికి వీలు ఉండవలసిన సమయం
		ఎ.ఐ. (గ్రా)	ఫార్ములేషన్ (మి.లి.)	నీటిలో పలుచన (లీటర్లలో)	
పత్తి	మచ్చల పురుగు	50-70	550-760	150-1000	7
	అమెరికన్ మచ్చల పురుగు				
	గులాబి మచ్చల పురుగు				
క్యాబేజి	డైమండ్ బ్యాక్ మాత్	60-70	650-760	100-400	7
బెండ	ఫ్రూట్‌బోరర్	50-70	550-760	150-500	3
వంకాయ	ఫ్రూట్ మరియు షూట్ బోరర్	50-70	550-760	200-600	3
గోధుమ	షూట్ ఫ్లై	50	550	300-800	14
సన్‌ఫ్లవర్	బీహార్ హెయిరీ గొంగళిపురుగు	60-70	650-760	500-700	

పంట సమయా న్ననుసరించి నీటి పరిమాణం ఆధారపడి ఉంటుంది.

వాడుకన ఉపయోగించే పరికరాలు: నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, నాప్‌సాక్ పవర్ స్ప్రేయర్, మోటరైజ్డ్ నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్ కమ్ డస్టర్, కంప్రెషన్ నాప్‌సాక్ బ్యాటరీ స్ప్రేయర్, వీల్ బారో స్ప్రేయర్.

ప్రథమ చికిత్స చర్యలు: విషపూరిత లక్షణాలు కనిపిస్తే, వెంటనే వైద్యుడిని పిలవండి. రోగలక్షణంగా చికిత్స చేయండి. చర్మం కలుషితమైతే, ప్రభావిత ప్రాంతాన్ని సమృద్ధిగా నీరు మరియు సబ్బుతో కడగాలి. కళ్ల ప్రాంతం కలుషితమైతే, సాధారణ సెలైన్ లేదా నీటితో సుమారు 15 నిమిషాల పాటు నీటిపారుదల చేసి, వైద్యుడిని సంప్రదించండి.

డ్రగ్ థెరపీ: రోగలక్షణంగా చికిత్స చేయండి.

స్ప్రేయింగ్ తర్వాత జాగ్రత్తలు : చేతులు, చర్మం, వేలుగోళ్లు మరియు వెంట్రుకలు సమృద్ధిగా నీరు మరియు సబ్బుతో కడగడం వంటివి కలుషితమైనవి. కళ్ళు కలుషితమైతే, సాధారణ సెలైన్ లేదా నీటితో సుమారు 15 నిమిషాల పాటు నీళ్ళు పోసి, డాక్టర్‌ని సంప్రదించండి. కలుషితమైన బట్టలు మార్చండి. స్ప్రేయింగ్ కోసం ఉపయోగించే పరికరాలను పుష్కలంగా నీరు మరియు సబ్బుతో శుభ్రం చేయండి.

రవాణా : రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ జారీ చేసిన "RE– TARRIF" లో పేర్కొన్న షరతులకు అనుగుణంగా రైలు ద్వారా రవాణా చేయడానికి అందించే మెటీరియల్‌ని కలిగి ఉన్న ప్యాకేజీలు బ్యాక్ చేయబడతాయి, పదార్థం నేరుగా ఆహారంతో సంబంధంలోకి రాని విధంగా రవాణా చేయబడుతుంది లేదా నిల్వ చేయబడుతుంది. పదార్థాలు మరియు పశుగ్రాసం.

విషలక్షణములు: వణుకు, నరాలచలుకు, ఆతురత, ఫిట్సు, దురదలు, తుమ్ములు, ముక్కుకారుట, స్కిన్ అలర్జి మరియు ముక్కుదిబ్బడ వంటి లక్షణాలు వాటిల్లవచ్చు.

ముందుజాగ్రత్తలు : 1. ద్రావణం తయారుచేసేటప్పుడు పీల్చకండి మరియు ఒలికిపోవడం వల్ల లేదా చిందేసేవడం వల్ల చర్మానికి తగలివ్వకండి. 2. బట్టే చేతులతో మిశ్రమం చేయకండి. 3. వినియోగించేటప్పుడు తినకండి, త్రాగకండి, నమలకండి లేదా ధూమపానం చేయకండి. 4. వాడిన తరువాత మలినపడిన చర్మాన్ని కడగండి మరియు దుస్తులు ఉతికేంచండి. 5. వాడిన తరువాత ఖాళీ డబ్బాలను ధ్వంసం చేయండి.

నిల్వ పరిస్థితులు : 1. కీటకనాశనులు ఉన్న ప్యాకేజీలను ఇతర వస్తువులను, ప్రత్యేకించి ఆహార వస్తువులకు ఉపయోగించే గదులు లేదా ఆవరణలకు దూరంగా వేరే గదులు లేదా ఆవరణల్లో నిల్వచేయండి లేదా వేరుగా ఉంచండి. కీటకనాశని పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టే తాళం వేసిన అల్మారాల్లో ఉంచండి. 2. కీటకనాశని నిల్వచేసేందుకు ఉద్దేశించిన గదులు లేదా ఆవరణలు ఆనిరికో మలినపడకుండా నిరోధించేందుకు వీలుగా బాగా నిర్మించినవై, పాడైన ఉన్నవై, మంచి గాలి వెలుతురు ఉన్నవై మరియు తగినంత కొలతలతో నిర్మించినవై ఉండాలి.

ఖాళీ కంటెయినర్‌ల నిర్వహణ : 1. ప్యాకేజీలను లేదా మిగులు మెటీరియల్స్‌ని మరియు యంత్రం మరియు కంటెయినర్‌లను కడిగిన నీటిని వాతావరణ మరియు నీటి కాలువ్యాన్ని నిరోధించేందుకు వీలుగా సురక్షితమైన పద్ధతిలో పిన్నిం చవలెను. 2. వాడిన ప్యాకేజీలను మళ్ళీ వాడకుండా నిరోధించాలంటే వాటిని అరుబయట పారేయకూడదు. 3. ప్యాకేజీలను పగులగొట్టి నివాసప్రాంతాలకు దూరంగా నేలలో పూడ్చివెట్టాలి.

రసాయన కూర్పు:

సైపర్‌మెథ్రిన్ టెక్. (50% w/w a.i. ఆధారంగా) ఎమల్సిఫైయర్ (ఆల్కైల్ ఫినాల్ సల్ఫోనేట్ ఆల్కైల్ బెంజీన్ యొక్క ఇథిలీన్ ఆక్సైడ్ కండెన్సేట్ మిశ్రమం)	:	20.0% w/w
ద్రావకం (జైలీన్)	:	8.8% w/w
మొత్తం	:	71.2% w/w
	:	100.0% w/w

పీచికారి చేసిన పిదప ప్రవేశించు వ్యవధి : 48 గంటలు

జాగ్రత్త : లేబుల్/కరపత్రం మీద పున్న పంటలు కాకుండా ఇతర పంటల మీద వాడరాదు.

Telugu

क्रिपकॉर्ड 10% ई.सी.

कीटनाशक

साइपरमेथ्रीन 10% ई.सी.

एह एक सिंथेटिक पारेथ्रोयड आधारित कीटनाशक है जिसमें भारानुसार सायपरमेथ्रिन सकीय तत्व १०% तथा बाकी अन्य सहयोगी पदार्थ है !

उपयोग की मात्राये :– $\frac{\text{फार्मुलेशन : स.x तत्व}}{\text{१० x आ. ध. (०.९९)}}$

फसल	कीट के सामान्य नाम	मात्रा निर्धारण/एच.ए.			प्रथम छिड़काव व फसल में काटने प्रतीक्षा अवधि
		ए.आई. (ग्राम)	सूत्रीकरण (एम.एल.)	पानी में तनूकरण	
कपास	चित्तीदार डोंडे की सुंडी	50-70	550-760	150-1000	7
	अमरीकी डोंडे की सुंडी				
	गुलाबी डोंडे की सुंडी				
बंदगोबी	डायमॉन्ड बैक मॉथ	60-70	650-760	100-400	7
ओकरा	फल छेदक	50-70	550-760	150-500	3
बैगन	फल एवं तना छेदक	50-70	550-760	200-600	3
गेहूँ	पानी की मक्खी	50	550	300-800	14
सूरजमुखी	बिहार सुंडी (कैटरपिलर)	60-70	650-760	500-700	

*पानी कि मात्रा फसल कि अवस्था पर निर्भर करती है ।

उपयोग में आने वाले यन्त्र :– नेपसेक स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर, काम्प्रेशन नेपसेक स्प्रेयर, काम्प्रेशन नेपसेक बैटरी स्प्रेयर तथा एस.पी. ई. ई. एच.टी. पी. पावर स्प्रेयर, नेपसेक पावर स्प्रेयर, हवील बारो स्प्रेयर इत्यादी ।

जहर चढ़ने के लक्षण :– घबराहट, परेशानी, कंपकपी, शरीर में ऐठन त्वचा में खुजलाहट, छीक आना..नाक बहना तथा नाक क जकड जाना ।

प्राथमिक चिकित्सा :–विष के लक्षण दिखाई देते ही तुरन्त डाक्टर को बुलाऐं । लक्षणों के अनुसार इलाज करें। कीटनाशक से प्रभावित त्वचा को साबून और पानी से अच्छी तरह धो डालें । कीटनाशक आंख में चली गयी हो तो आंख को स्वच्छ पानी या नार्मल सेलाइन से १५ मिनट तक अच्छी तरह धोयें। फिर डाक्टर को बुलाऐ दिखाएं ।

ओषधि चिकित्सा :– लक्षणानुसार इलाज करें।

सावधानियां : १. घोल बनाते समय कीटनाशक के होते त्वचा अथवा आंखों में न पड़ने दें। कीटनाशक के सम्पर्क से बचें। २. नंगे हाथों कीटनाशक का उपयोग न करें। ३. उपयोग करते समय खाना पीना तथा धूम्रपान करना मना है । ४. उपयोग करने के बाद दूषित त्वचा ओर कपडों को धो डालें खफ

छिड़काव करने के बाद सावधानियां : छिडकाव करने के बाद दूषित अंगों को साबून और पानी से अच्छी तरह धो डालें । कीटनाशक आंखों में चली गई हो तो स्वच्छ पानी या नारमल सेलाइन अच्छी तरह १५ मिनट तक धोयें । उपयोग के बाद यन्त्रों को अच्छी तरह साबून या पानी से धो डालें । दूषित वस्त्रों को बदल दें ।

वाहनों का प्रयोग : कीटनाशक से भरे पैकेट को रेल से भेजने के लिये मंत्रालय द्वारा जारी किये गये नियम के मुताबिक ही पैकेट बनायें । वहनों में ले जाते समय या गोदामों में रखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि खाध् पदार्थ तथा पशू आहार कीटनाशक के सम्पर्क में न आयें ।

संग्रह : १. कीटनाशक के डिब्बों को अलग अलग कमरों या आलमारियों में जांकि अन्य कमरों तथा आलमारि सें जिनमें अन्य वस्तुएं विशेषकर खाद्य पदार्थ या पशू आहार संग्रहित किए जाते है से दूर अन्य कमरों से दूर अलग अलग कमरों में या आलमारियों में ताला चावी में बंद रखें । २. जिन कमरों या आलमारियो में कीटनाशक का भण्डारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाशयुक्त, हवदार व पर्याप्त लम्बा चौडा होना चाहियें ताकि कीटनाशक भाप से वातावरण प्रदूषण होने का डर न हों ।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. खाली डिब्बों को अच्छी तरह तोड फोडकर आवादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहियें। २. उपयोग के बाद खाली डिब्बों को खुला हुआ बाहर न छोडें ओर नही खाद्य पदार्थ व दूसरी चीजें रखने के काम में लावे । ३. बची हुई कीटनाशक तथा यन्त्रों के धोवन को इस प्रकार निपटारा करें कि जिससे आसपास के वातावरण तथा पीने का पानी विषौला न हों !

रासायनिक संघटन :

सायपरमेथ्रिन टेक्निकल	:	२०.०% भा/भा
भारानुसार ५०% स.त. पर आधारित इमल्सिफायर – इथिलीन आक्साइड कन्हें–सेट आफ एल्काइल फिनाल व सल्फोनेट		
एल्काइल बेंजीन का मिश्रण	:	८.८% भा/भा
घोलक – जाइलीन	:	७१.२% भा/भा
कुल	:	१००.०% भा/भा

छिडकाव के ४८ घंटे बाद क्षेत्र में प्रवेश करें।

सावधानी : इस लेबल/पत्रिका में निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें।

Hindi

KRIPCORD 10% E.C.

Insecticide

Cypermethrin 10% E.C.

It is a synthetic pyrethroid insecticide containing Cypermethrin a.i. 10% by mass and balance other relevnt ingredients.

RECOMMENDATIONS FOR USE : $\frac{\text{(Formulation A.I. x 100)}}{\text{10 x Sp. Gr. (0.91)}}$

Crop	Common name of Insect Pest	Dosage/ha			Waiting period between last spray and harvest
		a.i (gm.)	Formula-tion (ml.)	Dilution in water (Ltrs)	
Cotton	Spotted Boll worm	50-70	550-760	150-000	7
	American Bollworm				
	Pink Bollworm				
Cabbage	Diamond back moth	60-70	650-760	100-400	7
Okra	Fruitborer	50-70	550-760	150-500	3
Brinjal	Fruit & Shoot Borer	50-70	550-760	200-600	3
Wheat	Shootfly	50	550	300-800	14
Sunflower	Bihar hairy caterpillar	60-70	650-760	500-700	

*Quantity of water will depend on the age of the crop.

EQUIPMENT USED IN APPLICATION : Knapsack sprayer, Knapsack power sprayer, motorised knapsack sprayer cum duster, compression knapsack battery sprayer, Wheel barrow sprayer.

FIRST AID MEASURES : In case of poisonous symptoms occur, call the physician immediately. Treat symptomatically. If skin is contaminated, wash the affected area with copious water and soap. If eyes area contaminated irrigate with normal saline or water for about 15 minutes and refer to a Doctor.

DRUG THERAPY : Treat Symptomatically.

POST SPRAYING PRECAUTIONS : Wash contaminated are like hands, skin, fingernails and hair with copious water and soap. If eyes are contaminated irrigate with normal saline or water for about 15 minutes and refer to doctor. Change contaminated cloths. Clean the equipment used for the spraying with plenty of water and soap.

TRANSPORT : Packages containing the material offered for transport by rail, shall be packed in accordance with the conditions specified in "RED TARRIF" issued by the Ministry of Railways, The material shall be transported or stored in such a way not to come in direct contact with food stuffs and animal feeds.

Precautions: 1. Avoid inhalation and skin contact while diluting because of spillage or splashes. 2. Do not mix with bare hands. 3. Do not eat, drink, chew or smoke during application. 4. Wash contaminated skin and clothes after use. 5. Destroy empty containers after use.

Storage Conditions: 1. The packages containing the insecticides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate Almirah under lock and key, depending on the quantity and nature of the insecticide. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well-lit and ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour.

Disposal of empty containers: 1. Packages or surplus materials and washing from the machine and containers shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

CHEMICAL COMPOSITION :

Cypemethrin Tech. (Based on 50% w/w a.i.) Emulsifier(Mixture of ethylene oxide condensate of alkyl phenol & sulphonate alkyl benzene)	:	20.0% w/w
	:	8.8% w/w
Solvent (Xylene)	:	71.2% w/w
Total	:	100.0% w/w

Optimal re-entry period : 48 hrs.

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

English

Read Instructions Leaflet before use

उपयोग से पहले निर्देश पत्रिका पढ़े।

For Agricultural use only

केवल कृषि उपयोग के लिए

Store in a cool, dry and well ventilated place.

ठंडी, सूखी और अच्छी तरह हवादार जगह में संग्रह करें।

Cypermethrin 10% E.C.

KRIPCORD 10% EC

(Insecticide)

साइपरमेथ्रीन १०% ई.सी.

क्रिपकॉर्ड १०% ई.सी.

(कीटनाशक)

CIR-34,236/2000-CYPERMETHRIN (EC)-1938

TRADITION • INNOVATION • TRUSTEESHIP

KRISHI RASAYAN GROUP

SINCE 1966 IN AGROCHEMICALS

Manufactured and Marketed By:

KR Lifesciences Pvt. Ltd.

29, LALA LAJPAT RAI SARANI,

KOLKATA - 700 020, INDIA

E-mail : kr@krishirasayan.com

निर्माता एवं विपणनकर्ता :

केआर लाईफसाईन्सेस प्रा.लि.

29, लाला लाजपत राय सारनी, कोलकाता – 700020

For manufacturing unit address see first three characters of batch no. and see below :

KRR :

Maitapur, P.O. Ranital, Balasore,

Orissa, PIN - 756 111

Mfg. Lic. No. e-Lic/INSECTI/MAN-PP-2

KRK :

Joykrishnapur, P.O. Bonhoogly II

Sonarpur, South 24 Parganas,

West Bengal, PIN - 700 103

Mfg. Lic. No. MPP/ILC/145/K-2

Customer Care Detail :

KR LIFESCIENCES PVT. LTD.

29, Lala Lajpat Rai Sarani, Kolkata - 700 020

Toll Free No. : 18001211800

email : customercare@krishirasayan.com

Not to be used on crops other than specified on this leaflet

DANGEROUS TO RE-USE EMPTY CONTAINERS/PACKAGES