ଥାୟମେଥୋକ୍ସାମ 12.6% + ଲାମ୍ବଡ଼ା-ସାଇହାଲୋଥ୍ରିନ୍ 9.5% ଜେଡ.ସୀ.
ଅନ୍ତପ୍ରବାହୀ ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶୀୟ କୀଟନାଶକ

ଥାୟମେଥୋକ୍ସାମ 12.6% ଲାମ୍ବଡ଼ା-ସାଇହାଲୋଥ୍ରିନ୍ 9.5% ଜେଡ.ସୀ. ହେଉଛି ବହୁ ଉପଯୋଗୀ କୀଟନାଶକ ମିଶ୍ରଣ, ଯାହା ତୀବ୍ର ଭାବେ ଉଦରୀୟ ତଥା ସଂସ୍ପର୍ଶୀୟ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ସୁପାରିଶ କପା ଫସଲରେ ଲାଗୁଥିବା ଆଫିଡ, ଜାସିଡ଼ସ୍, ଥ୍ରିପ୍ସ ଏବଂ ଜିଆ ଜାତୀୟ କୀଟ, ମକ୍କାରେ ଲାଗୁଥିବା ଆଫିଡ, ଶୁଟଫ୍ଲାଇ, ଷ୍ଟେମ୍ ବୋରର୍, ଚିନାବାଦାମ ଫସଲରେ ପତ୍ର ଖାଉଥିବା କୀଟ ଲିଫ ହପର, ଲିଫ ଇଟିଙ୍ଗ କାଟରପିଲର, ସୋୟାବିନ ଫସଲରେ ଷ୍ଟେମ ଫ୍ଲାଇ, ସେମି ଲୁପର, ଗାର୍ଡଲ ବିଟଲ, ଲଙ୍କା ଫସଲରେ ଥ୍ରିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରୁଟ ବୋରର୍, ଚା ଫସଲରେ ଥ୍ରିପ୍ସ, ସେମି ଲୁପର, ଟି ମସ୍କୁଟୋ ବଗ, ଟମାଟୋ ଫସଲରେ ଫଳ ଛିଦ୍ର କରୁଥିବା କୀଟ, ଥ୍ରିପ୍ସ, ଧଳା ମାଛି ଇତ୍ୟାଦି କୀଟଗୁଡ଼ିକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ।

ଉପଯୋଗ:

ଫସଲ	କୀଟର ନାମ	ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ମାତ୍ରା ସ.ତତ୍ତ୍ୱ (ଗ୍ରାମ)	ସଂରଚନା (ମି.ଲି.)	ପାଣିର ମାତ୍ରା (ଲି.)	ଅନ୍ତିମ ସ୍ପ୍ରେ ତଥା ଫସଲ କାଟିବା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ (ଦିନ)	ପୁନଃ ପ୍ରବେଶର ଅବଧି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ପ୍ରେ ପରେ (ଘଣ୍ଟା)
କପା	ଆଫିଡ,ଜାସିଡ଼ସ୍ ଥ୍ରିପ୍ସ ଏବଂ ଜିଆ ଜାତୀୟ କୀଟ	44	200	500	26	-
ଚା	ଥ୍ରିପ୍ସ, ସେମିଲୁପର, ଟି ମସ୍କୁଟୋ ବଗ	33	150	500	1	-
ଟମାଟୋ	ଥ୍ରିପ୍ସ, ଧଳାମାଛି, ଫଳ ଛେଦକ	27.5	125	500	5	-
ମକ୍କା	ଆଫିଡ, ଶୁଟଫ୍ଲାଇ, ଷ୍ଟେମ୍ ବୋରର୍ (ବୃନ୍ତ ଛେଦ କରୁଥିବା)	27.5	125	500	42	-
ଲଙ୍କା	ଥ୍ରିପ୍ସ ଏବଂ ଫଳ ଛେଦକ	33	150	500	3	-
ଚିନାବାଦାମ	ଲିଫ ହପର, ପତ୍ରଖିଆ କୀଟ	27.5	125	500	28	-
ସୋୟାବିନ୍	ଷ୍ଟେମ ଫ୍ଲାଇ, ସେମି ଲୁପର, ଗାର୍ଡଲ ବିଟଲ	27.5	125	500	48	-

ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ: ଉତ୍ପାଦର ଆବଶ୍ୟକ ମାତ୍ରା ମାପ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମ୍ ପାଣିରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାନ୍ତୁ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ ତାହା ଘାଣ୍ଟି ପାଣିର ଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାତ୍ରା ଢାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ନ୍ୟାପସେକ୍ ସ୍ପ୍ରେୟର କିମ୍ବା ହାଇ ଭଲ୍ୟୁମ ସ୍ପ୍ରେୟର ଦ୍ୱାରା ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ।
ପ୍ରୟୋଗ ସମୟ: ଫସଲରେ ଫୁଲ ଆସିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉପଚାରିତ କ୍ଷେତ୍ରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଫୁଲ ଥିବା ଫସଲ, (ଫୁଲ ଅବସ୍ଥା) ଏବଂ ଲତାବୁଦାଗୁଡ଼ିକରେ ହାୱା ଦ୍ୱାରା ଉଡି ଯାଉଥିବା ସ୍ପ୍ରେକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଫିଡ଼ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଅତ୍ୟଧିକ ମଧୁଯୁକ୍ତ ଫସଲ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉପଚାରିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫୁଲ ଯୁକ୍ତ ଫସଲରେ ଫୁଲ ଧରିବାର 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ଫୁଲ ହେବାଯାଏଁ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମହୁମାଛି ସକ୍ରିୟ ସମୟରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତଥା ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଷାକ୍ତ।
ପ୍ରୟୋଗକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାବଧାନତା: ସ୍ପ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରନ୍ଧୁଥିବା ବାସନକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ପ୍ରେ ମିଶ୍ରଣକୁ ଘାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ କାଠି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶରୀର, ଆଖି ଏବଂ ମୁହଁକୁ କୀଟନାଶକଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ ତଥା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ବସ୍ତ୍ର ଯେପରିକି ମାସ୍କ, ଗ୍ଲୋଭସ,ଗଗଲସ, ଜୋତା, ଫୁଲ ହାତ ଥିବା ପୋଷାକ ଇତ୍ୟାଦି ପିନ୍ଧି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଉଚିତ୍। କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଏବଂ ଧୂମ୍ରପାନ କରିବା ଅନୁଚିତ୍। ପ୍ରତିଦିନ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପରେ କୀଟନାଶକ ପ୍ରଭାବିତ ଅଙ୍ଗକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୂଷିତ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୁଅନ୍ତୁ। ପବନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଡୁଥିବା ସ୍ପ୍ରେର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ନଦୀ, ଗାଡ଼ିଆ, ପୋଖରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଳସଂଗ୍ରହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅବଶିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ, ତଥା ଉଭୟ ସ୍ପ୍ରେ ହୋଇଥିବା ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଖାଲି ହୋଇଥିବା ଔଷଧ ଡ଼ବାଗୁଡ଼ିକ ପାଣିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କଲେ ଜଳାଶୟ ଦୂଷିତ ହୋଇଯିବ।
ବିଷ ଲକ୍ଷଣ: ମୂଷାମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅସନ୍ତୁଳନ, ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିବା, ଲୁହ ବୋହିବା, ନିଃଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦେଇପାରେ।
ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା: ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ସ୍ଥାନରୁ ଖୋଲା ପବନକୁ କିମ୍ବା ହାୱାଦାର କୋଠରୀକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାପମାତ୍ରାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତୁ।
ଚମଡ଼ାରେ ଲାଗିଗଲେ: ଦୂଷିତ ବସ୍ତ୍ରକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ତଥା ଶରୀରର ପ୍ରଭାବିତ ଭାଗକୁ ସାବୁନ ଏବଂ ପାଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। **ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲେ:** ଆଖିକୁ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। **ଢୋକି ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ:** ପାଣିରେ ମେଡ଼ିସିନାଲ ଚାରକୋଲକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗୋଳି ବାରମ୍ବାର ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। **ସୂଚନା:** ଯଦି ରୋଗୀ ବେହୋସ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପାଟିରେ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାନ୍ତି କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଉଦ୍ଭିଦ ବିଷାକ୍ତତା: ସାଧାରଣ
ବିଷନାଶକ: କୌଣସି ବିଶେଷ ପ୍ରତିବିଷ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ।
ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଖାଲି ଡ଼ବାଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା: 1. ପର୍ଯ୍ୟାବରଣକୁ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଡ଼ବା, ଅବଶିଷ୍ଟଥିବା ମିଶ୍ରଣ/ପଦାର୍ଥ, ମେସିନ ସଫା କରିବା ଏବଂ ଖାଲି ଡ଼ବାଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ କରନ୍ତୁ। 2. ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଡ଼ବା/ପ୍ୟାକେଟଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗିବା ଅନୁଚିତ୍। 3. ଡ଼ବା/ପ୍ୟାକେଟଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି କରି ଜନବସତିଠାରୁ କିମ୍ବା ବାସସ୍ଥାନରୁ ଦୂରରେ ମାଟି ଭିତରେ ପୋତି ଦେବା ଉଚିତ୍।
ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ପ୍ରଣାଳୀ: 1. କୀଟନାଶକ ଡ଼ବାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା କୋଠରୀଠାରୁ ବା ସେହି ସ୍ଥାନଠାରୁ ଦୂରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠରୀରେ କିମ୍ବା ତାଲା ଦେଇ ଆଲମାରୀରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍। 2. କୀଟନାଶକ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା କୋଠରୀ ବା ସ୍ଥାନ ମଜବୁତ, ଶୁଖିଲା ଏବଂ ବାୟୁ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଥିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ସେହି କୋଠରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ହେବା ଉଚିତ୍ ଯଦ୍ୱାରା ବାଷ୍ପର ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବନାହିଁ।

ରାସାୟନିକ ସଂରଚନା:

ଲାମ୍ବଡ଼ା-ସାଇହାଲୋଥ୍ରିନ୍ (ସକ୍ରିୟ ତତ୍ତ୍ୱ)	9.5% ଓଜନ/ଓଜନ
ଥାୟମେଥୋକ୍ସାମ (ସକ୍ରିୟ ତତ୍ତ୍ୱ)	12.6% ଓଜନ/ଓଜନ
ଓକ୍ଟାଡେକାନୋଇକ ଏସିଡ, 12-ହାଇଡ୍ରକ୍ସି ହୋମୋପୋଲିମେର୍ ଓକ୍ଟାଡ଼ୋକାନୋଏଟ (ପୋଲିମେର୍)	0.8% ଓଜନ/ଓଜନ
ଷ୍ଟିରିଲଫେନୋଲ, ପୋଲିଇଥୋକ୍ସିଇଷ୍ଟର ଫସ୍ଫେଟ	1.17% ଓଜନ/ଓଜନ
ସୋଡ଼ିୟମ ଲିଗନୋ ସଲଫୋନେଟ ଇଥାକ୍ସିଲେଟେଡ	1.17% ଓଜନ/ଓଜନ
ଆମୋନିଆ	0.25% ଓଜନ/ଓଜନ
ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ	0.54% ଓଜନ/ଓଜନ
ଲିଗନୋସଲଫୋନେଟ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସଲ୍ଟ	1.04% ଓଜନ/ଓଜନ
ପୋଲିଡ଼ାଇମିଥାଇଲ ସିଲୋକ୍ସେନ୍	0.10% ଓଜନ/ଓଜନ
କୋପୋଲାଇମେର୍ ବୁଟାନୋଲ	0.50% ଓଜନ/ଓଜନ
ଡ଼ୋଡ଼ିସିଲବେନଜିନ୍‌ସଲଫୋନିକ୍ ଏସିଡ, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସଲ୍ଟ	0.17% ଓଜନ/ଓଜନ
ଡ଼ିଏଲ୍-ପ୍ରୋପାନେଡ଼ିଅଲ-(1,2)	0.20% ଓଜନ/ଓଜନ
ପ୍ରୋପେନ୍-1,2,3-ଟ୍ରାଇଓଲ	5.84% ଓଜନ/ଓଜନ
ହେଟେରୋପାଲିସକାରାଇଡ	0.20% ଓଜନ/ଓଜନ
1,2-ବେନଜିସୋଥିୟାଜୋଲିନ୍-3-ୱାନ	0.28% ଓଜନ/ଓଜନ
ଟିଟାନିୟମ ଡାଇଅକସାଇଡ	0.99% ଓଜନ/ଓଜନ
ଆୟସୋସାୟନିକ ଏସିଡ, ମିଥାଇଲ-ଏମ୍-ଫିନାଇଲିନ୍ ଇଷ୍ଟର	1.58% ଓଜନ/ଓଜନ
ମିକ୍ସ୍‌ଚର ଅଫ ଏରୋମେଟିକ୍ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍‌ସ (ସଲଭେଣ୍ଟ ସି-9)	7.76% ଓଜନ/ଓଜନ
ପାଣି	QS %
ସମୁଦାୟ :	100.00% ଓଜନ/ଓଜନ

ପୁନର୍ବାର ସମୟ: 48 ଘଣ୍ଟା
ସାବଧାନତା: ଏହି ଲେବଲ/ପତ୍ରିକାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଥିବା ଫସଲ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଫସଲରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

থায়'মেথ'ক্সাম 12.6% + লেমডা-ছায়হল'থ্রিন 9.5% জেড.চি.
অন্তৰপ্ৰবাহী আৰু স্পৰ্শীয় কীটনাশক

থায়'মে'থক্সাম 12.6% + লেমডা-ছায়হল'থ্রিন 9.5% জেড.চি. হৈছে এক বহুপযোগী কীটনাশক মিশ্ৰণ, য'ত উদৰৰ সৈতে তথা সংস্পৰ্শীয় ক্ৰিয়াশীলতা থাকে আৰু ইয়াৰ চিফাৰিছ কপাহৰ খেতিত লগা এফিডছ, জাছিডছ, থ্ৰিপছ আৰু বলৱৰ্ম; গোমধানত এফিড, শ্বুটলি, ষ্টেম ব'ৰাৰ; বাদামত লীফ হ'পাৰ, লীফ ইটিং কেটাৰপিলাৰ; ছয়াবীনত ষ্টেম ফ্লাই, ছেমিলুপাৰ, গাৰ্ডল বীটল; জলকীয়াত থ্ৰিপছ আৰু ফ্ৰুট ব'ৰাৰ; চাহপাতত থ্ৰিপছ, ছেমিলুপাৰ, টী মছকুইটো বাগ; বিলাহীৰ খেতিত থ্ৰিপছ, হোৱাইটফ্লাই, ফ্ৰুট ব'ৰাৰ আদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ।

অনুমোদনসমূহঃ

শস্য	কীটটোৰ সাধাৰণ নাম	এ.আই (গ্ৰা.)	ড'জ/HA ফৰ্মুলেশ্যন (মি.লি.)	পানীত দ্ৰৱণ (লিটাৰ)	শেষবাৰ ছটিওৱাৰ পৰা দোৱালৈকে অপেক্ষাৰ সময় (দিন)	প্ৰতিবাৰে প্ৰয়োগৰ পাছত ৰি-এন্ট্ৰি (ঘন্টাত)
কপাহ	এফিডছ, জাছিডছ, থ্ৰিপছ আৰু বলৱৰ্ম	44	200	500	26	-
চাহপাত	থ্ৰিপছ, ছেমিলুপাৰ, টী মছকুইটো বাগ	33	150	500	1	-
বিলাহী	থ্ৰিপছ, হোৱাইটফ্লাই, ফ্ৰুট ব'ৰাৰ	27.5	125	500	5	-
গোমধান	এফিড, শ্বুটলি, ষ্টেম ব'ৰাৰ	27.5	125	500	42	-
জলকীয়া	থ্ৰিপছ আৰু ফ্ৰুট ব'ৰাৰ	33	150	500	3	-
বাদাম	লীফ হ'পাৰ, লীফ ইটিং কেটাৰপিলাৰ	27.5	125	500	28	-
ছয়াবীন	ষ্টেম ফ্লাই, ছেমিলুপাৰ, গাৰ্ডল বীটল	27.5	125	500	48	-

প্ৰয়োগৰ বাবে নিৰ্দেশঃ সামগ্ৰীবিধ প্ৰয়োজনীয় মাত্ৰাত জুখি লওক আৰু অলপ পানীত ভালদৰে মিহলাওক। নিৰ্দেশ অনুসৰি লৰাই লৰাই পানীৰ অৱশিষ্টখিনি নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণত দিয়ক আৰু নেপচেক স্প্ৰেয়াৰ্ছ বা হাই ভলিউম স্প্ৰেয়াৰ্ছৰ সহায়ত ছটিয়াওক।
প্ৰয়োগৰ সময়ঃ শস্যত ফুল থকাৰ সময়খিনিত স্প্ৰে নকৰিব। প্ৰয়োগ কৰা ক্ষেত্ৰৰ কাষৰ ফুল থকা শস্য, হে'জ আদিত বায়ুৰ দ্বাৰা বিয়পি পৰা সিঞ্চনৰ অৱশিষ্টৰ দ্বাৰা প্ৰভাবিত হ'বলৈ নিদিব। যদি ঠাইখিনিত অধিক পৰিমাণৰ এফিড হানীডিউ উপলব্ধ থাকে, তেতিয়াও স্প্ৰে নকৰিব। ফুল ফুলা শস্যত ফুলাৰ পাঁচদিন আগলৈকে আৰু পাছলৈকে স্প্ৰে নকৰিব। মৌমাখিবিলাক সক্ৰিয় হৈ থকাৰ সময়ত স্প্ৰে নকৰিব, আৰু লগতে এইয় মাছৰ বাবেও বিষাক্ত।
প্ৰয়োগ কৰোঁতাৰ বাবে সতৰ্কতাঃ আহাৰ বন্ধা বা খোৱা বাচনত স্প্ৰে সাজু নকৰিব। স্প্ৰেৰ মিশ্ৰণ প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে লাঠি বা কাঠৰ টুকুৰা ব্যৱহাৰ কৰক। ছাল, চকু আৰু মুখখন কীটনাশকৰ স্পৰ্শলৈ আহিবলৈ নিদিব আৰু উশাহৰ দ্বাৰা ভিতৰলৈ যাবলৈ নিদিব। নিৰাপদ কাপোৰ যেনে এপ্ৰন, হাতমোজা, মুখা আৰু গাম বুট আদি পিন্ধি হে ইয়াক প্ৰয়োগ কৰিব। কীটনাশক ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত আহাৰ গ্ৰহণ বা পানীয় গ্ৰহণ অথবা ধূম্ৰপান কৰা অনুচিত। প্ৰত্যেকদিনা ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত কীটনাশক লগা অংশবিলাক ভালদৰে ধুই কাপোৰ সলাই ল'ব। দূষিত কাপোৰবিলাকো ভালদৰে ধুই ল'ব। বায়ুৰ দ্বাৰা বিয়পি পৰা সিঞ্চনৰ অৱশেষখিনি নদী, জলাশয়, পুখুৰী আৰু অন্যান্য পানী জমা হোৱা অঞ্চলৰ সৈতে মিলিবলৈ নিদিব। বাকী ৰোৱা পদাৰ্থখিনি পেলাওঁতে বা খালী পাত্ৰকেইটাৰ দ্বাৰা জলাশয়সমূহ দূষিত হ'বলৈ নিদিব।
বিষৰ লক্ষণঃ নিগনিৰ ওপৰত বিষৰ কোনো প্ৰভাৱ দেখা পোৱা নগ'ল, কিন্তু অসামঞ্জস্য, চকুপানী বা লেলাউতি ওলোৱা, উশাহ লওঁতে কষ্ট পোৱা আদি লক্ষণ দেখা যাব পাৰে। **প্ৰাথমিক চিকিৎসাঃ** প্ৰভাৱিত ব্যক্তিজনক প্ৰদূষিত স্থানৰ পৰা বায়ুভৰ্তি কোঠালৈ বা খোলা স্থানলৈ লৈ যাওক আৰু তাপমানৰ পৰা ৰক্ষা কৰক। **ছালত লাগিলেঃ** প্ৰদূষিত কাপোৰ খুলি পেলাওক আৰু শৰীৰৰ প্ৰভাৱিত অংশসমূহক চাবোন আৰু পানীৰে ভালদৰে ধুই পেলাওক। চকুত সোমালে পৰিস্কাৰ পানীৰে চকুকেইটা ভালদৰে কিছু সময় ধুই পেলাওক। **গিলি দিলেঃ** পানীত মেডিচিনেল চাৰক'ল ভালেখিনি পৰিমাণত লৈ বাৰে বাৰে দিব, আৰু ডাক্তৰক মাতি পঠাব। **সূচনাঃ** যদি ৰোগী অচেতন হৈ থাকে, তেন্তে মুখত একো নিদিব, বমি কৰোৱাৰৰ চেষ্টা নকৰিব।
ফাইট'টক্সিটিঃ সাধাৰণতে থকাৰ দৰে।
এন্টিড'টঃ কোনো নিৰ্দিষ্ট এন্টিড'ট জনা হোৱা নাই। লক্ষণ অনুসৰি পৰিচৰ্যা কৰক।
সংৰক্ষণৰ পৰিস্থিতিঃ 1. হাৰ্বিচাইড ৰখা পেকেজসমূহ পৃথক কোঠালি বা ঘৰত সংৰক্ষণ কৰিব, বিশেষকৈ অন্য সামগ্ৰী সংৰক্ষণ কৰা স্থানৰ পৰা আঁতৰত, আৰু আহাৰ আদি সামগ্ৰীখিনি হাৰ্বিচাইডৰ মাত্ৰা আৰু প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পৃথক আলমাৰিত তলা-চাবি মাৰি ৰাখিব লাগে। 2. হাৰ্বিচাইড ৰাখিবলগীয়া কোঠালি বা স্থানখিনি ভালদৰে নিৰ্মিত, শুকান, ভালদৰে পোহৰ আৰু বায়ু চলাচল কৰা তথা পৰ্যাপ্ত আয়তনৰ হোৱা উচিত যাতে বাষ্পীভূত হৈ দূষিত হৈ নপৰে।
ব্যৱহৃত পাত্ৰৰ নিষ্কাষণঃ 1. পাত্ৰটো ভাঙি পেলাই বসতিৰ পৰা আঁতৰত পুতি পেলাব। 2. ব্যৱহৃত বাচনখিনি/পেকেজ বাহিৰত নাৰাখিব, যাতে পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। 3. বাচন/পেকেজ বা অতিৰিক্ত সামগ্ৰীখিনি বা ধোৱাখিনি সুৰক্ষিত ভাৱে নিষ্কাষণ কৰিব লাগে যাতে পৰিবেশগত অথবা খোৱা পানীৰ প্ৰদূষণ ৰোধ কৰিব পৰা যায়।

ৰাসায়নিক সংৰচনাঃ

লেমডা-চায়হল'থ্ৰিন (a.i.)	9.5% ভ্ত/ভ্ত
থায়মেথ'ক্সাম (a.i.)	12.6% ভ্ত/ভ্ত
অক্টাডিক'নাইক এচিড, 12-হাইড্ৰক্সি-হ'ম'পলিমাৰ, অক্টাডিক'নাইক (পলিমাৰ)	0.8% ভ্ত/ভ্ত
ষ্টীৰীলফেন'ল পলিইথক্সিইষ্টাৰ ফছফেট	1.17% ভ্ত/ভ্ত
ছডিয়াম লিগন'ছালফ'নেট ইথক্সিলেটেড	1.17% ভ্ত/ভ্ত
এম'নিয়া	0.25% ভ্ত/ভ্ত
ছালফিউৰিক এচিড	0.54% ভ্ত/ভ্ত
লিগন'ছালফেট ছডিয়াম ছল্ট	1.04% ভ্ত/ভ্ত
পলিডাইমিথাইল ছিল'ক্সেন	0.10% ভ্ত/ভ্ত
ক'পলিমাৰ বুটানল	0.50% ভ্ত/ভ্ত
ডডিছিলবেঞ্জিনছালফ'নিক এচিড, ছডিয়াম ছল্ট	0.17% ভ্ত/ভ্ত
ডিএল- প্ৰপেনডিঅ'ল (1,2)	0.20% ভ্ত/ভ্ত
প্ৰপেন- 1,2,3-ট্ৰায়ল	5.84 ভ্ত/ভ্ত
হেটেৰোপলিচেকাৰাইড	0.20% ভ্ত/ভ্ত
1,2-বেঞ্জিছথিয়াজ'লিন-3-বান	0.28% ভ্ত/ভ্ত
টাইটেনিয়াম ডাই অক্সাইড	0.99% ভ্ত/ভ্ত
আইছ'ছায়নিক এচিড, মিথাইল-এম-ফেনিলিন ইষ্টাৰ	1.58% ভ্ত/ভ্ত
এৰ'মেটিক হাইড্ৰ'কাৰ্বনৰ মিশ্ৰণ (ছলভেন্ট C-9)	7.76% ভ্ত/ভ্ত
পানী	QS %
মুঠ	100.00% ভ্ত/ভ্ত

পুনৰ প্ৰৱেশৰ ম্যাদ : 48 ঘন্টা।
সতৰ্কতাঃ এই লেবেলত/লিফ্লেটত উল্লেখিত শস্য বাদ দি আন শস্যত ব্যৱহাৰ কৰা উচিত নহয়।

থিয়ামেথোক্সাম ১২.৬% + লম্বডা-সাইহ্যালোথ্রিন ৯.৫% জেডসি
(পাকস্থলী এবং স্পর্শজনিত কীটনাশক)

থিয়ামেথোক্স্যাম ১২.৬%+ লম্বডা-সাইহ্যালোথ্রিন ৯.৫% জেডসি হচ্ছে একটি সমন্বয়মূলক কীটনাশক যার মধ্যে দ্রুত পাকস্থলী এবং সংস্পর্শজনিত কার্যকলাপ দেখা যায় এবং কাপাস ফসলে আফিড, জাসিড, থ্রিপ্স এবং বলওয়ার্ম, মকা ফসলের অফিড, শূট ফ্লাই, স্টীম বোরার, চিনাবাদামের লীফ হোপার, লীফ খাওয়ার ক্যাটারপিলার, সোয়াবীনের স্টীম ফ্লাই, সেমীলূপার, গিরডিল বীটল, লঙ্কার থ্রিপ্স, ফ্রুট বোরার, চহা র থ্রিপ্স, সেমীলুপার, মস্কিটো বগ, টোম্যাটোর সফেদ মাখী, ফ্রুট বোরার এর নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

সুপারিশ :

ফসল	কীটের সাধারণ নাম	প্রতি হেক্টর প্রয়োগ মাত্রা এ.আই. (গ্রাম)	ফর্মুলেশন (মি.লী.)	জলে দ্রবণশীল (লিটার)	শেষ প্রয়োগের থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত অপেক্ষমান সময়কাল (দিনের সংখ্যা)
কার্পাস	আফিড, জাসিড থ্রিপ্স এবং বলওয়ার্ম	৪৪	২০০	৫০০	২৬
চা	থ্রিপ্স, সেমীলুপার টী মস্কিটো বগ	৩৩	১৫০	৫০০	১
টোমাটো	থ্রিপ্স, সফেদ মাখী ফ্রুট বোরার	২৭.৫	১২৫	৫০০	৫
মকা	অফিড, শূট ফ্লাই স্টীম বোরর	২৭.৫	১২৫	৫০০	৪২
লঙ্কা	থ্রিপ্স, ফ্রুট বোরর	৩৩	১৫০	৫০০	৩
চিনাবাদাম	লীফ হোপর, লীফ ক্যাটরপিলর	২৭.৫	১২৫	৫০০	২৮
সোয়াবীন	স্টীম ফ্লাই সেমীলুপার, গির্ডিল বীটল	২৭.৫	১২৫	৫০০	৪৮

ব্যবহারের নির্দেশাবলী : প্রোডাক্টটি আবশ্যক পরিমাণে মেপে নিন এবং অল্প পরিমাণ জলে সোটি বালোবাবে গুলি নিন। উপযুক্ত স্প্রেয়ারের মাধ্যমে সামগ্রিক ভাবে ফসলের ওপর স্প্রে করার জন্য যেমন বাবে বর্ণিত আছে সেরকম ভাবে বাড়তি পরিমাণ জলটি ভালো করে নাড়িয়ে মেশান।
ব্যবহারের সময় : যে সব জমিতে প্রয়োগ করা হয় তারে নিকটবর্তী এলাকাতে ফুল ধরা আগাছা, ঝোপ অথব ফুল ধরা ফসলে এই স্প্রেটি করবেন না। যে জমিতে প্রয়োগ করা হবে তার আশেপাশে যদি অধিক মাত্রায় অ্যাফিড হানিডিউ থেকে থাকে সেখানেও এই প্রোডাক্টির প্রয়োগ করবেন না। ফুল ধারণের ক্ষমতা সম্পন্ন গাছে ফুল কাটার ৫ দিন আগে এবং ফুল ফেঁটার ৫ দিন পরে এই প্রোডাক্টর স্প্রে করবেন না।
সতর্কতা : সল্যুশনটি বানানোর জন্য রান্নার বাসন ব্যবহার করবেন না। সল্যুশনটি নাড়ার জন্য কাঠই বা লাঠির ব্যবহার করবেন। ত্বকের সংস্পর্শে যাতে না আসে তার জন্য হাতে গ্লাভস পড়ে নেবেন। নাকের ভেতরে যেন না যায় এবং চোখের সংস্পর্শে যেন না আসে। সল্যুশনটি বানানোর সময় সুরক্ষিত জামাকাপড়, মাস্ক, কালো চশমা, বুট পরিধান করুন। মুখ দিয়ে নজেল ফুঁ দেবেন না। প্রোডাক্ট নাড়াচাড়া অথবা প্রয়োগ করার সময় খাদ্য গ্রহণ, জল গ্রহণ অথবা ধুম্রপান করবেন না। প্রোডাক্টির অব্যবহৃত সল্যুশন মজুদ করে রাখবেন না। ব্যবহার করার পরে প্রতিদিন স্প্রেয়ার, বালতি এবং অন্যান্য বাসন ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। সাবান এবং প্রচুর পরিমাণ জল দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলুন এবং কাজ শেষ হয়ে যাবার পরে দুষিত জামাকাপড় ছেড়ে ফেলুন। দুষিত জামা কাপডজ ভালো করে ধুয়ে ফেলুন।
নদি, হাদ, পুকুর, খাল অথবা অন্যান্য জলপথে যেন স্প্রে না করা হয়। প্রয়োগ করার পরে স্প্রের অবশিষ্টাংশ অথবা খালি কন্টেইনার জলে ফেলে কখনই জলকে দুষিত করবেন না। ফসলে কুল ধারণ করার সময় এই স্প্রে করবেন না। মৌমাছিরা যখন খাদ্য সংগ্রহ করতে থাকে তখন এই প্রোডাক্টর ব্যবহার করবেন না।
বিষ ক্রিয়ার লক্ষণ : ইঁদুরের ওপর বিষক্রিয়ার লক্ষণ অ-নির্দিষ্ট, অসমক্রিয়া, মুখের লালাস্রাব, চোখ দিয়ে জল পড়া এবং শ্বাস কষ্ট ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দিতে পারে।
প্রাথমিক চিকিৎসা : বিপদজনক স্থান থেকে রোগিকে হাওয়া বহুল ঘরে অথবা খোলামেল জায়গায় সরিয়ে আনুন এবং মজুত রাখুন যাতে রোগির শরীর ঠান্ডা না হয়ে যায়। যদি মনে হয়ে বিষক্রিয়া হয়ছে। অবিলম্বে চিকিৎসককে ডাকুন। ত্বকের সংস্পর্শে এলে দুষিত জামাকাপড় ছেড়ে ফেলুন এবং যথেষ্ঠ পরিমাণ সাবান এবং জল দিয়ে দুষইত ত্বক ধুয়ে ফেলুন। চোখের সংস্পর্শে এসে, পরিস্কার জল দিয়ে কয়েক মিনিট ধরে ভালো করে ধীরে ধীরে চোখ ধুয়ে ফেলুন। পাকস্থলীর স্পর্শ এলে প্রচুর পরিমাণ জলে মোডিসিনাল চারকোল ভিজিয়ে তার জল অল্প অংশ করে বার বার করে খাওয়াতে থাকুন। নোট : জ্ঞান হারানো ব্যাক্তিকে গলার ভেতরে আগুল ঢুকিয়ে বমি করানোর অথবা মুখ দিয়ে কিছু খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন না।
প্রতিরোধক : কোনো নির্দিষ্ট ঔষুধ নেই, লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন।

ব্যবহৃত কন্টেইনার গুলি বিনষ্ট করার জন্য নির্দেশাবলী :
১. প্যাকেজ অথবা অতিরিক্ত বস্তু সামগ্রী এবং মেশিন বা পাত্র ধোয়ার জল সুরক্ষিত উপায়ে বিনাশ করুন যাতে বাতাবরণ এবং জল দুষিত না হয়।
২. ব্যাবহৃত কন্টেইনারের পুনঃ ব্যাবহার রোধ করতে বাইরে ফেলে রাখবেন না।
৩. খালি পাত্রগুলি ভেঙে ফেলুন এবং জনবসতির থেকে দুরে মাটির নিচে পুতে ফেলুন।

মজুতকরণ :
১. যে প্যাকেজটিতে কীটনাশক পদার্থটি থাকে তা অরিজিনাল প্যাকেট যেন থাকে, অন্যান্য বস্তু বিশেষ করে খাবার জিনিষ যে ঘরে মজুত থাকে সেই ঘর অথবা স্থান থেকে দুরে আলাদা ঘরে অথবা স্থানে রাখতে হবে অথবা আলাদা ঘরে আলমারীতে তালা চাবি দিয়ে রাখতে হবে।
২. কীটনাশক পদার্থটির মজুত করার ঘর অথবা স্থান যেন আলোকিত, মজবুত, শুকনো, হাওয়ারহল এবং যথেষ্ট বড় হয় যাতে ঘরের আদ্রতা কখনও দুষিত না হতে পারে।

রাসায়নিক মিশ্রণ :

থিয়ামেথোক্যাম (এ.আই.)	১২.৬% ডব্লু/ডব্লু
লম্বডা-সাইহ্যালোথ্রিন (এ.আই.)	৯.৫% ডব্লু/ডব্লু
অক্টোডেকানয়েক এয়াসিড ১২-হায় ওড্রক্সি-হোমোপলিমার, অক্টাডেকানয়েট	০.৮০% ডব্লু/ডব্লু
স্টাইবিলফেনল পরিথক্সিয়েস্টার ফসফেট	১.১৭% ডব্লু/ডব্লু
সোডিয়াম লিগনোসালপেট এথাক্সিলেটেড	১.১৭% ডব্লু/ডব্লু
এমোনিয়া	০.২৫% ডব্লু/ডব্লু
সালফিউরিক এসিড	০.৫৪% ডব্লু/ডব্লু
লিগনোসালফেট সোডিয়াম সল্ট	১.০৪% ডব্লু/ডব্লু
পলিডাইমেথিলসিলক্সেন	০.১০% ডব্লু/ডব্লু
কোপোলিমার বুটানল	০.৫০% ডব্লু/ডব্লু
ডডিসিল বেঞ্জিন সালফনিক এসিড, সোডিয়াম সল্ট	০.১৭% ডব্লু/ডব্লু
ডডিসিল বেঞ্জিন সালফনিক এসিড, সোডিয়াম সল্ট	০.২০% ডব্লু/ডব্লু
ডিএল-প্রপানেডিয়ল (১,২)	৫.৮৪% ডব্লু/ডব্লু
প্রপেন-১,২ এবং ৩ ট্রিয়ল	০.২০% ডব্লু/ডব্লু
হেটেরোপলিস্যাকার্বাইড	০.২৮% ডব্লু/ডব্লু
১,২-বেঞ্জিসোথিয়াজোলিন-৩-ওয়ান	০.৯৯% ডব্লু/ডব্লু
টিটানিয়াম ডাইঅক্সাইড	১.৫৮% ডব্লু/ডব্লু
আইসোসনিক এসিড, মেথিল-এম-ফেনিলিন এস্টার	৭.৭৬% ডব্লু/ডব্লু
জল	কিউ এস.
মোট	১০০.০% ডব্লু/ডব্লু

পুনরায় প্রবেশের সময়কাল: 48 ঘন্টা।
সতর্কতা: এই লেবেল/পুস্তিকায় নির্দেশিত ফসল ছাড়া অন্য ফসলে ব্যবহার করবেন না।

थायामेथोक्साम १२.६% + लेमडा-सायहलोथ्रिन ६.५% जेड.सी.
अंर्तप्रावाही एंव स्पर्शीय कीटनाशक

थायामेथोक्साम १२.६% + लेमडा–सायहलोथ्रिन ६.५% जेड.सी. एक बहुपयोगी कीटनाशक मिश्रण है जो तीव्र उदरीय तथा संस्पर्शी क्रियाशीलता रखता है तथा इसकी सिफारिस कपास की फसल पर लगने वाले माहो, तेला, चुरदा टिडडें की सुंडिया, मक्का में महो, तेला, चुरदा, टिंडे की सुंडियां, मूंगफली में पत्ती का टिड्डा, पता खाने वाली सुंडी, सोयाबीन में स्टेम फ्लाई, अर्द्कुंडलक, मिर्च में चुरदा, फल छेदक झिल्ली, चाय में चुरदा, अर्द्कुंडलक, चाय का मच्छर कीट, टमाटर में चुरदा, फल छेदक झिल्ली, सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए की जाती है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व (ग्राम)	संरचना (मि.ली.)	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)
कपास	माहो तेला, चुर्दा टिड़डें की सुंडिया	४४	२००	५००	२६
चाय	चुरदा, अर्द्कुंडलक, चाय का मच्छर कीट	३३	१५०	५००	१
टमाटर	चुरदा, फल छेदक झिल्ली, सफेद मक्खी	२७.५	१२५	५००	५
मक्का	माहो तेला, चुर्दा टिडें की सुंडिया	२७.५	१२५	५००	४२
मिर्च	चुरदा, फल छेदक झिल्ली	३३	१५०	५००	३
मूंगफली	पत्ती का टिड़डा, पता खाने वाली सुंडी,	२७.५	१२५	५००	२८
सोयाबीन	स्टेम फ्लाई अर्द्कुंडलक	२७.५	१२५	५००	४८

उपयोग के लिए निर्देश : उत्पाद की आवश्यक मात्रा मापें और थोडे से पानी में इसे अच्छे से मिलाएँ। निर्देशानुसार हिलाते हुये पानी की शेष निर्दिष्ट मात्रा डालें और नैपसैक स्प्रेयर्स या हाइ वोल्यूम स्प्रेयर्स से छिड़काव करें।
प्रयोग का समय : फसल पर फूल आने की अवस्था पर स्प्रे नही करें। उपचारित क्षेत्र के नजदीकी फूलवाली फसलें, खरपतवार (फूल की अवस्था) एंव झाडियों को हवा द्वारा फैलने वाले छिड़काव के अवशेष से प्रभावित नही होने दें। माहु द्वारा विकसीत अत्यधिक शहद वाले फसल क्षेत्र को उपचारित नही करें। फूल वाली फसलों मे फूल आने के ५ दिन पहले से फूल बनने की अवस्था पूरी होने तक स्प्रे नहीं करें। मधुमक्खियों के सक्रिय समय पर स्प्रे नही करें तथा मछलीयों के लिए विषाक्त है।
प्रयोगकर्ताओ के लिए सावधानिया : स्प्रे तैयार करने के लिए खाना पकाने के बर्तनों का इस्तेमाल मत कीजिए। स्प्रे के घोल को हिलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करे। त्वचा, आँख और मुँह को कीटनाशक के संपर्क से बचाये तथा श्वास द्वारा अंदर जाने से रोके। सुरक्षात्मक कपडे जैसे कि ऐप्रान, दस्ताने, नकाब और गम बूट आदि पहन कर ही इसका प्रयोग करें। कीटनाशक का प्रयोग करते समय खाना, पीना और धुम्रपान करना नही चाहिए। प्रति दिन प्रयोग के बाद कीटनाशी से प्रभावित हिस्सों को अच्छी तरह धो ले और कपडा बदल लें। दूषित कपडों को अच्छी तरह धो ले। हवा द्वारा फैलने वाले छिड़काव के अवशेष को नदियों, जलाशय, तालाब एंव अन्य जलसंग्रहण क्षेत्र से प्रभावित नही होने दें। शेष बचे पदार्थ के निस्तारण एंव खाली कास्तरों द्वारा जलाशय को दूषित होने से बचांए।
विष के लक्षण : चूहों पर विष का कोई निश्चित लक्षण दिखाई नही दिया, लेकिन असंतुलन, लार टपकना, आसूँ आना तथा साँस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण दिख सकते है। **प्राथमिक चिकित्सा :** प्रभावित व्यक्ति को प्रदूषित जगह से हवादार कमरे या खुली हवा में ले जाए और तापमान से बचाए। **त्वचा में लगने परः** प्रदुषित कपड़ो को उतार दे तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबून और पानी से अच्छी तरह धोएं। आँखों में चले जाने परः आँखों को कुछ देर तक साफ पानी से अच्छी तरह छपछपाइए। **निगल जाने परः** पानी में मेडिसिनल चारकोल की काफी मात्रा घोलकर बार बार दें और डाक्टर को बुलाइयें। सुचनाः यदि मरीज बेहोश हो तो मुँह से कुछ न दें। उल्टी कराने की कोशिश न करे।
पौधविशाक्तता : सामान्य में
विष नाशक : कोई खास विष प्रतिहार नही हैं, लक्षण के अनुसार चिकित्सा करें।
खाली डिब्बों का निपटारा : १. पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए खाली डिब्बें, बचा हुआ घोल, मशीनों की धोवन, और डिब्बों का निपटारा सुरक्षित स्थान पर करें। २. खाली डिब्बों का पुनः प्रयोग रोकने के लिए उन्हे बाहर न छोडें। ३. डिब्बों को तोड–मोडकर आबादी से दूर जमीन में गाढ देना चाहिए।
संग्रहण की शर्ते : १. कीटनाशक के डिब्बो को अन्य सामग्री विशेषकर खाद्य पदार्थो के संग्रहण कक्ष या स्थान से दूर किया जाना चाहिए, अथवा कीटनाशक की मात्रा तथा स्वभात पर निर्भर करते हुए, डिब्बों को अलग अलमारी मे ताला–चाबी लगा कर रखें। २. कीटनाशक का संग्रहण कक्ष या स्थान रोशनीदार, मजबूत बनावट का हवादार तथा पर्याप्त लम्बाई चौडाई का होना चाहियें, जिससे वाष्प द्वारा प्रदूषण न हो।

रासयनिक संरचना :

लेमडा–सायहलोथ्रिन (स.त.)	६.५% भार/भार
थायामेथोक्साम (स.त.)	१२.६% भार/भार
ओक्टडि–कॅनाईक असिड, १२–हाड्रक्सी होमोपॉलिमर, ओक्टडि कॅनोईट (पॉलिमर)	०.८% भार/भार
स्टरीलफीनॉल पॉलिईथॉक्सिईस्टर फॉस्फेट	१.१७% भार/भार
सोडियम लिगनोसलफोनेट ईथाक्सिलेटेड	१.१७% भार/भार
अमोनिया	०.२५% भार/भार
सलफ्युरीक असिड	०.५४% भार/भार
लिगनोसलफोनेट सोडियम सॉल्ट	१.०४% भार/भार
पॉलीडायमिथाईल सिलोक्सेन	०.१०% भार/भार
कोपॉलिसर ब्यट नॉल	०.५०% भार/भार
डोडिसिल बेनझिनसलफोनिक असिड, सोडियम सॉल्ट	०.१७% भार/भार
डिएल–प्रोपॅनेडिऑल–(१,२)	०.२०% भार/भार
प्रोपन–१,२,३–ट्राओल	५.८४% भार/भार
हेटेरोपॉलिसॅकराईड	०.२०% भार/भार
१,२–बेनझिसोथियाझोलिन–३–वन	०.२८% भार/भार
टिटानियम डायऑक्साईड	०.६६% भार/भार
आयसोसायनिक असिड, मिथाईल–एम–फिनिलीनईस्टर	१.५८% भार/भार
अरोमॅटिक हायड्रोकार्बन का मिश्रण (सौलवेन्ट सी–६)	७.७६% भार/भार
पानी	पर्याप्त मात्रा % भार/भार
योग	१००.०००% भार/भार

पुनः प्रवेश अवधिः ४८ घंटे।
चेतावनी : इस लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग मना है।

Thiamethoxam 12.6% + Lambda-Cyhalothrin 9.5% ZC
Systemic and Contact Insecticide

Thiamethoxam 12.6% + Lambda-cyhalothrin 9.5 ZC is a combination insecticide having quick stomach and contact activity and is recommended to control Aphids, jassids, Thrips & Bollworms in Cotton, Aphid, shootfly, steam borer in Maize, Leaf hopper, leaf eating caterpillars in Groundnut, Stem fly, semilooper, girdle beetle in Soyaben, Thrips & fruit borer In Chilli, Thrips, Semilooper, Tea mosquito bug in Tea, Thrips, whiteflies, Fruit borer in Tomato crop.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA AI (g)	Formulation (ml)	Dilution in Water (l)	Waiting Period between last spray to harvest (days)
Cotton	*Aphids, Jassids, Thrips & Bollworms*	44	200	500	26
Tea	*Thrips, Semilooper, Tea Mosquito Bug*	33	150	500	1
Tomato	*Thrips, Whiteflies, Fruit Borer*	27.5	125	500	5
Maize	*Aphid, Shootfly, Steam Borer*	27.5	125	500	42
Chilli	*Thrips & Fruit Borer*	33	150	500	3
Groundnut	*Leaf hopper, Leaf Eating Caterpillars*	27.5	125	500	28
Soyaben	*Stem fly, Semilooper, Girdle Beetle*	27.5	125	500	48

Direction of Use: Measure out required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water, Add the remaining quantity of water as specifiedthrough agitation for total coverage of crop with suitable sprayers.
Time of Application : The product should not be applied during flowering of the crop. Do not use the product where bees are actively foraging. Do not allow spray drift to flowering weeds, hedges or flowering crops in the vicinity of the treatment area. Do not spray if a high amount of aphid honeydew is present in the treatment area. Do not spray on flowering crops between 5 days before start of flowering and end of flowering. Not to be used on crops when honey bees are pollinators/foraging. This product is also toxic to fish
Precaution : Do not use cooking utensils for preparing sprays. Use stick for stirring the spray solution, Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Also avoid inhalation and contact with eyes. Wear protective clothing, mask, goggles, boots, while spraying and do not expose yourself to spray drift. Do not blow nozzles with mouth, Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product. Do not store unused spray solution. Clean sprayers, buckets and other utensils with water daily after use. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Also wash the contaminated clothes.
DO NOT allow spray to drift onto rivers, lakes, ponds, ditches or other waterways. Do not allow discharging left over spray material or empty containers to contaminate waterways.
Symptoms Of Poisoning: Poisoning symptoms in rodents are non-specific, may cause symptoms of ataxia, salivation, lachrymation and decreased breathing etc.
First Aid : Remove the affected person from the danger zone to a well-ventillated room or to fresh air and protect from under cooling. **In case of Suspected poisoning :** Immediately call a physician. **In case of skin contact :** remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. **In case of eye contact :** Rinse eyes with clean water for several minutes and immediately call a physician. **In case of ingestion ;** Repeatedly administer medicinal charcoal in a large quantity of water. Note Never give anything by mouth to an unconscious person. Do not induce vomiting.
Phytotoxicity : As in common
Antidote : No Specific antidote in known. Apply symptomatic therapy.
Disposal Of Used Container :
1. Packages or surplus materials and washings from the machines and containers should be disposed off in a safe manner as to prevent environmental pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their reuse. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.
Storage Conditions : 1. The packages containing the insecticides should be stored in original containers in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for staring other articles, particularly, articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key. 2. the rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour.

Chemicals Composition :

Lambda-cyhalothrin (a.i.)	9.5. % w/w
Thiamethoxam (a.i.)	12.6 % w/w
Octadecanoic acid, 12-hydroxy-homopolymer, octadecanoate (polymer)	0.8 % w/w
Styrylphenol polyethoxyester phosphate	1.17% w/w
Sodium lignosulfonate ethoxylated	1.17% w/w
Ammonia	0.25% w/w
Sulfuric acid	0.54% w/w
Lignosulfonate sodium salts	1.04% w/w
Polydimethyl siloxane	0.10% w/w
copolymer butanol	0.50 % w/w
Dodycylbenzenesulfonic acid. sodium salt	0.17% w/w
DL-propanediol-(1,2)	0.20% w/w
Propane- 1,2,3-triol	5.84% w/w
Heferopalysaccharide	0.20% w/w
1,2-benzisothiazolin-3-one	0.28% w/w
Titanium dioxide	0.99% w/w
Isocynic acid, methyl-m-phenylene ester	1.58% w/w
Mixture of aromatic hydrocarbons (Solvent C-9)	7.76% w/w
Water	QS% w/w
Total	100.000% w/w

Re-entry Period : 48 hrs.
Caution : Not to be used on Crops other than specified on this Label/Leaflet.

Read Instruction Leaflet before use.
उपयोग से पहले निर्देश पत्रिका पढ़ें।
For Agricultural use only.
केवल कृषि उपयोग के लिए।
Store in a cool, dry and well ventilated place.
ठंडी, सूखी और अच्छी तरह हवादार जगह में संग्रह करें।

Thiamethoxam 12.6% + Lambda-Cyhalothrin 9.5% ZC
KRISHIELD
Systemic and Contact Insecticide

थायामेथोक्साम १२.६% + लेमडा-सायहलोथ्रिन ६.५% जेड.सी.
क्राईशिल्ड
अंर्तप्रावाही एंव स्पर्शीय कीटनाशक

Regn. No. : CIR-142973/2017-Thiamethoxam + Lambda-Cyhalothrin (ZC) (377)-977

KRISHI RASAYAN GROUP
SINCE 1966 IN AGROCHEMICALS

Manufactured & Marketed By :
KR Lifesciences Pvt. Ltd.
29, LALA LAJPAT RAI SARANI,
KOLKATA-700 020
E-mail : kr@krishirasayan.com

निर्माता एवं विपणनकर्ता :
केआर लाईफसांईसेस प्रा. लि.
29, लाला लाजपत राय सारनी,
कोलकाता–700 020

For Manufacturing unit address see first three characters of Batch No. and see below :

KRR
Maitapur, P.O. Ranital, Balasore, Orissa-756111
Mfg. Lic. No. : e-Lic/INSECTI/MAN-PP-2

KRK
Joykrishnapur, P.O. Bonhoogly II, Sonarpur, South 24 Parganas, West Bengal-700 103
Mfg. Lic. No. : MPP/ILC/145/K-2

Customer Care Detail :
KR Lifesciences Pvt. Ltd.
29, Lala Lajpat Rai Sarani, Kolkata-700 020
Toll Free No. : 18001211800
E-mail : customercare@krishirasayan.com