കാർടാപ്പ് ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് 50% എസ്പി

ക്രിടാപ്പ് ® 50 എസ്പി

(കീടനാശിനി)

ക്രിടാപ്പ് 50 എസ്പി നെൽവിളയിൽ കണ്ടുവരുന്ന തണ്ടുതുളപ്പാൻ, ഇലമടക്കി കൂടാതെ പുഴയ്ക്കൂൻ നശിപ്പിക്കുന്ന പുഴു എന്നിവകളെ ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നു. കീടങ്ങളെ നേരിടുന്ന നൈനർഗ്ഗികങ്ങളായ കീടങ്ങളെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല, സ്ലന്യജീവികൾക്ക് പ്രയോഗികമായി വിഷമേൽപ്പിക്കാത്തതുമാകുന്നു.

രാസായനിക മിശ്രണം :

കാർടാപ്പ് ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് ടെക്നിക്കൽ (കുറഞ്ഞ ശുദ്ധി 98%)	51.20% m/m
സർഫാക്റ്റന്റ് ആൽക്കൈൽ ഫെനോൾ എത്തിലിൻ ഓക്സൈഡ്	0.70% m/m
ഫോസ്ഫോറിക്- ആസിഡ് സ്റ്റാബിലൈസർ ആസിഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ്	0.30 % m/m
ആസിഡ് ഗ്രീൻ ഡൈ	0.05% m/m
ഡ്യൂമന്റ്നേലേ-സോക്ക്	47.75% m/m
മൊത്തം	100.00% m/m

ശുപാർശകൾ :

വിളവ്	രോഗത്തിന്റെ സാധാരണ പേര്	ഓരോ ഹെക്ടറിനുമുള്ള അളവ്			അവസാനത്തെ സ്പ്രേ മുതൽ വിളവെടുപ്പു വരെയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് സമയം
		എ.ഐ. (ഗ്രാം /%)	ഫോർമുലേഷൻ (മി.ലി.)	വെള്ളത്തിൽ കലർത്തേണ്ട (ലിറ്റർസ്)	
നെൽ	തണ്ടുതുളപ്പാൻ	500	1000	500-1000	—
	ഇലമടക്കി	500	1000	500-1000	—

സസ്യ സംരക്ഷണ സാമഗ്രി :

അധിക അളവ് കൊള്ളുന്ന നാപ്സാക്ക് സ്പ്രെയർ, റോക്കിംഗ് സ്പ്രെയർ, സ്ലിൻഷപ് സ്പ്രെയർ, ഹൂട്ട് സ്പ്രെയർ, കംപ്രെഷൻ നാപ്സാക് സ്പ്രെയർ, എച്ചസ്പിഇഇൻ എവ്ട്ടിപി പവർ സ്പ്രെയർ എന്നീ കൈകൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന സ്പ്രെയറുകൾ.

മുന്നറിയിപ്പുകൾ :

1. മിശ്രണമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ചിതറലുകൾ, തെറിക്കലുകളുകൾ കാരണം ശ്വസിക്കുന്നതോ, ചർമ്മത്തിൽ പുണ്ടുന്നതോ തടയുക. വെറും കൈകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കലർത്തരുത്.
2. ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സമ്പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അതായത് റബ്ബർ കൈയ്യുറകൾ, മുഖംമൂടി പോലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളോ, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം മുഴുവൻ മൂടുന്ന വിധത്തിലുള്ളവയോ ധരിച്ചിരിക്കണം.
3. അധിക ശക്തിയുള്ള മിശ്രണം കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപകടകരമാണ്, അതിനാൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.

വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ :

ഛർദ്ദി, വയറിളക്കം, ഹൈപ്പോതെർമിയാ ക്ഷീണം, പ്ലഷിംഗ്, അലവേദന, വിയർപ്പ്.

പ്രഥമ ചികിത്സാ നടപടികൾ :

1. വിഷം അകത്ത് കടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, രോഗി അബോധാവസ്ഥയിലല്ലെങ്കിൽ ഛർദ്ദിപ്പിക്കുക. ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി രോഗിയെ കുടിപ്പിക്കുകയും തൊണ്ടയിൽ വിരൽ കടത്തി ഛർദ്ദിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.
2. കണ്ണിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ : 10 മുതൽ 15 മിനിറ്റു നേരം ഉപ്പുവെള്ളമോ/ശുദ്ധജലമോ ഉപയോഗിച്ച് പുറത്ത് കളയുക.

മറു മരുന്ന് :

സൾഫിഡിൽ എളുന്ന്കുകൾ മറുമരുന്നാണ്. എൻ ക്രിസ്റ്റൈനിന്റെയോ ബിഎഎൂൽനിറെ 20-60 എംജി ഇൻട്രാമസ്സുലർ ഇഞ്ചക്ഷൻ (ഡൈമെർകാപ്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ 2, 3-ഡൈമെർകാപ്രോ പ്രൊപൊനോൾ) ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

ഒഴിഞ്ഞ ടിന്നുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് :

1. ഉപയോഗിച്ച പാക്കേജുകളോ, ബാക്കി വന്നിരിക്കുന്ന സാമഗ്രികളോ, കീടനാശിനി കലർന്ന കഴുകിയ വെള്ളമോ പരിസരമലിനീകരണവും ജലമലിനീകരണവും സംഭവിക്കാത്ത വിധത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി കളയേണ്ടതാണ്.
2. ഒഴിഞ്ഞ ടിന്നുകൾ വിണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടയുവാനായി അവ പുറത്ത് ഇടരുത്.
3. പാക്കേജുകൾ പൊട്ടിച്ച് ജനവാസമില്ലാത്ത ഇടത്ത് കുഴിച്ചുമൂടുക.

ശേഖരച്ചു വെയ്ക്കേണ്ടുന്ന വിധം :

1. കീടനാശിനികളടങ്ങിയ പാക്കേജുകൾപ്രത്യേകം മുറികളിലോ കെട്ടിടങ്ങളിലൊ, മറ്റു സാമഗ്രികൾ സൂക്ഷിക്കുവാനുപയോഗിക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ചും ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന മുറികളിൽനിന്നും വേറിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കീടനിശിനിയുടെ അളവും സ്വഭാവവും അനുസരിച്ച് പ്രത്യേകം അലമാരികളിൽ വച്ച് താഴിട്ട് പൂട്ടി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
2. ബാഷ്പവുമാകി കലർന്ന് വായുവിൽ വിഷാംശം കലരുന്നതൊഴിവാക്കാൻ കീടനാശിനി സൂക്ഷിക്കുവാനുപയോഗിക്കുന്ന മുറികളോ കെട്ടിടങ്ങളൊ പ്രകാശമുള്ളതും, സുനിർമ്മിതവും, വരണ്ട്, കുലുങ്ങിമയോടുകൂടി, ആവശ്യമുള്ള ജാലകങ്ങളോടുകൂടിയതായിരിക്കണം.

തിരികെ പ്രവേശിക്കേണ്ട സമയം : 48 മണിക്കൂർ

ശ്രദ്ധിക്കുക : ഈ ലീഫ് ലെറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിളകളിൻ മേൽ അല്ലാതെ മറ്റു വിളകളിൽ ഇത് ഒരു കാരണവശാലും ഉപയോഗിക്കരുത്

Malayalam

ಕಾಟ್ಯಾಪ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ 50% ಎಸ್‌ಪಿ

ಕ್ರಿಟ್ಯಾಪ್® 50ಎಸ್‌ಪಿ

(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಕ್ರಿಟ್ಯಾಪ್ 50% ಎಸ್‌ಪಿ, ಇದು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ತಗಲುವ ಬುಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು, ಎಲೆ ಸುರುಳಿ ಹುಳುಗಳನ್ನು ತಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಾಲದ ವರೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿರಪಾಯ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯನ್ನೂ ತರುವುದಿಲ್ಲ.ಅಲ್ಲದೆ ಮೊಲೆಯೂಡುವ (ಸಸ್ತನಿ) ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಕಾರ್ಟ್ಯಾಪ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ (ಕನಿಷ್ಠ ಶುದ್ಧತೆ 98%)	51.20% ಎಮ/ಎಮ
ಸರ್ಫಾಕ್ಟಾಂಟ್–ಆಲ್ಕೈಲ್ ಫೆನಾಯಲ್ ಎಥಿಲೀನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್	0.70% ಎಮ/ಎಮ
ಸ್ಟ್ಯಾಬಿಲೈಸರ್–ಫೊಸ್ಫೊರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್	0.30% ಎಮ/ಎಮ
ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಡೈ	0.05% ಎಮ/ಎಮ
ಲೂಯೆಟ್–ಲ್ಯಾಸೆಕೋಸ್	47.75% ಎಮ/ಎಮ
ಮೊತ್ತ :	100.00% ಎಮ/ಎಮ

ಶಿಫಾರಸುಗಳು :

ಬೆಳೆ	ರೋಗದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಪರಿಮಾಣ			ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆ ಹಾಗೂ ಕೊಯ್ಲಿನ ನಡುವಿನ ಅಂತರ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
		ಎ.ಐ. (ಜಿ /%)	ಸಂಯೋಜನೆ (ಎಮ್ ಎಲ್)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸುವಿಕೆ (ಲೀಟರ್)	
ಭತ್ತ	ಕಾಂಡ ಕೊರೆಕ	500	1000	500–1000	—
	ಎಲೆ ಸುರುಳಿ	500	1000	500–1000	—

ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಪರಿಕರ :

ಉಷ್ಣತೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೈಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಸ್ಲಿಪ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಫ್ಲೂಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚಸ್ಪಿ–ಹೆಚ್‌ಟಿಪಿ ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು :

1. ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಸುರಿಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಎರಚುವಾಗ ಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸೇರದಂತೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ಬರಿಯ (ನಗ್ನ) ಕೈಗಳಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ.
2. ಬಳಸುವಾಗ ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಾ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಖ ಹಾಗೂ ಶರೀರವನ್ನು ಮಾಸ್ಕ್‌ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ಆಪ್ರಾನ್ ಹುಡ್ ಅಥವಾ ಟೋಪಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿರಬೇಕು.
3. ಹೆಚ್ಚು ಗಾಢವಾದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಮಾಣದ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಬಳಕೆಯು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದುದು, ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.

ವಿಷ ತಗುಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು :

ವಾಂತಿಯಾಗುವಿಕೆ, ಅತಿಸಾರ, ಹೈಪೋಥರ್ಮಿಯಾ ನಿಶ್ಶಕ್ತಿ , ಉದ್ರೇಕ, ತಲೆನೋವು, ಬೆವರುವಿಕೆ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ :

1. ಒಂದುಪಕ್ಷ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರೆ, ರೋಗಿಗೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಿ, ರೋಗಿಯು ಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ . ರೋಗಿಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಸಿ, ರೋಗಿಯ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿಟ್ಟು ವಾಂತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೆಪಿಸಿ.
2. ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಗುಲಿದ್ದಲ್ಲಿ : 10–15 ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೆಲೈನ್/ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಎರೆಚಿ (ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿ).

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ :

ಸಲ್ಫಿಡ್ರಿಲ್ ಬಿಎಚ್‌ಟಿ ಇದರ ವಿಷಪೂರಾರಕ. ಇಂಟ್ರಾವೆನಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್‌ನ ಎಲ್–ಕ್ರಿಸ್ಟೈನ್ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರಾಮಸ್ಕುಲರ್ ಇಂಜೆಕಶನ ೨೦–೬೦ ಮಿಗ್ರಾ ಬಿಎಎಲ (ಡೈಮರ್‌ಕಾಪ್ರೊಲ್ ಅಥವಾ 2, 3–ಡೈಮರ್‌ಕ್ಯಾಪ್ಟೋ ಪ್ರೊಪನೋಲ್) ಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವಿಕೆ :

1. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅಳಿದುಳಿದ ಶೇಷ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳನ್ನು ಜನವಸತಿ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗದಂತೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು.
2. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.
3. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಜನವಸತಿಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು.

ಸಂಗ್ರಹಣೆ :

1. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನಿಡುವ ಅಥವಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನಿಡುವ ಕೋಣೆಯಿಂದ ದೂರ ಹೊರ ಆವರಣದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ, ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಗವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡಬೇಕು.
2. ಕೀಟನಾಶಕವು ಹೊರಗಿನ ಭಾಷ್ಪಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸದಿರಲು ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನಿಡುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಆವರಣವು ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಒಣಗಿದ್ದು, ತಂಪಾಗಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮರು-ಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿ: 48 ಗಂಟೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಸಸ್ಯನಾಶಕವನ್ನು ಲೇಬಲ್ / ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

Kannada

কারটাপ হাইড্রোক্লোরাইড ৫০% এস পি

ক্রিটাপ® ৫০ এস পি

(কীটনাশক)

ক্রিটাপ ৫০ এস পি একটি কীটনাশক যা ধানের মাজরা ও পাতামোড়া পোকার জীবন চক্রের সমস্ত অবস্থাকেই অত্যন্ত কার্যকরী ভাবে দমন করে এবং এর কার্যকারীতা দীর্ঘদিন বজায় থাকে। ক্ষতিকারক পোকার প্রাকৃতিক শত্রুর উপর এর কোন কুপ্রভাব নেই এবং স্তন্যপায়ী জন্তুর জন্য কার্যত বিষক্রিয়াহীন ।

রাসায়নিক উপাদান :

কারটাপ হাইড্রোক্লোরাইড, মূল উপাদান (কমপক্ষে ৯৮% বিশুদ্ধতা)	৫১.২০% এম/এম
সারফেকটান্ট – আলকাইল ফিনল ইথিলিন অক্সাইড	০.৭০% এম/এম
স্টেবিলাইজার – আইসোপ্রোপাইল এ্যাসিড ফসফেট	০.৩০% এম/এম
এ্যাসিড গ্রীন ডাই	০.০৫% এম/এম
ডুলুমেন্ট – লেসটক্সি	৪৭.৭৫% এম/এম
মোট :	১০০.০০% এম/এম

অনুমোদন :

ফসল	পোকার চলতি নাম	প্রতি হেক্টরে মাত্রার পরিমাণ			শেষ ঔষুধ এবং ফসল তোলার মধ্যে ন্যূনতম ব্যবধান
		মূল উপাদান (গ্রা / %)	তৈরী ঔষুধ (মি.লি.)	জলে দ্রবণ (লিটার)	
ধান	মাজরা পোকা	৫০০	১০০০	৫০০–১০০০	—
	পাতা মোড়া	৫০০	১০০০	৫০০–১০০০	—

শস্য সংরক্ষন যন্ত্রপাতি :

উচ্চচাপযুক্ত হস্তচালিত স্প্রেয়ার যেমন নেপস্যাক স্প্রেয়ার, রকিং স্প্রেয়ার, স্লিপআপ স্প্রেয়ার, পদচালিত স্প্রেয়ার, কমপ্রেশন ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার এবং আসপি–এইচ টি পি পাওয়ার স্প্রেয়ার ।

সতর্কতা :

১। জলে মেশানোর সময় চুইয়ে আসা বা ছিটকে আসা ওষুধ নিশ্বাসে নেওয়া বা চামড়ার স্পর্শে যাতে না আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। খালি হাতে ওষুধ মেশানো বারণ।

২। ব্যবহারকারী তার সর্বাঙ্গ সুরক্ষার জন্য রবারের দস্তানা, মুখে ঢাকা দেওয়া মুখোশ ও গা ঢাকা দেওয়া কাপড় অথবা রবারের মাথা ঢাকা দেওয়া এপ্রন বা টুপি ব্যবহার করবেন।

৩। বেশী ঘনত্বের ওষুধ প্রয়োগে নিম্নচাপযুক্ত বা অতি নিম্নচাপযুক্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার বিপজ্জনক এবং ঐ সব ব্যবহার না করাই ভাল।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ :

বমি, পাতলা পায়খানা, উচ্চচাপজনিত দূর্বলতা, মাথাধরা, ঘাম দেওয়া।

প্রাথমিক চিকিৎসা :

১। গলাধঃকরণ করে ফেললে রুগীকে বমি করাতে হবে যদি না ব্যক্তিটি অচৈতন্য থাকে । রুগীকে এক গ্লাস জলে এক চামচ নুন মিশিয়ে পান করিয়ে গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করাতে হবে।

২। চোখে লাগলে : সাদা জল বা নুনজল দিয়ে ১০–১৫ মিনিট ধরে ভাল করে চোখে ঝাপটা দিতে হবে।

প্রতিষেধক :

সালফাইড্রাইল বিক্রিয়াকারকগণ এর প্রতিষেধক। ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন এল–ক্রিস্ট্রাইন অথবা ইন্ট্রামাসকুলার ইনজেকশন ২০–৬০ মিগ্রা বিএএল (ডাইমারকাপরল অথবা ২,৩–ডাইমারকেপটো প্রোপানল) অনুমোদিত । লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা ব্যবস্থা হওয়া দরকার ।

ব্যবহৃত মোড়কের বিনষ্টিকরণ :

১। ব্যবহৃত মোড়ক অথবা অতিরিক্ত ওষুধের বিনষ্টিকরণ এবং ধোয়াধুয়ী সাবধানতার সঙ্গে করা উচিৎ যাতে জল বা পারিপার্শ্বিক পরিবেশের দূষণ না হয়।

২। ব্যবহৃত মোড়কের পুনঃ ব্যবহার রোধ করতে মোড়ক বাইরে ফেলা উচিৎ নয়।

৩। ব্যবহৃত মোড়ক নষ্ট করে বাসস্থান থেকে দূরে পুঁতে ফেলা উচিৎ ।

গুদামজাতকরণের শর্তাবলী :

১। কীটনাশক ভর্তি মোড়ক আলাদা ঘরে বা জায়গায় এবং খাদ্যবস্তু বা অন্যান্য জিনিসের থেকে দূরে রাখতে হবে অথবা কীটনাশকের প্রকৃতি ও পরিমাণ অনুযায়ী আলাদা আলমারিতে তালা চাবি দিয়ে রাখতে হবে।

২। রাখার ঘর অথবা জায়গা মজবুত, আলো বাতাসযুক্ত অথচ শুষ্ক ও ঠান্ডা হওয়া দরকার এবং চারিদিকে কিছু ফাঁকা জায়গা থাকা দরকার যাতে কীটনাশক মিশ্রিত বাতাসের প্রভাব না পড়ে।

ছিটিয়ে দেওয়ার ৪৮ ঘণ্টা পর এলাকায় প্রবেশ করুন।

সতর্কতা ঃ এই লেবেল / লিফলেটে নির্দিষ্ট ভাবে লিখিত শস্য ছাড়া অন্য কোন শস্যে এই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না।

Bengali

କାରଟାପ୍ ହାଇଡ୍ରୋ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୫୦% ଏସ ପି

କ୍ରିଟାପ® ୫୦ ଏସ ପି

(କୀଟନାଶକ)

କ୍ରିଟାପ୍ ୫୦ ଏସ ପି ଗ୍ରାନୁଲସ୍ ଧାନର କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ପତ୍ରମୋଡ଼ା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କୀଟନାଶକ । ଏହା କୀଟ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ପାଇଁ ଆୟତ୍ତ କରିଥାଏ । ଏହା ଉପକାରୀ କୀଟମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ ତଥା ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷକ୍ରିୟା-ରହିତ ।

ରାସାୟନିକ ମିଶ୍ରଣ :

କାରଟାପ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଟେକ୍‌ନିକଲ (ସର୍ବନିମ୍ନ ଶୁଦ୍ଧତା ୯୮%)	୫୧.୨୦% ଏମ୍/ଏମ୍
ସାରଫାକ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଲକାଇଲ ଫିନାଲସ ଏଥିଲିନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍	୦.୭୦% ଏମ୍/ଏମ୍
ଷ୍ଟାବିଲାଇଜର – ଇସୋପ୍ରୋପିଲ ଏସିଡ୍ ଫସଫେଟ୍	୦.୩୦% ଏମ୍/ଏମ୍
ଏସିଡ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଡାଇ	୦.୦୫% ଏମ୍/ଏମ୍
ଲୁୟେଟ – ଲେସେଟକ୍ସ	୪୭.୭୫% ଏମ୍/ଏମ୍
ମୋଟ :	୧୦୦.୦୦% ଏମ୍/ଏମ୍

ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି :

ଶସ୍ୟ	କୀଟର ସାଧାରଣ ନାମ	ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ମାତ୍ରା			ଶେଷ ସିଞ୍ଚନ ଏବଂ ଅମଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମିଆଦ (ଦିନରେ)
		ଏ.ଆର. (ଜି /%)	ସୂତ୍ର (ଏମ୍.ଏଲ୍.)	ପାଣିରେ ତରଳ (ଲିଟର)	
ଧାନ	କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା	୫୦୦	୧୦୦୦	୫୦୦–୧୦୦୦	—
	ପତ୍ର ମୋଡ଼ା	୫୦୦	୧୦୦୦	୫୦୦–୧୦୦୦	—

ଚାରା ରକ୍ଷାକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି :

ନ୍ୟାପ୍‌ସାକ୍ ସ୍ପ୍ରେୟାର୍, ରକିଂ ସ୍ପ୍ରେୟାର, ରକିଂ ସ୍ପ୍ରେୟାର, ଷ୍ଟିରପ୍ ସ୍ପ୍ରେୟାର, ଫୁଟ୍ ସ୍ପ୍ରେୟାର, କମ୍ପ୍ରେଶନ ନ୍ୟାପସାକ ସ୍ପ୍ରେୟାର ଏବଂ ଆର୍‌ପୀ–ଏଚ୍‌ଟିପି ପାୱାର ସ୍ପ୍ରେୟାର ଭଳି ହାଇ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆପରେଟେଡ ସ୍ପ୍ରେୟାର ।

ସାବଧାନତା :

୧। ଗୋଳାଉଥିବା ବେଳେ ଝରିପଡ଼ିବା ବା ଛିଟିକି ପଡ଼ି ବୁଜରେ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ନ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ଖାଲି ହାତରେ ଗୋଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

୨। ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସାବଧାନତାମୂଳକ ପୋଷାକ ଯଥା ରବର ଗ୍ଲୋଭସ୍, କିମ୍ବା ମୁହଁ ମୁଖା ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଥିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ପୁରାପୁରି ରବର ଆପ୍ରନର ହୁଡ୍ କିମ୍ବା ଟୋପି ରହିବା ଦରକାର ।

୩। ଲୋ ଏବଂ ଅଳ୍ପରୁ ଲୋ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଆପ୍ଲିକେଶନ ଭଲ୍ୟୁମ୍‌ମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହାଇ ଜନସେନ୍ଟ୍ରେଶନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବିପଦଜନକ । ଏଣୁ ଏପରି କରିବେ ନାହିଁ ।

ବିଷକ୍ରିୟାର ଉପସର୍ଗ :

ବାନ୍ତି ହେବା, ଡାଇରିୟା, ହାଇପୋଥେମିୟା ଦୁର୍ବଳତା, ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା, ଝାଳହେଉବା ।

ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା :

୧। ଯଦି ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ବିଷକ୍ରିୟା ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ତେବେ ରୋଗୀ ଅଚେତନ ହୋଇନଥିଲେ ତାକୁ ବାନ୍ତି କରାନ୍ତୁ । ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏକ ଚାମୁଚ ଲୁଣ ମିଶା ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ରୋଗୀକୁ ପିଇାନ୍ତୁ ଏବଂ ବାନ୍ତି ଉଦ୍ରେକ କରିବା ପାଇଁ ରୋଗୀଙ୍କ ଗଳାର ପଛପଟୁ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ସଲସଲା କରନ୍ତୁ ।

୨। ଚକୁ ସଂକ୍ରମଣ : ପୁରୁଣ ପରିମାଣର ଲୁଣ ପାଣି / ପରିଷ୍କାର ପାଣିରେ ୧୦ରୁ ୧୫ ମିନିଟ୍ ଧୋଇବୁ ।

ପ୍ରତିଷେଧକ :

ସଲଫାଇଡ୍ରାଇଲ ବିକ୍ରିୟାକାରକସକଲ ଇୟାର ପ୍ରତିଷେଧକ । ଏଲ–ଭ୍ରାଇଷ୍ଟାଇନ୍ ଶିରାରେ କିମ୍ବା ମାଂସପେଶୀରେ ଇନ୍‌ଜେକଶନ୍ ୨୦ ରୁ ୬୦ ମିଗ୍ରା ବିଏଏଲ (ଡାଇମାରକାପରଲ କିମ୍ବା ୨, ୩–ଡାଇମରକ୍ୟାପଟୋ ପ୍ରୋପାନଲ) ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି । ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ ।

ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ଜନ :

୧। ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀ ବା ବଳକା ମିଶ୍ରିତ କୀଟନାଶକ ଏବଂ କୀଟନାଶକ ପାତ୍ରାଦିର ଧୌତ ଦୂଷିତ ପାଣିକୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ, ଯେପରି ପରିବେଶ ବା ପାଣି ଦୂଷଣ ନହୁଏ ।

୨

கார்டாப் ஹைட்ரோக்ளோரைட் 50% SP

கிரிடாப்® 50 SP

(பூச்சி கொல்லி)

கிரிடாப் 50 SP அரியில் தண்டு துளையான் இலை மடிப்பான் போன்றவற்றில் உயர்தர விளைவு தரும் ஒரு பூச்சி கொல்லி. இது நீடித்து இருக்கும் சக்தியுடன் பூச்சிகளின் இயற்கை எதிரிகள் மீது இது எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுத்துவதில்லை மற்றும் குட்டி போடும் ஜந்துகளுக்கு இது விஷமாவதில்லை.

ரசாயனக்கலவை :

கார்டாப்ஹைட்ரோக்ளோரைட் டெக்னிகல் (குறைந்த பட்ஷ தூய்மை 98%)	51.20% m/m
சர்ஃபேக்டன்ட் -ஏல்கைல் ஃபினால்	0.70% m/m
இதிலைன் ஆக்ஸைட்	
ஸ்டேபிலைசர்-ஐஸோப்ரோபைல் ஏஸிட் ஃபாஸ்பேட்	0.30% m/m
ஏஸிட் கிரீன் டை	0.05% m/m
ட்லூரன்ட் - லேஸ்டோக்	47.75% m/m
மொத்தம் :	100.00% m/m

பரிந்துரைகள் :

பயிர்	பூச்சியின் பொது பெயர்	அளவு பிரதி ஹெக்டருக்கு			காத்திருக்கும் காலம் கடைசி ஸ்ப்ரே முதல் அறுவடை நாள் வரை இடைவேளை (நாட்கள்)
		எ.ஐ. (கி/%)	சூத்திரம் (கிலோ)	தண்ணியில் (லிட்டர்கள்)	
அரிசி	தண்டு துளையான்	500	1000	500-1000	–
	இலைமடிப்பான்	500	2000	500-1000	–

செடி பாதுகாப்பு உபகரணம் :

அதிகபரிமாணகையால் உபயோகம் செய்யும் ஸ்ப்ரேயர் உம் நேப்ஸாக்ஸ்ப்ரேயர் - ராக்கிங் ஸ்ப்ரேயர், ஸ்டிராப் ஸ்ப்ரேயர், ஃபுட் ஸ்ப்ரேயர் கம்ப்ரெஷன் நேப்ஸாக் ஸ்ப்ரேயர் மற்றும் ஆஸ்பீ- HTP ஸ்ப்ரேயர்.

முன்னெச்சரிக்கை :

1) கலைவயின் பொழுது சிந்துதலாலோ தெளிப்பதாலோ சுவாசிப்பதையோ சருமத்துடன் தொடர்பு ஏற்படுவதையோ தவிர்க்கவும். வெறும் கையால் கலக்க வேண்டாம்.
2) உபயோகிப்பவர் முழுவதும் பாதுகாப்பு தரும் உடுப்புடன் ரப்பர் கையுறை அணியப்பட்டு முகம் மாஸ்கினால் மறைக்கப்பட்டு ரப்பரினாலான மேலங்கி அல்லது தொப்பி அணியவேண்டும்.
3) குறைந்த அல்லது மிகக்குறைந்த தெளிக்கும் உபகரணம் மூலம் அதிக அளவு திகட்டு பிரயோகம் அபயாகரமானது. ஆதலால் தவிர்க்கப்படவேண்டும்.

விஷமேறியதன் அறிகுறி :

வாந்தி, வயிற்றுப் போக்கு, பலவீனம்சிவத்தல், தலைவலி, வேர்வை.

முதலுதவி நடவடிக்கைகள் :

1) விஷம் உள்ளே சென்றால் நோயாளி மயக்கமாய் இல்லாவிட்டால் வாந்தி எடுக்க வையுங்கள். ஒரு ஸ்பூன உப்பு கலந்த ஒரு கிலாஸ் தண்ணீர் குடிக்கவைத்து தொண்டையில் விரலால் சிலிர்பூட்டி வாந்தி எடுக்க வையுங்கள்.
2) கண்களுக்கும் : அதிக அளவு உப்பு/சுத்த தண்ணீரால் 10 முதல் 15 நிமிடம் கழுவுங்கள்.

மாற்று மருந்து :

ஸல்ஃபிட்ரைல் ஏஜெண்டுகள் மாற்று மருந்து - கிரிஸ்டைன ஊசி அல்லது உள்தை ஊசி, 20-60 எம்ஜி BAL (டிமர் கேப்ரால் அல்லது 2, 3 டிமர்-காப்டோ ப்ரொபோனால்) பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. அறிகுறிக்கு ஏற்றவாறு சிகிச்சை அளிக்கவும்.

உபயோகமான பெட்டிகளை களைவது :

1) உபயோகமான பேக்கெட்டுகள், எஞ்சிய பொருட்கள் மற்றும் பூச்சிமருந்தை கலந்த பாத்திரங்கள் சுற்றுப்புறத்திற்கும் தண்ணீருக்கும் களங்கம் ஏற்படாதவாறு களையப்பட வேண்டும்.
2) உபயோகப்படுத்தப்பட்ட பேக்கெட்டுகள்அவை மறுபடியும் உபயோகம் ஆவதை தடுக்க வெளியே விட்டு வைக்கப்படக் கூடாது.
3) பேக்கேஜ்கள் உடைக்கபட்டு மனித நடமாட்டம் இல்லாத இடங்களில் புதைக்கப்பட வேண்டும்.

சேகரித்து வைக்கும் நிபந்தனைகள் :

1) பூச்சி மருந்து கொண்ட பேக்கேஜ்கள் தனிப்பட்ட இடத்திலோ அல்லது அறையிலோ மற்ற பொருட்கள், குறிப்பாக உணவுப் பொருட்கள் வைக்கப்பட்டு இருக்கும் இடத்திலிருந்து தள்ளி தனிப்பட்ட அலமாரிகளில், பூச்சி கொல்லியின் அளவு மற்றும் குணத்திற்கு ஏற்றவாறு பூட்டப்பட்டு வைக்கப்படவேண்டும்.
2) பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை சேகரித்துவைக்கும் அறையோ அல்லது இடமோ வெளிச்சத்துடன் நன்கு கட்டப்பட்டு, காய்ந்து குளுமையாக, காற்று வசதியுடன் போதிய பரிமாணத்தில் நீராவியுடன் தொடர்பு ஏற்படாதவாறுஷை இருக்கவேண்டும்.

பிரத்யேக மறு நுழைவு காலம்: 48 மணி நேரம்.

எச்சரிக்கை: லீஃப்லெட்டில் கூறியது தவிர வேறு எந்த பயிரிலும் பிரயோகம் செய்வது கூடாது.

Tamil

క్యార్ట్యాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 50% ఎస్‌పి

క్రిట్యాప్® 50 ఎస్‌పి

(క్రిమినాశని)

క్రిట్యాప్ 50 ఎస్‌పి వరిపై బోదె ఛిద్రకాలు మరియు ఆకుమడతలను అరికట్టగల శక్తివంతమైన క్రిమినాశని. ఇది అన్ని అంచెలలోనూ, అత్యంత ఫలితాన్నందిస్తూ పురుగులను అరికట్టుతుంది. ప్రకృతివరంగా పురుగులను అరికట్టువాటిపై ప్రభావం చూపదు. సెంపుడు జంతువులకు హానికరం కాదు.

రసాయనిక కూర్పు :

క్యార్ట్యాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ టెక్నికల్ (మినిమ శుద్ధత 98%)	51.20% ఎమ్/ఎమ్
సర్ఫక్టంట్-ఆల్కిల్ ఫెనల్ ఎథెనే ఆక్సైడ్	0.70% ఎమ్/ఎమ్
స్టబిలైజర్ -ఐసోప్రోపిల్ ఆసిడ్ ఫాస్ఫేట్	0.30% ఎమ్/ఎమ్
ఆసిడ్‌గ్రీన్‌డై	0.05% ఎమ్/ఎమ్
డ్లూంట్ – లేసిటాక్స్	47.75% ఎమ్/ఎమ్
మొత్తం :	100.00% ఎమ్/ఎమ్

సిఫార్సు :

పంట	సాధారణంగా వచ్చు తెగులు	హెక్టారుకు తగిన మోతాదు			చివరి స్ప్రే మరియు పంట దిగుబడికి మధ్య ఉండవలసిన సమయం
		ఎ.ఐ. (జి/%)	కూర్పు (మి.లీ.)	నీటితో పలుచన చేయుట (లీ.)	
వరి	బోదె ఛిద్రకం	500	1000	500–1000	–
	ఆకు మడత	500	1000	500–1000	–

మొక్కను సంరక్షించే సాధనం :

న్యూనాక్ స్ప్రేయర్ వంటి అత్యధిక పరిమాణంగల హ్యాండ్ ఆపరేటెడ్ స్ప్రేయర్, రాకింగ్ స్ప్రేయర్, స్టిరప్ స్ప్రేయర్, ఫుట్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ న్యూనాక్ స్ప్రేయర్ మరియు ఎఎస్‌పిఇ–హెచ్‌టిపి పవర్ స్ప్రేయర్.

తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు :

1. పీల్చరాదు, పలుచన చేయు సమయంలో చిందులు, పొర్లిపోవడంవలన చర్మానికి సమాంతర తగలనివ్వకండి. చేతులకు రక్షణ లేకుండా కలపకండి.
2. ఈ మందు వాడే వారు, రబ్బరు తొడుగులతో సహా రక్షకదుస్తులు, మొఖానికి మాస్క్ మరియు ఒక ఓవర్‌ఆల్ లేదా రబ్బరు అప్రాన్ లేక టోపీ తప్పక దరించవలెను.
3. తక్కువ లేక అతి తక్కువ విస్తారం, ఎక్కువ గాఢత్వంతో సాధనం వాడుక అపాయకరమైనది, కావున అటువ వాడరాదు.

విషలక్షణాలు :

వాంతులు, విరోచనాలు, హైపోథెర్మియా నీరసం, ఫ్లషింగ్, తలనొప్పి, చెమటలు పూయడం .

ప్రథమ చికిత్స :

1. విషం మింగిన ఎడల, అతను స్పృహలో ఉంటే రోగికి వాంతి చేయించండి, వాంతి చేయించడానికి రోగికి ఒక చెంచా ఉప్పు వేసిన నీటిని గ్లాసులో తాగించి రోగి గొంతులో వేలుపెడితే ప్రయత్నించండి.
2. కంటితో సంబంధం : 10 నుండి 15 నిమిషముల వరకు ఉప్పునీటి / శుభ్రమైన నీటితో కడుగండి.

విరుగుడు :

సల్ఫైడ్రిల్ ఏజెంట్లు విరుగుడుగా పనిచేస్తాయి. ఎల్–క్రిస్టియన్ ఇంట్రామీస్ ఇంజక్షన్ ద్వారా లేదా బిఎంయల్ యొక్క 20–60 మిగ్రా ఇంట్రామస్క్యులర్ ఇంజక్షన్ (డైమర్‌క్యాప్రోల్ లేక 2–3 డైమర్‌క్యాప్టో ప్రొపానల్) పుచ్చుకొనవని సిఫార్సు చేయబడుచున్నది. లక్షణాల నదనుసరించి చికిత్స చేయవలెను.

వాడిన కంటెయినర్లు పారవేయు విధానం :

1. పరిసరప్రాంత కాలుష్యం మరియు నీటికాలుష్యంను అరికట్టడానికి, వాడిన ప్యాకేజీలు మరియు మిగిలిన సరుకులు, క్రిమినాశక మందులు మరియు కంటెయినర్లు కడిగిన నీరును సురక్షితంగా పారవేయవలెను.
2. వాడిన ప్యాకేజీలు తిరిగి వాడబడకుండా బయట వదిలిపెట్టరాదు.
3. ప్యాకేజీలు సగులగొట్టి వాడుకకు అలవికాకుండా పాతిపెట్టవలెను.

నిలువ :

1. క్రిమినాశనిగల ప్యాకేజీలు, ముఖ్యంగా తిండిపదార్థాలకు దూరంగా విడివిడి గదులలో లేక స్టెమిసెస్ నందు, మిగతా పదార్థాలను నిలువచేయుటను వాడబడే గదులకు దూరంగా నిలవ చేయవలెను. ప్రత్యేక అలమారులలో తాళంవేసి వాటి పరిమాణం మరియు క్రిమినాశని యొక్క తరహా ననుసరించి జాగ్రత్త చేయవలెను.
2. క్రిమినాశనిలను భద్రపరచే స్టోర్‌రూమ్‌లు, స్టెమిసెస్ వెలుతురు బాగుగా కలిగి, చక్కగా కట్టబడి, పొడి, చల్లని, గాలి ప్రసరింప చేసే విధంగా కట్టబడాలి ఇంతేగాక, ఆవిరితో కలియక వసికిరాదు.

పీచికారి చేసిన పిదప ప్రవేశించు వ్యవధి : 48 గంటలు

హెచ్చరిక : లేబల్/లీఫ్‌లెట్‌లో పేర్కొన్న పంటలకు కాకుండా ఇతర పంటలకు దీనిని వాడకూడదు.

Telugu

कारटैप हाइड्रोक्लोराइड 50% एस पी

क्रिटैप® 50 एस पी

(कीटनाशक)

क्रिटैप 50 एसपी धान के डंठल व पत्तों पर लगने वाले कीटों की रोकथाम के लिए अत्यंत असरदार कीटनाशक है। यह कीटों की रोकथाम सभी स्तरों पर करता है और इसका असर लम्बे समय तक बना रहता है। यह कीटों के कुदरती शत्रुओं पर कोई असर नहीं डालता तथा यह सामान्यतया स्तनपायियों के लिए गैर–टॉक्सिक है।

रासायनिक संयोजन :

कारटैप हाइड्रोक्लोराइड टेक्निकल (न्यूनतम शुद्धता 98%)	51.20% एम/एम
सरफैक्टेण्ट – अलकिल फिनायल एथीलीन ऑक्साइड	0.70% एम/एम
स्टैबीलाइजर–आइसोप्रोपिल ऐसिड फॉस्फेट	0.30% एम/एम
ऐसिड ग्रीन डाइ	0.05% एम/एम
इलुएण्ट–लेसेटोक्स	47.75% एम/एम
कुल :	100.00% एम/एम

सिफारिश :

फसल	रोग का सामान्य नाम	प्रति हेक्टर खुराक			प्रतीक्षा का समय पिछले स्प्रे से लेकर फसल तैयार होने तक (दिनों में)
		ए.आई. (जी/%)	फॉर्मूलेशन (मि.ली.)	पानी में पतला किया गया (लीटर)	
धान	डंठल के कीट	500	1000	500-1000	–
	पत्तों के कीट	500	1000	500-1000	–

पौधों के बचाव का उपकरण :

अधिक मात्रा वाले हाथ से चलाए जाने वाले स्प्रेयर जैसे–नैपसैक स्प्रेयर रॉकिंग स्प्रेयर, स्टिरप स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर, कंप्रेशन नैपसैक स्प्रेयर एवं एसपी–एचटीपी पावर स्प्रेयर ।

सावधानियाँ :

1. मिलाते समय अगर गिर अथवा बिखर जाय, तो त्वचा से सम्पर्क होने तथा सांस लेने से बचें । खुले हाथों से न मिलाएँ ।
2. इस्तेमालकर्ता को पूरी सुरक्षा वाले कपड़े पहनने चाहिए जिसमें शामिल है रबर के दस्ताने। या तो चेहरे को मॉस्क से ढकना चाहिए या फिर रबर के एप्रॉन टोपी या हैट से।
3. अधिक गाढ़ेपन के साथ प्रयोग करें। कम अथवा अत्यंत कम मात्रा वाले उपकरण खतरनाक होते हैं तथा उनसे बचना चाहिए।

विषक्रिया के लक्षण :

उल्टी, दस्त, कमजोरी, बेचैनी, शिरदर्द, पसीना आना।

प्राथमिक चिकित्सा के उपाय :

1. पी लेने के मामले में रोगी को उल्टी करवाएँ वशर्ते रोगी बेहोश न हुआ हो। एक गिलास पानी में एक बड़ा चम्मच नमक मिला कर रोगी को पिलाएँ तथा रोगी के गले में अंगुली डालकर उसे उल्टी करवाएँ ।
2. आँख में चले जाने पर – 10 से 15 मिनट तक लवणयुक्त साफ / प्रचुर जल से धोएं ।

प्रतिकार :

सल्फिड्रिल एजेण्ट हैं बिष निवारक। एल–क्रिस्टिन का इन्ट्रावेनस इंजेक्शन या 20–60 मि.ग्रा. का बीएएल इण्ट्रामेस्कुलर इंजेक्शन (डाइमर्काप्रोल या 2, 3–डाइमर्काप्टो प्रोपनॉल) की सिफारिश की जाती है। लक्षण के अनुसार इलाज करवाएँ ।

व्यवहृत पात्रों को हटा देना :

1. व्यवहृत किए गए पैकेजों अथवा व्यवहृत पात्रों एवं कीटनाशक धोने के बाद अवशेष पदार्थ साफ करने के कपड़े तथा पात्रों को इस प्रकार से सुरक्षित रूप से हटा देना चाहिए जिससे कि पर्यावरण और पानी प्रदूषित न हो।
2. व्यवहृत पैकेजों को इस प्रकार के हटाया जाय जिससे कि उनके दुबारा व्यवहार पर रोकथाम हो।
3. पैकेजों को तोड़–मरोड़ कर उन्हें निवास स्थानों से दूर मिट्टी के अंदर गाड़ देना चाहिए ।

कीटनाशक का रखरखाव :

1. कीटनाशकों के पैकेजों को अलग कमरों या अलग परिसरों में रखना चाहिए। अन्य पदार्थों विशेष कर खाद्य पदार्थों से दूरी पर स्थित होना चाहिए एवं कीटनाशक के परिमाण और वह किस प्रकार का है उसके अनुसार उसे अलग से अलमारी में ताला बंद करके रखा जाना चाहिए।
2. स्टोर कमरे या परिसर जहाँ पर कीटनाशक रखे जाते हैं वहाँ पर अच्छी रोशनी होनी चाहिए तथा वह स्थान अच्छी तरह से निर्मित हो, सूखा हो, ठंडा हो, हवा का आवागमन और पर्याप्त आयतनयुक्त हो जिससे आर्द्रता के कारण वह स्थान दूषित न हो सके।

छिड़काव के 48 घंटे बाद क्षेत्र में प्रवेश करें।

चेतावनी: लेबल/लीफलेट में दी गयी फसलों के अलावा अन्य फसलों व कीटों पर इसका उपयोग न करें।

Hindi

Cartap Hydrochloride 50% SP

KRITAP® 50 SP

(Insecticide)

Kritap 50 SP is an insecticide highly effective for the control of stem borer and leaf folder on rice. It controls all stages of insects and its efficacy is prolonged. It has no effect on natural enemies of insect pests and is practically non-toxic to mammals.

Chemical composition :

Cartap hydrochloride technical (min. purity 98%)	51.20% m/m
Surfactant - Alkyl phenol ethylene oxide	0.70% m/m
Stabilizer - Isopropyl acid phosphate	0.30% m/m
Acid green dye	0.05% m/m
Dluent - Lacetoxe	47.75% m/m
Total :	100.00% m/m

Recommendations :

Crop	Common name of Disease	Dosages per Hactare			Waiting period between last spray and harvest (days)
		a.i (g/%)	Formulation (ml)	Dilution in water (ltrs)	
Rice	Stem Borer	500	1000	500-1000	–
	Leaf Folder	500	1000	500-1000	–

Plant protection equipment :

High volume hand operated sprayer like Knapsack sprayer, Rocking sprayer, Stirrup sprayer, Foot sprayer, Compression Knapsack sprayer and ASPEE-HTP power sprayer.

Precaution :

1. Avoid inhalation and skin contact while diluting because of spillages or splashes. Do not mix with bare hands.
2. The user should use ful protective clothing which includes rubber gloves, either face should be covered with mask and an overall or rubber apron hood or hat.
3. Use in high concentration with low and ultra low volume application equipment is dangerous and should be avoided.

Symptoms of poisoning :

Vomiting, diarrheoa, hypothermia weakness, flushing, headache, sweating.

First Aid measures :

1. In case of ingestion, make the patient vomit, except if person is unconscious. Make the patient drink a glass of water containing one table spoon of salt and tickle the back of the patient's throat with a finger to induce vomiting.
2. Eye contamination : Flush with plenty of saline/clean water for about 10 to15 minutes.

Antidote :

Sulphydryl agents are antidotes. Intravenous injection of L-Crystaine or intramuscular injection of 20-60 mg of BAL (dimercaprol or 2,3-dimercapto propanol) are recommended. Treat symptomatically.

Disposal of used container :

1. Used packages or surplus materials and washings of the insecticides and containers shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage conditions :

1. The packages containing the insecticides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly food articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and the nature of the insecticides.
2. The store rooms or premises for storing the insecticides should be well lit, well built, dry, cool, ventilated and of sufficient dimensions, to avoid contamination with vapour.

Optimal re-entry period : 48 hrs.

Caution: Not to be used on Crops other than specified on this Label/Leaflet.

English

Read Instructions Leaflet before use

उपयोग से पहले निर्देश पत्रिका पढ़े।

For Agricultural use only

केवल कृषि उपयोग के लिए

Store in a cool, dry and well ventilated place.

ठंडी, सूखी और अच्छी तरह हवादार जगह में संग्रह करें।

Cartap Hydrochloride 50% SP

KRITAP® 50 SP

(Insecticide)

कारटैप हाइड्रोक्लोराइड 50% एस पी

क्रिटैप® 50 एस पी

(कीटनाशक)

CIR-59,196/2008-Cartap Hydrochloride(SP) (286)-876

TRADITION • INNOVATION • TRUSTESHIP

KRISHI RASAYAN GROUP

SINCE 1966 IN AGROCHEMICALS

Manufactured and Marketed By:

KR Lifesciences Pvt. Ltd.

29, LALA LAJPAT RAI SARANI,

KOLKATA - 700 020, INDIA

E-mail : kr@krishirasayan.com

निर्माता एवं विपणनकर्ता :

केआर लाईफसाईन्सेस प्रा.लि.

29, लाला लाजपत राय सारनी, कोलकाता – 700020

For manufacturing unit address see first three characters of batch no. and see below :

KRR :

Maitapur, P.O. Ranital, Balasore,

Orissa, PIN - 756 111

Mfg. Lic. No. e-Lic/INSECTI/MAN-PP-2

KRK :

Joykrishnapur, P.O. Bonhoogly II

Sonarpur, South 24 Parganas,

West Bengal, PIN - 700 103

Mfg. Lic. No. MPP/ILC/145/K-2

Customer Care Detail :

KR LIFESCIENCES PVT. LTD.

29, Lala Lajpat Rai Sarani, Kolkata - 700 020

Toll Free No. : 18001211800

email : customercare@krishirasayan.com

Not to be used on crops other than specified on this leaflet

DANGEROUS TO RE-USE EMPTY CONTAINERS/PACKAGES