കാർടാപ്പ് ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് 4% ഗ്രാന്യൂൾസ്

ക്രിടാപ്പ് ® 4ജി

(കീടനാശിനി)

ക്രിടാപ്പ് 4% ജിആർ നെൽവിളയിൽ കണ്ടുവരുന്ന തണ്ടുതുരപ്പാൻ, ഇലമടക്കി കൂടാതെ പുഷ്പങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്ന പുഴു എന്നിവകളെ ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഇതിന് മറ്റു കീടനാശിനികളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രവർത്തനക്രമമാണ് ഉള്ളത്. ഇത് എല്ലാ വിധ ഘട്ടങ്ങളിലുമുണ്ടാകുന്ന കീടങ്ങളെ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ കാര്യക്ഷമമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നു. കീടങ്ങളെ നേരിടുന്ന നൈസർഗ്ഗികങ്ങളായ കീടങ്ങളെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല, സ്ഥാന്യജീവികൾക്ക് പ്രായോഗികമായി വിഷമമേൽപ്പിക്കാത്തതുമാകുന്നു

രാസായനിക മിശ്രണം :

കാർടാപ്പ് ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ്, a.i. (കുറഞ്ഞ ശുദ്ധി 98%)	4.00%	w/w
ഐസോപ്രോപ്പിൽ ആസിഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ്	1.00%	w/w
ഫോസ്ഫെറിക് ആസിഡ്	0.50%	w/w
NP 85 അല്ലെങ്കിൽ സമതുല്യമായത്	1.50%	w/w
ചൈനാ ക്ലെ-കളിമണ്ണ് - കാവോലിൻ	5.00%	w/w
മണൽ	Q.S. 100 തികയ്ക്കുവാൻ	
മൊത്തം :	100.00%	w/w

ശുപാർശകൾ :

വിളവ്	രോഗത്തിന്റെ സാധാരണ പേര്	ഏ.ഐ. (ഗ്രാം /%)	ഫോർമുലേഷൻ (കെജി)	വെള്ളത്തിൽ കലർത്തൽ (ലിറ്റർ)	അസോസണ്ടേ ബ്ലൂ ബ്ലൂമ്പ് വിളവുള്ളപ്പോൾ പരമ്പരാഗത കാഞ്ഞിരപ്പ് സമയം (ദിവസങ്ങളിൽ)
നെൽ	തണ്ടുതുരപ്പാൻ	750	18.750	*	—
	ഇലമടക്കി	750-1000	18.750-25.000	*	—
	പുഷ്പങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നവ	750-1000	18.750-25.000	*	—

* ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോസ് അധികരിക്കുന്നതല്ല.

സസ്യ സംരക്ഷണം :

ഗ്രാന്യൂൾ അപ്ലിക്കേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ കൈയ്യുറകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിതറുക.

മുന്നറിയിപ്പുകൾ :

1. മിശ്രണമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ചിതറലുകൾ, തെറിക്കലുകളുകൾ കാരണം ശ്വസിക്കുന്നതോ, ചർമ്മത്തിൽ പെടുന്നതോ തടയുക. വെറും കൈകൊണ്ട് മരിക്കല്ലും കലർത്തരുത്.
2. ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സമ്പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അതായത് റബ്ബർ കൈയ്യുറകൾ, മുഖംമൂടി പോലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളോ, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം മുഴുവൻ മൂടുന്ന വിധത്തിലുള്ളവയോ ധരിച്ചിരിക്കണം.
3. അധിക ശക്തിയുള്ള മിശ്രണം കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നച ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപകടകരമാണ്, അതിനാൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.

വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ :

മനം പിരട്ടൽ, ശരീരം മുഴുവൻ വിറയൽ, ഉമിനിരൊഴുക്ക്, മൂർഛ, അജിർണ്ണം, മിയാറിയാസിസ്.

പ്രഥമ ചികിത്സ :

കണ്ണുകൾ മലിനമായാൽ, ധാരാളം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക. വിഴുങ്ങിയാൽ തൊണ്ടയുടെ പിന്ഭാഗത്ത് ഇക്കിളിപ്പെടുത്തി ഒഴിവാക്കുക. രോഗി അബോധാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ മരുദ്ദിക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കരുത്. ഒരു ഡോക്ടറെ വിളിക്കുക.

മറു മരുന്ന് :

എൻ-ക്രിസ്റ്റൈനിന്റെ 100-200 എംജി ഇൻട്രാവേനസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ മൂലം കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബിഎഎൽ (ഡൈമെർകാപ്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ 2, 3-ഡൈമെർകാപ്റ്റോ പ്രൊപാനോൽ) ഇൻട്രാമസ്കുലർ 20-60 എംജി ഇഞ്ചക്ഷനായി കൊടുക്കുവാനും ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

ഒഴിഞ്ഞ ടിന്നുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് :

1. ഉപയോഗിച്ച പാത്രങ്ങളും, ബാക്കി വന്നിരിക്കുന്ന സാമഗ്രികളോ, കീടനാശിനി കലർന്ന കഴുകിയ വെള്ളമോ പരിസരമലിനീകരണവും ജലമലിനീകരണവും സംഭവിക്കാത്ത വിധത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി കളയേണ്ടതാണ്.
2. ഒഴിഞ്ഞ ടിന്നുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടയുവാനായി അവ പുറത്ത് ഇടരുത്.
3. പാത്രങ്ങളുകൾ പൊട്ടിച്ച് ജനവാസമില്ലാത്ത ഇടത്ത് കുഴിച്ചുമൂടുക.

ശേഖരച്ചു വെയ്ക്കേണ്ടുന്നവിധം :

1. കീടനാശിനികളുടങ്ങിയ പാത്രങ്ങുകൾപ്രത്യേകം മുറികളിലോ കെട്ടിടങ്ങളിലൊ, മറ്റു സാമഗ്രികൾ സൂക്ഷിക്കുവാനുപയോഗിക്കുന്ന, പ്രത്യേക്കിച്ചും ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന മുറികളിൽനിന്നും വേറിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കീടനിശിനിയുടെ അളവും സ്വഭാവവും അനുസരിച്ച് പ്രത്യേകം അലമാരികളിൽ വച്ച് താഴിട്ട് പൂട്ടി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
2. ബാഷ്പവുമായി കലർന്ന് വായുവിൽ വിഷാംശം കലരുന്നതൊഴിവാക്കാൻ കീടനാശിനി സൂക്ഷിക്കുവാനുപയോഗിക്കുന്ന മുറികളോ കെട്ടിടങ്ങളൊ പ്രകാശമുള്ളതും, സുനിർമ്മിതവും, വരണ്ട്, കുമ്പുമിമയോടുകൂടി, ആവശ്യമുള്ള ജാലകങ്ങളോടികൂടിയതായിരിക്കണം.

തിരികെ പ്രവേശിക്കേണ്ട സമയം : 48 മണിക്കൂർ

ശ്രദ്ധിക്കുക : ഈ ലീഫ് ലെറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിളകളിൻ മേൽ അല്ലാതെ മറ്റു വിളകളിൽ ഇത് ഒരു കാരണവശാലും ഉപയോഗിക്കരുത്

Malayalam

ಕಾರ್ಟಾಪ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ 4% ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲ್ಸ್

ಕ್ರಿಟ್ಯಾಪ್® 4ಜಿ

(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಕ್ರಿಟ್ಯಾಪ್ 4% ಗ್ರ್ಯಾ. ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ಬುಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು, ಎಲೆ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು ಮತ್ತು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ತಗಲುವ ಎಲೆ ಸುರುಳಿ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ತೀರಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಕೀಟಗಳನ್ನೂ ನಿರಂತರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿರಪಾಯ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯನ್ನೂ ತರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಮೊಲೆಯೂಡುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಕಾರ್ಟಾಪ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್, ಎ.ಐ. (ಕನಿಷ್ಠಶುದ್ಧತೆ 98%)	4.00% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್	1.00% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಫಾಸ್ಫಾರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್	0.50% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಎನ್‌ಪಿ-85 ಅಥವಾ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ	1.50% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಚೈನಾ ಕ್ಲೇ-ಕಾಯೋಲಿನ್	5.00% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಮರಳು	ಪರಿಮಾಣದ ಆಧಾರ 100 ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲು
	ಮೊತ್ತ : 100.00% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ

ಶಿಫಾರಸುಗಳು :

ಬೆಳೆ	ಕೀಟಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಪರಿಮಾಣ ಎ.ಐ. (ಜಿ/%)	ಸಂಯೋಜನೆ (ಕಿ.ಗ್ರಾಂ)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸುವಿಕೆ (ಲೀಟರ್)	ಕೊಯ್ಯುವ ಶಿಫಾರಸು ಹಾಗೂ ಕೊಯ್ಯುವ ಸಮಯದ ಅಂತರ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
ಭತ್ತ	ಕಾಂಡ ಕೊರೆಕ	750	18.750	*	—
	ಎಲೆ ಕೊರೆಕ	750–1000	18.750–25.000	*	—
	ಎಲೆ ಸುರುಳಿ	750–1000	18.750–25.000	*	—

* ನೀರಿನ ಮಿಶ್ರಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಪರಿಕರ :

ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೆಟರ್ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಲೌಸ್‌ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕೈಯಿಂದ ಎರಚಬೇಕು.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು :

1. ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಸುರಿಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಎರಚುವಾಗ ಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸೇರದಂತೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ಬರಿಯ (ನಗ್ನ) ಕೈಗಳಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ.
2. ಬಳಸುವಾಗ ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಾ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಖ ಹಾಗೂ ಶರೀರವನ್ನು ಮಾಸ್ಕ್‌ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ಆಪ್ರಾನ್ ಹುಡ್ ಅಥವಾ ಟೋಪಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿರಬೇಕು.
3. ಹೆಚ್ಚು ಗಾಢವಾದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಮಾಣದ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಬಳಕೆಯು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದುದು, ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.

ವಿಷ ತಗುಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು:

ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಕೈಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನ (ನಡುಕ), ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವಿಕೆ, ಉದ್ರೇಕ, ಸೆಳವು, ಆಮಶಂಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ :

ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಸುಂಗಿದರೆ ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಚಗುಳಿಯಿಡುವುದು ಮೂಲಕ ಕೆಮ್ಮುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಯು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವಾಂತಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ:

100-200 ಮಿ.ಗ್ರಾ.ನ ಎಲ್-ಕ್ರಿಸ್ಟೈನ್ ಅಥವಾ 20-60 ಮಿ.ಗ್ರಾ.ನ ಬಿಎಎಲ್ ಇಂಟ್ರಾವಮಸ್ಕುಲರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್‌ಅನ್ನು (ಡೈಮರ್‌ಕಾಪ್ರೊಲ್ ಅಥವಾ 2, 3-ಡೈಮರ್‌ಕ್ಯಾಪ್ಟೊ ಪ್ರೊಪನಾಲ್)ಅನ್ನು ಕೊಡಬಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವಿಕೆ :

1. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅಳಿದುಳಿದ ಶೇಷ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳನ್ನು ಜನವಸತಿ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗದಂತೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು.
2. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.
3. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಜನವಸತಿಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು.

ಸಂಗ್ರಹಣೆ :

1. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನಿಡುವ ಅಥವಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನಿಡುವ ಕೋಣೆಯಿಂದ ದೂರ ಹೊರ ಆವರಣದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಗವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡಬೇಕು.
2. ಕೀಟನಾಶಕವು ಹೊರಗಿನ ಭಾಷ್ಪಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸದಿರಲು ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನಿಡುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಆವರಣವು ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಒಣಗಿದ್ದು, ತಂಪಾಗಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು

ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು.ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮರು-ಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿ: 48 ಗಂಟೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಸಸ್ಯನಾಶಕವನ್ನು ಲೇಬಲ್ / ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

Kannada

কারটাপ হাইড্রোক্লোরাইড 4% দানা

ক্রিটাপ® 4 জি

(কীটনাশক)

ক্রিটাপ 4% দানা ধানের মাজরা, পাতা মোড়া এবং ভেঁপু পোকাকে অত্যন্ত কার্যকরীভাবে দমন করে। এর কাজের ধরণ অন্যান্য কীটনাশক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। পোকার জীবন চক্রের সব অবস্থাকেই এই কীটনাশক দমন করে এবং এর কার্যকারীতা দীর্ঘদিন বজায় থাকে। বন্ধু পোকার উপর এর কোন কুপ্রভাব নেই এবং স্তন্যপায়ী জীবজন্তুর উপর কার্যত কোন বিষক্রিয়া নেই।

রাসায়নিক উপাদান :

কারটাপ হাইড্রোক্লোরাইড, মূল উপাদান (কমপক্ষে ৯৮% বিশুদ্ধতা)	৪.০০% ডব্লু/ডব্লু
আইসোপ্রোপাইল এ্যাসিড ফসফেট	১.০০% ডব্লু/ডব্লু
ফস্ফরিক অ্যাসিড	০.৫০% ডব্লু/ডব্লু
এনপি – ৮৫ অথবা সমগোত্রীয়	১.৫০% ডব্লু/ডব্লু
চায়না ক্লে – কেওলিন	৫.০০% ডব্লু/ডব্লু
বালি	কিউ এস ১০০ করার জন্য
	মোট : ১০০.০০% ডব্লু/ডব্লু

অনুমোদন :

ফসল	পোকার চলতি নাম	প্রতি হেক্টরে মাত্রার পরিমাণ মূল উপাদান (গ্রা / %)	তৈরী ঔষুধ (কিলো)	জলে দ্রবণ (লিটার)	শেষ ঔষুধ এবং ফসল তোলার মধ্যে ন্যূনতম ব্যবধান
ধান	মাজরা পোকা	৭৫০	১৮.৭৫০	—	—
	পাতা মোড়া	৭৫০–১০০০	১৮.৭৫০–২৫.০০০	—	—
	ভেঁপু পোকা	৭৫০–১০০০	১৮.৭৫০–২৫.০০০	—	—

শস্য সংরক্ষণ যন্ত্রপাতি :

দানা প্রয়োগ যন্ত্র অথবা রবারের দস্তানা পরে ছড়ানো ।

সতর্কতা :

১। জলে মেশানোর সময় চুইয়ে আসা বা ছিটকে আসা ওষুধ নিশ্বাসে নেওয়া বা চামড়ার স্পর্শে যাতে না আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। খালি হাতে ওষুধ মেশানো বারণ।

২। ব্যবহারকারী তার সর্বাঙ্গ সুরক্ষার জন্য রবারের দস্তানা, মুখে ঢাকা দেওয়া মুখোশ ও গা ঢাকা দেওয়া কাপড় অথবা রবারের মাথা ঢাকা দেওয়া এপ্রন বা টুপি ব্যবহার করবেন।

৩। বেশী ঘনত্বের ওষুধ প্রয়োগে নিম্নচাপযুক্ত বা অতি নিম্নচাপযুক্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার বিপজ্জনক এবং ঐ সব ব্যবহার না করাই ভাল।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ :

গা বমি বমি ভাব, শরীর এবং বহিরাঙ্গের কাঁপুনী, লালাঝরা, থুতু ওঠা, ডিসপিয়া এবং মিয়ারিয়াসিস।

প্রাথমিক চিকিৎসা :

চোখ দূষিত হলে প্রচুর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। গিলে ফেলা হলে গলার পিছনে সুড়সুড়ি দিয়ে বাদ দিন। রোগী অজ্ঞান হলে বমি করাবেন না। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসককে ডাকুন।

প্রতিষেধক :

১০০–২০০ মিগ্রা এল-ক্রিসটেইন দিয়ে ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন অথবা ২০–৬০ মিগ্রা বিএএল (ডাইমারকাপরল অথবা ২,৩-ডাইমারকেপটো প্রোপানল) দিয়ে ইন্ট্রামাসকুলার ইনজেকশন অনুমোদিত।

ব্যবহৃত মোড়কের বিনষ্টিকরণ :

১। ব্যবহৃত মোড়ক অথবা অতিরিক্ত ওষুধের বিনষ্টিকরণ এবং ধোয়াধুয়ী সাবধানতার সঙ্গে করা উচিৎ যাতে জল বা পারিপার্শ্বিক পরিবেশের দূষণ না হয়।

২। ব্যবহৃত মোড়কের পুনঃ ব্যবহার রোধ করতে মোড়ক বাইরে ফেলা উচিৎ নয়।

৩। ব্যবহৃত মোড়ক নষ্ট করে বাসস্থান থেকে দূরে পুঁতে ফেলা উচিৎ।

গুদামজাতকরণের শর্তাবলী :

১। কীটনাশক ভর্তি মোড়ক আলাদা ঘরে বা জায়গায় এবং খাদ্যবস্তু বা অন্যান্য জিনিসের থেকে দূরে রাখতে হবে অথবা কীটনাশকের প্রকৃতি ও পরিমাণ অনুযায়ী আলাদা আলমারিতে তালা চাবি দিয়ে রাখতে হবে।

২। রাখার ঘর অথবা জায়গা মজবুত, আলো বাতাসযুক্ত অথচ শুষ্ক ও ঠান্ডা হওয়া দরকার এবং চারিদিকে কিছু ফাঁকা জায়গা থাকা দরকার যাতে কীটনাশক মিশ্রিত বাতাসের প্রভাব না পড়ে।

ছিটিয়ে দেওয়ার ৪৮ ঘণ্টা পর এলাকায় প্রবেশ করুন।

সতর্কতা ঃ এই লেবেল / লিফলেটে নির্দিষ্ট ভাবে লিখিত শস্য ছাড়া অন্য কোন শস্যে এই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না।

Bengali

କାର୍‌ଟପ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୪% ଦାନା ଗ୍ରାନୁଲ୍‌ସ

କ୍ରିଟାପ® ୪ଜି

(କୀଟନାଶକ)

କ୍ରିଟାପ୍ ୪% ଗ୍ରାନୁଲସ୍ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ପତ୍ରମୋଡ଼ା ଏବଂ ଧାନର ହଳି ମରାଙ୍କ ବା କାଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ବୁଡିଆଣୀ ବସା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କୀଟନାଶକ । ଏହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୀଟନାଶକଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପূର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା କୀଟ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ପାଇଁ ଆୟତ୍ତ କରିଥାଏ । ଏହା ଉପକାରୀ କୀଟମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ ତଥା ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷକ୍ରିୟା-ରହିତ ।

ରାସାୟନିକ ମିଶ୍ରଣ :

କାରଟାପ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ (ଏ.ଆଇ.) (ସର୍ବନିମ୍ନ ଶୁଦ୍ଧତା ୯୮%)	୪.୦୦% ଡବ୍ଲୁ/ଡବ୍ଲୁ
ଇସୋପ୍ରୋପାଲ୍ ଏସିଡ୍ ଫସ୍‌ଫେଟ୍	୧.୦୦% ଡବ୍ଲୁ/ଡବ୍ଲୁ
ଫସଫରିକ ଏସିଡ୍	୦.୫୦% ଡବ୍ଲୁ/ଡବ୍ଲୁ
ଏନ୍‌ପି–୮୫ କିମ୍ବା ସମାନଭାବେ	୧.୫୦% ଡବ୍ଲୁ/ଡବ୍ଲୁ
ଚାଇନା କ୍ଲେ–କାଓଲିନ୍	୫.୦୦% ଡବ୍ଲୁ/ଡବ୍ଲୁ
ବାଲି	କିଉ.ଏସ୍ ୧୦୦ କରିବା ପାଇଁ
	ମୋଟ : ୧୦୦.୦୦% ଡବ୍ଲୁ/ଡବ୍ଲୁ

ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି :

ଶସ୍ୟ	କୀଟର ସାଧାରଣ ନାମ	ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ମାତ୍ରା ଏ.ଆଇ. (ଜି /%)	ସୂତ୍ର (କେଜି)	ପାଣିରେ ଦ୍ରବଣ (ଲିଟର)	ଶେଷ ସିଞ୍ଚନ ଏବଂ ଫସଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମିଆଦ (ଦିନରେ)
ଧାନ	ଜାଉବିନ୍ଧା	୭୫୦	୧୮.୭୫୦	*	—
	ପତ୍ରମୋଡ଼ା	୭୫୦–୧୦୦୦	୧୮.୭୫୦–୨୫,୦୦୦	*	—
	ହଳିମରା	୭୫୦–୧୦୦୦	୧୮.୭୫୦–୨୫,୦୦୦	*	—

*ଏପରି ବ୍ୟବହାରରେ ମାଗ୍ରାର ଫର୍ମୁଲେଶନ ବଢ଼େଇନାହିଁ ।

ଗଛ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ :

ଗ୍ରାନୁଲ୍ ଆପ୍ଲିକେଟର କିମ୍ବା ହାତରେ ରବର ଦସ୍ତାନା ପିନ୍ଧି ବିଞ୍ଚିବେ ।

ସାବଧାନତା :

୧। ଗୋଳାଉଥିବା ବେଳେ ଝରିପଡ଼ିବା ବା ଛିଟିକି ପଡ଼ି ତ୍ୱଚାରେ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ନ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ଖାଲି ହାତରେ ଗୋଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

୨। ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସାବଧାନତାମୂଳକ ପୋଷାକ ଯଥା ରବର ଗ୍ଲୋଭସ୍, କିମ୍ବା ମୁହଁ ମୁଖା ଦ୍ୱାରା ଗୋଡ଼ାଇ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଗୋଡ଼ିପ୍ ପୁରାପୁରି ରବର ଆପ୍ରନ ତୁଡ୍ କିମ୍ବା ଟୋପି ରହିବା ଦରକାର ।

୩। ଲୋ ଏବଂ ଅଳ୍ପଚ୍ଚା ଲୋ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଭଲ୍ୟୁପ୍‌ମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହାଇ ଜନରେସନ୍‌ସ୍ପ୍ରେଶନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବିପଦଜନକ । ଏଣୁ ଏପରି କରିବେ ନାହିଁ ।

ବିଷକ୍ରିୟାର ଲକ୍ଷଣ :

ବାନ୍ତି ଦେଖାଇବା, ଦେହସାରା କମ୍ପନ, ଲାଳ ଚାଟିବା, ପେଶୀ ସଙ୍କୋଚନ, ଅଚାର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ମ୍ୟାରିଆସିସ୍ ।

ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା :

ଯଦି ଆଖି ଦୂଷିତ ହୁଏ, ପ୍ରଚୁର ପାଣିରେ ଧୁଆ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଗିଳି ଗଳାର ପଛପଟକୁ ଟିକ କରି ଛାଡ଼ିଦିଅ । ରୋଗୀ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ବାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ।

ପ୍ରତିଷେଧ :

ଏଲ-କ୍ରାଇଷ୍ଟାଇନ୍-ର ଏଣ୍ଟ୍ରାଭେନାସ ୧୦୦ରୁ ୨୦୦ ମିଲି କିମ୍ବା ବାଲ୍ (ଡାଇମର ଦ୍ୱାପ୍‌ରୋଲ କିମ୍ବା ୨ରୁ ୩ – ଡାଇମର କେପଟ୍ରୋ ପ୍ରୋପାନଲ୍) ୨୦ ରୁ ୬୦ ମିଗ୍ରା ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି ।

ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ଜନ :

୧। ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀ ବା ବଳକା ମିଶ୍ରିତ କୀଟନାଶକ ଏବଂ କୀଟନାଶକ ପାତ୍ରାବିର ଧୌତ ଦୂଷିତ ପାଣିକୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ, ଯେପରି ପରିବେଶ ବା ପାଣି ଦୂଷଣ ନହୁଏ ।

୨। ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀର ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଙ୍ଗୁଡ଼ିଃ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

୩। ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଜନବସତିଠାରୁ ଦୂରରେ ନେଇ ଭାଙ୍ଗି ପୋତିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

**କୀଟନା

கார்டாப் ஹைட்ரோக்ளோரைட் 4% கிரேனியூல்ஸ்

கிரிடாப்® 4G

(பூச்சி கொல்லி)

கிரிடாப் 4% G, தண்டு துளையான் இலை மடிப்பான் அரிசியில் சுருள் மேக்கட் போன்றவற்றில் உயர்ரக விளைவுதரும் ஒரு பூச்சி கொல்லி. மற்ற பூச்சி கொல்லிகளை ஒப்பிடும்பொழுது இதன் செயல்பாடு வேறு விதமாய் இருக்கும். இது நீடித்து இருக்கும் சக்தியுடன் பூச்சிகளின் எல்லா படிகளையும் கட்டுப்படுத்துகிறது. பூச்சிகளின் இயற்கை எதிரிகள் மீது எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுத்துவதில்லை மற்றும் குட்டி போடும் ஜந்துக்களுக்கு இது விஷமாவதில்லை.

ரசாயனக்கலவை :

கார்டாப்ஹைட்ரோக்ளோரைட் a. i. (குறைந்த பட்ஷ தூய்மை 98%)	4.00% w/w
ஐஸோப்ரோபைல் ஏசிட் ஃபாஸ்பேட்	1.00% w/w
பாஸ்பரிக் ஏஸிட்	0.50% w/w
NP-85 அல்லது ஈடாக	1.50% w/w
சைனா களிமண் (கேவோலின்)	5.00% w/w
மண்	q.s. 100 ஆவதற்கு
மொத்தம் :	100.00% w/w

பரிந்துரைகள் :

பயிர்	பூச்சியின் பொது பெயர்	அளவு பிரதி ஹெக்டருக்கு			காத்திருக்கும் காலம் கடைசி ஸ்பிரே முதல் அறுவடை நாள் வரை இடைவெளி (நாட்கள்)
		எ.ஐ. (கி/%)	சூத்திரம் (கிலோ)	தண்ணியில் (லிட்டர்கள்)	
அரிசி	தண்டு துளையான்	750	18.750	*	–
	இலைமடிப்பான்	750-1000	18.750-25.000	*	–
	சுருள் மேக்கட்	750-1000	18.750-25.000	*	–

★ சூத்திரம் அப்படி இருப்பதால் எழுவதில்லை

பயிர் பாதுகாப்பு உபகரணம் :

கிரேனியூல் அப்ளிகேட்டர் அல்லது கை உறை அணிந்து வியாபித்தல்.

முன்னெச்சரிக்கை :

1) கலவையின் பொழுது சிந்துதலாலோ தெளிப்பதாலோ சுவாசிப்பதையோ சருமத்துடன் தொடர்பு ஏற்படுவதையோ தவிர்க்கவும். வெறும் கையால் கலக்க வேண்டாம்.
2) உபயோகிப்பவர் முழுவதும் பாதுகாப்பு தரும் உடுப்புடன் ரப்பர் கையுறை அணியப்பட்டு முகம் மாஸ்கினால் மறைக்கப்பட்டு ரப்பரினாலான மேலங்கி அல்லது தொப்பி அணியவேண்டும்.
3) குறைந்த அல்லது மிகக்குறைந்த தெளிக்கும் உபகரணம் மூலம் அதிக அளவு திகட்டு பிரயோகம் அபயகரமானது. ஆதலால் தவிர்க்கப்படவேண்டும்.

விஷமேறியதன் அறிகுறி :

வாந்தியுணர்ச்சி, உடல் அதிக அளவில் நடுக்கம்,உமிழ்நீர் வருவது, ஸ்பாஸ்மா, டிஸ்பியா, மையாரியாஸிஸ்.

முதலுதவி :

கண்கள் மாசுபட்டால், ஏராளமான தண்ணீரில் கழுவவும். விழுங்கினால், தொண்டையின் பின்பகுதியில் சுச்சப்படுத்துவதன் மூலம் தவிர்க்கவும். நோயாளி சுயநினைவின்றி இருந்தால் வாந்தி எடுக்க வேண்டாம். ஒரு மருத்துவரை அழைக்கவும்.

மாற்று மருந்து :

100-200 எம்.ஜி ஃ டகிரில்டைன் ஊசியோ அல்லது 24-60 எம்.ஜி BAL (டிமர்கேப்ரால் அல்லது 2,3 -டிம்பாகேப்டோ ப்ரொபோனால்) பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

உபயோகமான பெட்டிகளை களைவது :

1) உபயோகமான பேக்கெட்டுகள், எஞ்சிய பொருட்கள் மற்றும் பூச்சிமருந்தை கலந்த பாத்திரங்கள் சுற்றுப்புறத்திற்கும் தண்ணீருக்கும் களங்கம் ஏற்படாதவாறு களையப்பட வேண்டும்.
2) உபயோகப்படுத்தப்பட்ட பேக்கெட்டுகள்அவை மறுபடியும் உபயோகம் ஆவதை தடுக்க வெளியே விட்டு வைக்கப்படக் கூடாது.
3) பேக்கேஜ்கள் உடைக்கபட்டு மனித நடமாட்டம் இல்லாத இடங்களில் புதைக்கப்பட வேண்டும்.

சேகரித்து வைக்கும் நிபந்தனைகள் :

1) பூச்சி மருந்து கொண்ட பேக்கேஜ்கள் தனிப்பட்ட இடத்திலோ அல்லது அறையிலோ மற்ற பொருட்கள், குறிப்பாக உணவுப் பொருட்கள் வைக்கப்பட்டு இருக்கும் இடத்திலிருந்து தள்ளி தனிப்பட்ட அலமாரிகளில், பூச்சி கொல்லியின் அளவு மற்றும் குணத்திற்கு ஏற்றவாறு பூட்டப்பட்டு வைக்கப்படவேண்டும்.
2) பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை சேகரித்துவைக்கும் அறையோ அல்லது இடமோ வெளிச்சத்துடன் நன்கு கட்டப்பட்டு, காய்ந்து குளுமையாக, காற்று வசதியுடன் போதிய பரிமாணத்தில் நீராவியுடன் தொடர்பு ஏற்படாதவாறுஷ் இருக்கவேண்டும்.

பிரதியேக மறு நுழைவு காலம்: 48 மணி நேரம்.

எச்சரிக்கை: லீஃப்லெட்டில் கூறியது தவிர வேறு எந்த பயிரிலும் பிரயோகம் செய்வது கூடாது.

Tamil

క్యార్‌ట్యాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 4% గ్రాన్యూల్స్

క్రిట్యాప్® 4జి

(క్రిమినాశని)

క్రిట్యాప్ 4% గ్రాన్యూల్స్ వరిపై బోదెవిధ్రకాలు, ఆకుమడత, వొర్ల్ మగ్గాట్‌లను అరికట్టగల శక్తివంతమైన క్రిమినాశని. ఇది ఇతర క్రిమినాశనిలా కాకుండా, మరో రకం చర్య కలిగినది. ఇది అన్ని అంచెలలోనూ, అత్యంత ఫలితాన్నందిస్తూ, పురుగులను అరికట్టుతుంది. ప్రకృతిపరంగా పురుగులను అరికట్టువాటిపై ప్రభావం చూపదు. పిండుడు జంతువులకు హానికరంకాదు.

రసాయనిక కూర్పు :

క్యార్‌ట్యాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్. ఎ.ఐ. (కనీస శుద్ధత 98%)	4.00% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
ఐసోప్రోపిల్ ఆసిడ్ ఫాస్ఫేట్	1.00% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
ఫాస్ఫారిక్ ఆసిడ్	0.50% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
ఎన్‌పి – 85 లేదా దానికి సమానమైనది	1.50% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
చైనాక్లే - కావోలిన్	5.00% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
ఇసుక	క్యూ.ఎస్. 100 చేయడానికి తగినంత
మొత్తం :	100.00% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు

సిఫార్సు :

పంట	కీటకము యొక్క పాడు నామము	హెక్టారుకు తగిన మోతాదు			చివరి స్ప్రే మరియు పంట దోసుటకి మధ్య ఉండవలసిన సమయం(రోజులలో)
		ఎ.ఐ. (జి/%)	కూర్పు (కెజి)	నీటిలో నలుపుచేయుట (లీ.)	
వరి	బోదె ఛిద్రకం	750	18.750	*	–
	ఆకు మడత	750–1000	18.750–25.000	*	–
	వర్ల్ మగ్గాట్	750–1000	18.750–25.000	*	–

* ఫార్ములేషన్‌ను ఉన్నట్లుగానే వాడవలెను కావున అవసరం లేదు.

మొక్కను సంరక్షించే సాధనం :

గ్రాన్యూల్ అప్లికేటర్ లేక రబ్బరు తొడుగులు ధరించి చేతితో విస్తరింప చేయుట.

తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు :

1. పీల్చరాదు, పలువన చేయు సమయంలో చిందులు, పార్లిపోవడంచలన చర్మానికిమాత్రం తగలనివ్వకండి. చేతులకు రక్షణ లేకుండా కలపకండి.
2. ఈ మందు వాడే వారు, రబ్బరు తొడుగులతో సహా రక్షకదుస్తులు, మొఖానికి మాస్క్ మరియు ఒక ఓవర్‌ఆల్ లేదా రబ్బరు అప్రాన్ లేక టోపీ తప్పక ధరించవలెను.
3. తక్కువ లేక అతి తక్కువ విస్తారం, ఎక్కువ గాఢత్వంతో సాధనం వాడుక అపాయకరమైనది, కావున అటుల వాడరాదు.

రోగి లక్షణాలు :

వాతి వచ్చేటట్లుండటం, అంగాలు లేక శరీర కంపనం, ఉమ్మి రావడం, స్పాస్మా, డైస్పేయా మరియు మయారియాసిస్.

ప్రథమ చికిత్స :

కళ్ళు కలుషితమైతే, పుష్కలంగా నీటితో శుభ్రం చేసుకోండి. మింగివేసినట్లయితే, గొంతు వెనుక భాగంలో చక్కిలిగింతలు పెట్టడం ద్వారా వదిలివేయడాన్ని ప్రేరేపించండి. రోగి అపస్మారక స్థితిలో ఉంటే వాంతిని ప్రేరేపించవద్దు. వైద్యుడిని పిలవండి.

విరుగుడు :

ఎల్–క్రిస్టియన్ 100 – 200 ఎమ్‌జి ఇంట్రావీనస్ ఇన్‌జక్షన్ ద్వారా లేక 20–60 ఎమ్‌జి బిఎఎల్ (డైమర్‌క్యాప్రాల్ లేదా 2, 3 డైమర్‌క్యాప్రో ప్రాపానాల్) ఇంట్రామస్క్యులర్ ఇంజక్షన్ ద్వారా పుచ్చుకొనమని సిఫార్సు చేయబడుతున్నది.

వాడిన కంటెయినర్లు పారవేయు విధానం :

1. పరిసరప్రాంత కాలుష్యం మరియు నీటికాలుష్యంను అరికట్టడానికి, వాడిన ప్యాకేజీలు మరియు మిగిలిన సరుకులు, క్రిమినాశక మందులు మరియు కంటెయినర్లు కడిగిన నీరును సురక్షితంగా పారవేయవలెను.
2. వాడిన ప్యాకేజీలు తిరిగి వాడబడకుండా బయట వదిలిపెట్టరాదు.
3. ప్యాకేజీలు పగులగొట్టి వాడుకకు అలవికాకుండా పాతిపెట్టవలెను.

నిలువ :

1. క్రిమినాశనిగల ప్యాకేజీలు, ముఖ్యంగా తిండిపదార్థాలకు దూరంగా విడివిడి గదులలో లేక ప్రెమిసెస్ నందు, మిగతా పదార్థాలను నిలువచేయుటను వాడబడే గదులకు దూరంగా నిలవ చేయవలెను. ప్రత్యేక అలమారులలో తాళంవేసి వాటి పరిమాణం మరియు క్రిమినాశని యొక్క తరహా ననుసరించి జాగ్రత్త చేయవలెను.
2. క్రిమినాశనిలను భద్రపరచే స్టోర్‌రూమ్‌లు, ప్రెమిసెస్ వెలుతురు బాగుగా కలిగి, చక్కగా కట్టబడి, పొడి, చల్లని, గాలి ప్రసరింప చేసే విధంగా కట్టబడాలి. ఇంతేగాక, ఆవిరితో కలయిక పనికిరాదు.

పీచికారి చేసిన పిదప ప్రవేశించు వ్యవధి : 48 గంటలు

హెచ్చరిక : లేబల్/లీఫ్‌లెట్‌లో పేర్కొనిన పంటలకు కాకుండా ఇతర పంటలకు దీనిని వాడకూడదు.

Telugu

कारटाप हाईड्रोक्लोराईड 4% दानेदार

क्रिटैप® 4 जी

(कीटनाशक)

कारटाप हाईड्रोक्लोराइड 4% दानेदार धान पर होने वाले करने वाले तना छेदक, पत्ता मोड़क और चक्कर (होरल) मैगट का नियंत्रण में बहुत प्रभावकारी है। इस कीटनाशक का प्रभाव अन्य कीटनाशकों से भिन्न है। कारटाप कीटों के सभी अवस्थाओं को नियंत्रण करता है और कारटाप का प्रभाव जारी काफी समय तक रखता है। प्राकृतिक नियंत्रण कीटों पर इसका कोई असर नहीं होता है और स्तनधारी जानवरों के लिये यह विषैला नहीं है।

रासायनिक संयोजन :

कारटैप हाईड्रोक्लोराईड, स.त. (न्यूनतम शुद्धता 98%)	4.00% व/व
आइसोप्रोपिल ऐसिड फॉस्फेट	1.00% व/व
फॉस्फोरिक ऐसिड	0.50% व/व
एन पी–85 अथवा समकक्ष	1.50% व/व
चीनी मिट्टी – कायोलिन	5.00% व/व
रेत	अनुपातके अनुसार
योग :	100.00% व/व

सिफारिश :

फसल	कीटक का सामान्य नाम	प्रति हेक्टर खुराक			प्रतीक्षा का समय पिछले स्प्रे से लेकर फसल तैयार होने तक (दिनों में)
		सक्रिय तत्व मात्रा(ग्राम/%)	संरचना (कि.ग्रा.)	पानी की तनुकृत (लीटर)	
धान	तना छेदक	750	18.750	*	–
	पत्तो मोड़क	750-1000	18.750-25.000	*	–
	चक्कर मैगट	750-1000	18.750-25.000	*	–

*संयोजन का प्रयोग एसा ही होता है इसलिये पानी की आवशयकता नहीं है।

पौध सुरक्षा यंत्र :

दानेदार लगाने का उपस्कर या दस्ताने पहने हुए हाथ से बबिखोरना।

सावधानियाँ :

1. प्रयोग का समय मिलाते वक्त त्वचा दूषित न होने दें। धुंध को सांस द्वारा अन्दर न लें। नंगे हाथों से न मिलावे।
2. प्रयोगकर्ता को पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़ों जैसे रबर के दस्ताने, टोप या हैट, एपरन चौगा आदि का प्रयोग करें। प्रयोग के समय मुंह ढक कर रखें।
3. तेज मात्रा में प्रयोग के समय कम या अत्यधिक कम शक्ति या दवाब के छिड़काव यंत्रों का प्रयोग खतरनाक है। ऐसा न करें।

विष लक्षण :

ऊबकाई आना, शरीर में कंपन, लार गिरना, मांस पेशियों में ऐंठन, बदहजमी व गठिया।

प्राथमिक चिकित्सा :

आखों के दूषित होने पर तुरन्त साफ पानी से अच्छी तरह धोयें। निगलने पर गले के पीछे गुदगुदी कराकर उल्टी करायें। अगर रोगी बेहोश हो तो उल्टी न करायें। डाक्टर को तुरन्त बुलायें।

विष बाधा :

100-200 मिग्रा. एल–क्रिस्टन नसों में इंजेक्शन द्वारा या 20-60 मिग्रा. बी ए एल (डाइमकैपरोल या 2,3–डाइमर्काप्टो प्रोपनोल) मांस पेशियों में इंजेक्शन द्वारा दें।

खाली डिब्बों का निपटारा :

1. डिब्बों को तोड़कर आबबादी से दूर जमीन मे गाढ़ दें।
2. खाली डिब्बों का दुबारा प्रयोग रोखने के लिये उन्हें बाहर न फेंकें।
3. खाली डिब्बे, कीटनाशकों व डिब्बों का निपटान सावधानी पूर्वक करें जिससे जल वा वायु प्रदूषण न करें।

कीटनाशक का रखरखाव :

1. कीटनाशकों के पैकेजों को अलग कमरों या अलग परिसरों में रखना चाहिए। अन्य पदार्थों विशेष कर खाद्य पदार्थों से दूरी पर स्थित होना चाहिए एवं कीटनाशक के परिमाण और वह किस प्रकार का है उसके अनुसार उसे अलग से अलमारी में ताला बंद करके रखा जाना चाहिए।
2. स्टोर कमरे या परिसर जहाँ पर कीटनाशक रखे जाते हैं वहाँ पर अच्छी रोशनी होनी चाहिए तथा वह स्थान अच्छी तरह से निर्मित हो,सूखा हो, ठंडा हो, हवा का आवागमन और पर्याप्त आयतनयुक्त हो जिससे आर्द्रता के कारण वह स्थान दूषित न हो सके।

छिडकाव के ४८ घंटे बाद क्षेत्र में प्रवेश करें।

चेतावनी: लेबल/लीफलेट में दी गयी फसलों के अलावा अन्य फसलों व कीटों पर इसका उपयोग न करें।

Hindi

Cartap Hydrochloride 4% Granules

KRITAP® 4G

(Insecticide)

Cartap Hydrochloride 4% granules is highly effective insecticides for the control of stem borer, leaf folder and whorl maggot on rice. It has a quite different mode of action from that of other insecticides. It controls all stages of insects with a prolonged efficacy. It has no effect on natural enemies of insect pests and is practically non-toxic to mammals.

Chemical composition :

Cartap hydrochloride, a.i. (min. purity 98%)	4.00% w/w
Isopropyl acid phosphate	1.00% w/w
Phosphoric acid	0.50% w/w
NP-85 or equivalent	1.50% w/w
China clay - Kaolin	5.00% w/w
Sand	Q.S to make 100
Total :	100.00% w/w

Recommendations :

Crop	Common name of the Pest	Dosages per Hactare				Waiting period between last spray and harvest (days)
		a.i. (gm/%)	Formulation (kg)	Dilution in water (ltrs)		
Rice	Stem Borer	750	18.750		*	–
	Leaf Folder	750-1000	18.750-25.000		*	–
	Whorl Maggot	750-1000	18.750-25.000		*	–

* Does not arise as the formulation is used as such.

Plant protection equipment :

Granule applicator or broadcasting by hand wearing rubber gloves.

Precaution :

1. Avoid inhalation and skin contact while diluting because of spillages or splashes. Do not mix with bare hands.
2. The user should use full protective clothing which includes rubber gloves, either face should be covered with mask and an overall or rubber apron hood or hat.
3. Use in high concentration with low and ultra low volume application equipment is dangerous and should be avoided.

Symptoms of poisoning :

Nausea, trembling of extremities and body, salivation, spasma, dyspeea and myariasis.

First Aid :

If eyes are contaminated, flush with plenty of water. If swalllowed induce omitting by tickling the back of throat. Do not induce vomitting if the patient is unconscious. Call a physician.

Antidote :

An intravenous injection of 100-200 mg of L-Crystaine or an intramuscular injection of 20-60 mg of BAL (dimercaprol or 2,3-dimercapto propanol) are recommended.

Disposal of used container :

1. Used packages or surplus materials and washings of the insecticides and containers shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage conditions :

1. The packages containing the insecticides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly food articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and the nature of the insecticides.
2. The store rooms or premises for storing the insecticides should be well lit, well built, dry, cool, ventilated and of sufficient dimensions, to avoid contamination with vapour.

Optimal re-entry period : 48 hrs.

Caution: Not to be used on Crops other than specified on this Label/Leaflet.

English

Read Instructions Leaflet before use

उपयोग से पहले निर्देश पत्रिका पढ़े।

For Agricultural use only

केवल कृषि उपयोग के लिए

Store in a cool, dry and well ventilated place.

ठंडी, सूखी और अच्छी तरह हवादार जगह में संग्रह करें।

Cartap Hydrochloride 4% Granules

KRITAP® 4G

(Insecticide)

कारटैप हाइड्रोक्लॉराइड 4% ग्रेनुअल

क्रिटैप® 4 जी

(कीटनाशक)

CIR-27, 856/98/CARTAP HYDROCHLORIDE (GR)-86

TRADITION • INNOVATION • TRUSTEESHIP

KRISHI RASAYAN GROUP

SINCE 1966 IN AGROCHEMICALS

Manufactured and Marketed By:

KR Lifesciences Pvt. Ltd.

29, LALA LAJPAT RAI SARANI,
KOLKATA - 700 020, INDIA
E-mail : kr@krishirasayan.com

निर्माता एवं विपणनकर्ता :

केआर लाईफसाईन्सेस प्रा.लि.

29, लाला लाजपत राय सारनी, कोलकाता – 700020

For manufacturing unit address see first three characters of batch no. and see below :

KRR :

Maitapur, P.O. Ranital, Balasore,
Orissa, PIN - 756 111
Mfg. Lic. No. e-Lic/INSECTI/MAN-PP-2

KRK :

Joykrishnapur, P.O. Bonhoogly II
Sonarpur, South 24 Parganas,
West Bengal, PIN - 700 103
Mfg. Lic. No. MPP/ILC/145/K-2

Customer Care Detail :

KR LIFESCIENCES PVT. LTD.

29, Lala Lajpat Rai Sarani, Kolkata - 700 020
Toll Free No. : 18001211800

email : customercare@krishirasayan.com

Not to be used on crops other than specified on this leaflet

DANGEROUS TO RE-USE EMPTY CONTAINERS/PACKAGES