ಎಲ್ಒಸಿ 5% ಇಸಿ

ಲ್ಯಾಂಬ್ಲಾ ಸೈಲೋಥ್ಸಿನ್ 5% ಇಸಿ ಇದು ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಹೊಟೆ-ನಟಿಸುವ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಹತ್ತಿ, ಭತ್ತ, ಬದನೆ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕೀಟಗಳಾದ ಬೊಲ್ರರ್ಮ್, ಬೂದಿ ಹುಳುಗಳು. ಬೂದಿ ಹುಳುಗಳು. ಎಲೆ ಹಾಪರ್ಗಳು ಮತು ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಕೊರೆಯುವ ಕೀಟಗಳ ವಿರುದ್ದ ಸಿಂಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಿಫಾರಸುಗಳು:

		ಡೋ	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪರಚನೆ ಮತು		
ಬೆಳೆಗಳು	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಎಐ (ಗ್ರಾಮ್)	ಸಂಯೋಜನೆ (ಮಿ.ಲೀ.)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸು ವಿಕೆ (ಲೀ.)	ಕೊಯಲಿನ ನಡುವಣ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
ಹತ್ತಿ	ಕಾಯಿಕೊರಕಗಳು,	1525	300500	400600	21
_	ಜಸ್ವೀಡ್	1525		400600	21
	สมโสที่ยัง	1525		400600	21
प ृष्टु	ಎಲೆ ಮುರುಟುಗೆ, ಕಾಂಡ ಕೊರಕ, ಹಸುರೆಲೆ ಜೆಗಿ ಹುಳು, ಗಾಲ್ ಮಿಡ್ಡ್ ಮಸಿಗಳು, ಬಿಹಿಎಚ್, ಡಬ್ಲ್ಯುಬಿಹಿ ಎಚ್, ಒರಿ ಎಲೆ ಸುರುಳಿ ಕೀಟ	12.5	250	400600	15
ಬದನೆ	ಚಿಗುರು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಕೊರಕ	15	300	400600	4
ಚೊಮೆಟೊ	ಕೊರಕ	15	300	400600	4

ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಗಳು: ಸಸ್ತ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣ: ಬಕೆಟ್ ಸೇಯರ್, ರಾಕಿಂಗ್ ಸೇಯರ್, ಸಿರ್ಅಪ್ ಪಂಪ್ ಸೇಯರ್ (ಸಿಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್), ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ನೇಯರ್, ಫೂಟ್ ಸ್ನೇಯರ್, ವೀಲ್ ಬಾರೋ ಸ್ರೇಯರ್, ಕಂಪೈಷನ್ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ರೇಯರ್, ಕಂಪೈಷನ್ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲಾಟರಿ ಅಥವಾ ಆಸೀ ಎಚ್ಟ್ ಟಿಪ್ಪಿ ಪ್ರವರ್ ಸೇಯರ್.

ಎಚರಿಕೆ: 1. ಆಹಾರ ವಸು ಬರಿದಾದ ಆಹಾರದ ಕಂಟೇನರ್ ಮತು ಪಶುಗಳ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿರಿ. 2. ಕಣು, ಬಾಯಿ ಮತು ತಚೆಯ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿ. 3. ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಭಾಷ್ಟವು ಉಸಿರಾಟವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕಿಗೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿರಿ. 4. ಸಿಂಪಡಣೆ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕೊಳೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದು ತಗಲಿರುವ ಶರೀರದ ಭಾಗವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. 5. ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಧೂಮ್ಯಪಾನ, ಕುಡಿಯುವುದು, ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಜಗಿಯುವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. 6. ಸಿಂಪಡಣೆ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ಲಣ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂರಕಕ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದರಿಸಿರಿ.

ಸಸ್ತ ವಿಷಕಾರಿತ್ತ: ಹೊಲದ ಶಿಫಾರಸಿಗೆ ಅನುಸಾರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಈ ಉತಾದನೆಯು ಸಸ್ಯ ವಿಷಮಯವಲ್ಲ.

ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: 1. ದುರ್ಬಲತೆ, ಉತ್ತಂಠತೆ, ಕಂಪನ, ಅಪಸ್ಕಾರ, ತ್ವಚೆಯ ಅಲರ್ಜಿ, ಸೀನುವಿಕೆ, ನಗಡಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಉಪಚಾರ : 1. ಹೊಟೆಯೊಳಗೆ ಹೋದರೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ದೃವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ. 2. ಬಟೆ ಮತ್ತು ತ್ತಚೆಗೆ ತಗಲಿದರೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಿರಿಸಿ, ತಗಲಿದ ತ್ರಚೆಯನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತು ನೀರು ಹಾಕಿ ತೊಳಿಯಿರಿ. 3. ಕಣುಗಳಿಗೆ ತಗಲಿದೆರೆ ಹೇರಳ ಸಲಿನ್/ನೀರನು 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಎರಚಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 4. ಉಸಿರಾಟದಲಿ ಸೇರಿದರೆ ರೋಗಿಯನ್ನು ಸ್ಪಚ್ಚ ಹವೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಮಿರಿ.

. ಔಷದೋಪಚಾರ : ನಿಶ್ರಿತ ವಿಷಹಾರಿ ಗುರುತಿಲ್ಲ . ಲಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಚಿಕಿತೆ ಮಾಡಿರಿ. ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಆ್ಯಂಟಿ ಹಿಸಾಮೈನ್ ಕೊಡಬಹುದು.

. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕಂಟೇನರ್ಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ : 1. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಥವಾ ಬಾಕಿಯುಳಿದ ವಸು ಮತು ತೊಳೆದ ಕೀಟನಾಶಕ ಹಾಗೂ ಕಂಟೇನರ್ಗಳನು ಪರ್ಯವರಣ ಮತು ನೀರು ದೂಷಿತವಾಗದಂತೆ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು. 2. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪ್ರಾಕೇಜನ್ನು ಹೊರಗೆ ಇಡಬಾರದು ಮತು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. 3. ಪ್ರಾಕೇಜನ್ನು ಮುರಿದು ಜನನೆಸತಿಯಿಂದ ದೂರ ಹುಗಿದುಬಿಡಬೇಕು

ಸಂಗ.ಹಣೆಯ ನಿಯಮಗಳು : 1. ಕೀಟನಾಶಕದ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿರಿಸಿ, ಬೀಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಕೀಟನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವಿಧಾನವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು. 2. ಕೀಟನಾಶಕ ಸಂಗ.ಹಿಸಿಡುವ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಕಟಡದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕಿದು ಗಟಿಮುಟು, ಒಣ, ತಂಪು ಗಾಳಿ ಅಡ್ಡಾಡುವಂತಿದ್ದು, ವಿಸಾರವಾಗಿರಬೇಕು. ಬೆರಕೆಯಾಗಿ ಭಾಷವಾಗುವುದನ್ನು ತಪಿಸಬೇಕು.

ಸಂಯೋಜನ :			
ಲ್ಯಾಂಬ್ಯಾಸಿಹ್ಯಾಲೊ	ి థ్కినో ఎ.ఐ.	5.000%	w/v
ಕ್ರೆಸ್ಲಾಕ್ಸ್ ಎ.ಇ. 4	ಕ್ಕಾಲ್ತಿಯಂ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಉಪ್ಪು ಬೆನ್ನೀನ್		
	ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ 20%, ಅಲೈ ೈಲ್ ಫೌನೋಲ	f	
	ಇಥೋಕ್ತಿಲೇಟ್ 57% ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಫೆಂಟ್		
	(ಮೆಥನಾಲ್, ಇಸೊಬ್ಬುಟನಾಲ್ ಮತ್ತು		
	ಅರೋಮೆಕ್ 23%)	7.000%	w/v
ಕ್ರೆಸ್ಲೊಕ್ಸ್ ಎ.ಇ.5	ಕ್ಯಾಲ್ಡಿಯಂ ಆಲ್ಕೈಲ್, ಉಪ್ಪು ಬೆನ್ಜೀನ್		
	ಸಲ್ಪೋನೇಟ್ 36% ಆಲೈಲ್ ಫೆನೋಲ್		
	ಇಥೋಕಿಲೇಟ್34% ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಫೆಂಟ್		
	(ಮೆಥನಾಲ್, ಇಸೊಬ್ಬುಟನಾಲ್ ಮತ್ತು		
	ಅರೋಮೆಕ್ 30%)	3.000%	w/v
ಸಾಲ್ವೆಂಟ್	**		
(ಆರೋಮೆಕ್)		ಕ್ಕು .ಎಸ್.	w/v

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮರು-ಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿ: 48 ಗಂಟೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಸಸ್ಯನಾಶಕವನ್ನು ಲೇಬಲ್ / ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷಪಡಿಸಿದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

2-830 100,000% w/w

Kannada

లాంజ్డా సైలోథిన్ 5% ఇస్ ఎల్ఓసి 5% ఇ సి (కీటకనాశిని)

లాంటా సెల్ఫోథిన్ 5% ఇసి ఇది పత్తి, వరి, వంకాయ మరియు బొమాబో పంటలప వివిధ రకాలెన పురుగులు, కాయతొలుచు పురుగులు, కాయతోలుచు పురుగులు, ఆకు పురుగులు మరియు కాండం మరియు పండ తొలుచు పురుగులకు వంతిరేకంగా పిచికారీ BOXXXXXX

22-20XX22022

		320	హెకాదు/హెక్టారుకు		
సంట	తెగులు మామూలు పేరు	ఎ.జ. (గ్రాములు)	పూరీకరణ (మీ.రీ.)	కలపబడిన వీళ్ళు (లీటర్లు)	మధ్య కేవి పుందనేందీన సమయం (రోజుల్లో)
රුමු	కాయతొలుసు పురుగులు	1525	300500	400600	21
	పచ్చెదోమ	1525		400600	21
	తామర పురుగులు	1525		400600	21
వరి	ఆకుముడత, కాండం, తొలును పురుగు, పద్వలోను, గాల్ మెడ్డ్, థ్రస్స్, బిసిహెచ్, డబ్యుబిసిహెచ్, వరల్ మాగట్	12.5	250	400600	15
వంకాయ	కాండం మరియు కాయ తొలుచు	15	300	400600	4
టెమాటో	పురుగు	15	300	400600	4

వాడటానికి మాదవలు : సస్ట్లు సరికరాలు : బకెట్ స్ట్రీయర్, రాకింగ్ స్ట్రీయర్ స్పిరప్ పంప్ స్ట్రీయర్ (సింగిల్ మరియు డబుల్ సీసా), వ్యాప్స్టాక్ స్ట్రీయర్, ఫుట్ స్పీయర్, ఏల్బారో స్పీయర్, కంప్రెషన్ వ్యాప్స్టాక్ బ్యాటరి రేదా ఆస్పీ హెచ్టిస్ట్ పవర్ స్ట్రేయర్

ముందు జాగత్తలు: 1. ఆహార పదార్వాలు, ఖాళీ వంట పాత్రలు మరియు పశు గాసానికి దూరంగా ఉంచండి. 2. నోటిలో, కళ్ళలో మరియు శరీరానికి అంటుకోకుండా చూచుకోవాలి. 3. (స్పే తుంపరలను పీల్చడం చేయవద్దు. గాలి వీవే దిశవెపుకు మాత్రమే స్ప్రే చేయండి. 4. స్ప్రే వేసిన తరువాత కలుప్రీతమైన దుస్తులను మరియు శరీర భాగాలను బాగా శుభం చేయండి. 5. స్ట్రీ చేసీటప్పుడు పాగ త్రాగడం, త్రాగడం, వేటినెవా తినడం మరియు నమలడం చేయవద్దు. 6. (స్ప్రీ ద్రావకాన్ని కలిపేటప్పుడు మరియు (స్పీ చేసేటప్పుడు రక్షక దుసులను ధరించండి.

విష ములువము : పొలానికి సీపారసు చేసిన విదంగా నాడబడితే ఈ ఉతాందకము ఎలాంటి విష్టపభావాన్ని చూపదు.

విష లక్షణాలు : వరాల బలహీనత, కోపము, వణుకుడు, గిలగీల కొట్టుకొను, చర్మపు అలర్జీలు, తుమ్ములు, ముక్కులోంచి కారుట, ముక్కు బిగబట్టడం వంటి అకణాలు సంభవించనము

(పథము చికిత్స్ : 1. ఒకవేళ మింగినచో వాంతి (పీరేపించటం లేదా ఏదెన దావకాని) ఇవ్వడం చేయనద్దు. 2. ఒకవేళ దుస్సులు మరియు శరీరం కలుషీత్రమైనవీ దుస్తులను తీసీసీ కలుపిత్రమైన శరీరాన్ని బాగా సబ్బుతో రుద్దుతూ ఎక్కువ సీటిని పోసి కడగండి. 3. ఒకవేళ కళ్ళలో పడిన యెడల సెలెవ్/శుభమెన నీరును 10 నుండి 15 నిమిషాల వరకు కళ్ళలో ఎక్కువగా కొట్టుకొని కడుకోసండి. 4. ఒకవేళ పీలినచో రోగిని తాజా గాలిలోకి తరలించండి.

ວິ**ວັນກົນຂັນ :** ລີຽນກັນຂັດຄົນກາ ລີດີ ຮັກນິກິລິນຂັດອື່ດັນ. ອຣູຊາກອຸລົນ ພຍູ້ చికిత్వ చేయించండి. అంటిహిస్వామెన్స్ ఇచ్చినచో అలర్జీలను వివారించనచ్చును.

వాడిన డబ్బాలను పారవేయు విధానం: 1. వాడిన డబ్బాలను లేక మిగిలిపోయిన మందును మరియు పరికరాలు కడుగగా వచ్చే నీటిని సురక్షితమెన రీతిలో పారవేయాలి. ఏటి వలన పరిసరాలు లేదా ఏరు కలుపీతం కాకుండా కాపాడుకోవాలి. 2. వాడిన డబాలను తిరిగి ఏ విధంగా వాడరాదు. కనుక వాటివి బయట వదిలి పెట్టరాదు. 3. వాడిన డబ్బులను ధ్వంసం చేసి మనుష్మ సంచారానికి దూరంగా పాతిసెటనలైను.

నిలావేసే పరిసితులు: 1. ఈ కీటకనాశిని గల ప్యాకేజీలను నిల్వ చేసేటప్పుడు ఇతర పదార్థములకు అంటే మరి ముఖ్యంగా ఆహార పదార్థములకు లేదా ఆవరణాలలో గాకుండా వేరువేరు గదులు లేదా ఇంటి ఆవరణాల్లో కీటకవాశని పరిమాణాన్ని బటి సతేంక అలమారలో పెటి తాళం వేసి బిగించి మాతమే ఉంచాలి. 2. ఏటిని విల్వచేసే గదులు లేదా ఆవరణాలు మంచి గట్టి కట్టడములె, విశాలంగా, పొడిగా, మంచి గాలీ, పెలుతురూ స్థసరించేలా ఉండాలి, తద్వారా దీవి ఆవిరి వల్ల పరిసరాలు. నీరు కలుసీతం కాకుండా కాసాడుకోవచు.

రసాయన మిశ్రమం :

തോന്മ. ഗവം (ർഗ	5.5.	5.000% W/V
ఎమల్పిఫయర్స్ -		
(కెస్టాక్స్ ఎ.ఇ. - 4	20% కార్టీయమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్బెల్	
	బెంజీప్ సంఓనేట్, 57% ఆర్బైల్ ఫైనాల్	
	ຈຸຜຸຮັງອື່ຍ໌ మరియు సార్వెంట్ (23%	
	మెథనోల్, ఐసోబ్యూటనోల్ మరియు	
	ఆరోమెక్స్) ల మిశ్రమం	7.000% W/V
క్లెస్టాక్స్ ఎ.ఇ5	36% కాల్షియమ్ పాల్ట్ ఆఫ్ ఆర్బెల్	
	బెంజీవ్ సల్పోవేట్, 34% ఆర్కెల్ ఫెనాల్	
	ຊຊາຮິງອື່ຍ໌ మరియు సార్వెంట్	
	(30% మెథనోల్, ఇపోబ్యూటేనోల్ మరియు	
	ఆరోమెక్స్) ల మిశ్రమం	3.000% W/V
	 కావలిసినంత	పరిసూణం w/v
6	ముత్తం	100.000% W/V

మీ పీచికారి చేసిన పిదప (పవేశించు వ్యవధి : 48 గంటలు హెచ్చరిక : లేబల్/లీఫ్లెట్లో పేర్కొనిన వంటలకు కాకుండా ఇతర పంటలకు దీనిని వాడకూడదు.

ലംഡാസൈഹലോത്രിൻ 5% ഇ.സി. എൽഒസി 5% ഇ.സി.

ലംഡാസൈഹലോത്രിൻ 5% ഇ.സി. പരുത്തി, നെല്ല്, വഴുതന, തക്കാളി എന്നിവയുടെ വിവിധ യിനം കീടങ്ങളായ പുഴു, പുഴു, പുഴു, തണ്ട്, കായ് തുരപ്പൻ തുടങ്ങിയ കീടങ്ങൾക്കെതിരെ തളിക്കുന്ന, സമ്പർക്കവും വയറുവേദനയും ഉണ്ടാക്കുന്ന കീടനാശിനിയാണിത്.

					802/00/00/00
	ഴുലങ്ങളുടെ സാധാരണ	60	อีบ) อะบพุธ	900	oglas _{io}
വിളവ് (കൾ)	เมลา	(f000) (f000)	alestro (atel.)	eriggo (el.)	ayuwang Bend aleusisijuh aleusisijuh
പരുത്തി	പഞ്ഞിപ്പൂച്ചി	1525	300500	400600	21
	തുള്ളൻ	1525		400600	21
	เซโนโทย์	1525		400600	21
ongi	ഇലമടക്കിപ്പുഴു, രണ്ട് തുളപ്പൻ, ഗാൾ മിഡ്ജ്, ത്രീപ്സ്, ബിപിഎച്ച്, ഡബ്ളുുബിപിഎച്ച്, വേൾ മഗോട്ട്	12.5	250	400600	15
വരിമുധ	കുമ്പ് തുളപ്പൻ, കായ തുളുപ്പൻ	15	300	400600	4
നക്കാളി	കായ തുളപ്പൻ	15	300	400600	4

പ്രയോഗവിധം : സസ്വ സംരക്ഷണ ഉപകരണം : ബക്കറ്റ് സ്പ്രെയർ, റൊക്കിണ്ട് സ്പ്രെയർ, സ്റ്റീറപ് പമ്പ് സ്പ്രെയർ (സിങ്കിൾ, ഡബിൾ ബാരൻ), നാപ്സാക്ക് സ്പ്രെയർ, വീൻ ബാരോ സ്പ്രെയർ, കമ്പ്രഷൻ നാപ്സാക്ക് സ്പെയർ, കുമ്പഷൻ നാപ്സാക്ക് ബാററീ അലെങ്കിൽ ആസ്പി എഛ്ടിപി പവ്വർ സ്പ്രെയർ.

മൂൻകരുതവുകൾ : 1. ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ, ഒഴിഞ്ഞ ഭക്ഷ്യസാമഗ്രി കണ്ടെയ്നറുകൾ, കാലിത്തിറ്റകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് അകറ്റിവെക്കുക. 2. വായ്, കണ്ണുകൾ, ചർമ്മം എന്നിവയിൽ വീഴുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. 3. ഇതിന്റെ പ്രസരണ ധൂളി ശ്വസിക്കരുത്, കാറ്റന്റെ ഗതിയനുസരിച്ച് തളിക്കുക. 4. തളിച്ചശേഷം മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങളും ശരീര ഭാഗങ്ങളും നന്നായി കഴുകുക. 5. തളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും തിന്നുവാനോ, കുടിക്കുവാനോ, ചവക്കുവാനോ പുകവലിക്കാനോ പാടില്ല. 6. മിശ്രണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും തളിക്കുമ്പോഴും പൂർണമായ സംരക്ഷണ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക. സസ്യമാരക ശക്തി : വയലിലെ ശുപാർശകൾക്ക് അനുസൃതമായി

പ്രയോഗിച്ചാൻ ഈ ഉൻപന്നം സസ്യങ്ങൾക്കു മാരകമല്ല. വിഷബാധാ ലക്ഷണങ്ങൾ : പരിഭ്രമം, ഉൻക്കണ്ഠ, വിറയൻ,

പിടച്ചിൻ, ചർമ്മത്തിൻ പക, തുമ്മൻ, മുക്കൊലിപ്പ്, മുക്കടപ്പ് എന്നിവ അനുഭവപ്പെടാം. പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ: 1. അകത്തു പെട്ടാൽ ഛർദ്ദിപ്പിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ

ദ്രാവകങ്ങൾ കൊടുക്കരുത്. 2. വസ്ത്രങ്ങളും ചർമ്മവും മലിനമായാൽ വസ്ത്രങ്ങൾ നിക്കി സോപ്പും ധാരാളം വെള്ളവും കൊണ്ട് നന്നായി കഴുകുക. 3. കണ്ണിൽ വീണാൻ സലൈൻ/ശുദ്ധജലം കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ കുറഞ്ഞത് 10-15 മിനിറ്റ് കഴുകുക. 4. ശ്വസിച്ചാൽ രോഗിയെ ശുദ്ധവായു കിടുന്നീടത്തേക്കു മാല്പക.

പ്രതിവിഷം : ഒരു പ്രതിവിഷവും നിർദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ലക്ഷണങ്ങൾ . അനുസറിച്ച് ചികിത്സിക്കുക. അലെർജി ലക്ഷണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആന്റിഹിസ്റ്റമൈൻസ് കൊടുക്കാം.

ഒഴിഞ്ഞ കൂടുകൾ നശിപ്പിക്കൻ : ഒഴിഞ്ഞ പേക്കേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അധികമായ വസ്തുക്കൾ, കീടനാശിനിയും കണ്ടെയ്നറും കഴുകിയ വെള്ളം എന്നിവ അന്തരിക്ഷത്തിനോ വെള്ളത്തിനോ മലിനീകരണം സംഭവിക്കാത്തവിധം നശിപ്പിക്കുക. 2. ഒഴിഞ്ഞ പേക്കേജുകൾ വീണ്ടും പ്രയോഗിക്കുന്നതു തയൊൻ, അവയെ പുറത്തു കളയമുത്. 3. പേക്കേജുകൾ പൊട്ടിച്ചുകിറി, ആൾത്താമസമില്ലാത്ത ഒരിടത്ത് കുഴിച്ചുമുടുക.

സംഭരണ വൃവസ്ഥകൾ : 1. ഈ കീടനാശിനി അടങ്ങുന്ന പേക്കേജുകൾ സംഭരിക്കേണ്ടത് മറ്റു വസ്തുക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്ഷ്യവസ്സുക്കൾ സംഭരിച്ച പരിസരങ്ങളിൽനിന്നു മാറി അല്ലെങ്കിൽ മുറികളിൽനിന്നും അകന്ന് പ്രത്യേകമായ മുറികളിലോ പരിസര്ത്തോ വേണം അല്ലെങ്കിൽ കിടനാശിനിയുടെ അളവും രൂക്ഷതയും അനുസരിച് പ്രത്യേകം അലമാരയിൽ പുട്ടി സൂക്ഷിക്കുക. 2. കിടനാശിനി സംഭരിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മുറി അല്ലെങ്കിൽ പരിസരം നല്ല വെളിച്ചം തട്ടുന്നതും, ഈർപ്പമില്ലാത്തതും, തണുപ്പുള്ളതും വാതായനങ്ങളോടു കൂടിയതും ആവിമൂലം മനിനീകരണം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നല്ല വിസ്താരമുള്ളതും ആയിരിക്കണം.

ലംഡാസൈഹലോത്രൻ സ.ത.: ഇമൾസിഫൈയർസ്

__ ക്രെസ്റ്റോക്സ് എഈ 4 ആൻക്കെൽ ബെൻസീൻ സൾഫോണേറ്റ് 20% ത്തിൻെഅറ കാൻസും സാൾട്ട് മിശ്രം, അൻക്കൈൻ ഫിനോൾ ബഥാകിലേറ്റ 57%, സോൾവെന്റുകൾ (മെഥനോൾ), ഹെന്നൊബാടാ നോൾ. 7.000% w/w അനേരമെക്ക് 23%) ക്രെസ്റ്റോക്സ് എഇ 5 ആൻകൈൽ ബെൻസീൻ സൾഫോ ണേറ്റ് 36% ത്തിന്റെങ്ങറകാൻസും സാന്റ്ട് മിശ്രം, ആൻക്കൈൽ ഫിനോൾ ഇഥോക്സിലേറ്റ് 34%, സോൾവെന്റുകൾ ്മഥനോൾ, ഐസൊബൂട്ടാ നോൾ, അനോമെക്ക് 30%) 3.000% w/w

നോഗർവെൻ് (അമോമെക് attended to mylw മൊത്തം: 100.000% w/w വീണ്ടും പ്രവേശന കാലയളവ് : 48 മണിക്കൂർ.

മുന്നറിയിപ്പ്: ഈ ലേബലിൽ/ലഘുലേഖയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ലാത്ത വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്. Malayalar

लैम्बडा सायहैलोथीन ५% ई.सी. एल ओ सी 5% ई सी

लैम्बडा सायहैलोधीन ५% ई.सी. स्पर्श और पेट में असर करने वाला कीटनाशक है जो कि विभन्न प्रकार के कीटों जैसे डोडें कि सडियां. तेला. चरदा. पत्ती मोडक और तना व फल छेदक आदि को कपास, धान, बेंगन और टमाटर कि फसलों पर छिडकाव किया जाता है ।

उपयोग

	कीट के नाम	प्रति	प्रति हेक्टेयर मात्रा		
फसल		स. तत्व (प्रा.)	संस्थना (मि.ली.)	पानी की मात्रा (ली.)	तथा फ़सल काटने के बीच अंतराल (दिन)
कपास	होहे की सुंही	94-24	300-400	800 - £00	29
	तेला	94-24		800 - 800	29
	चुरदा	94-24		800 - 800	29
धान	पत्ता मोड़क, तना छेदक हरा पत्ती का टिड्डा, बाल मिज, हित्पा, भूरा पौध टिड्डा, संभेद पीठ बीला टिड्डा, मैंबट	92.4	340	¥00 - €00	94
बैंगन	प्ररोह एवं फल छेदक	94	300	¥00 - €00	8
टमाटर	फल छेदक	94	300	₩00 - €00	8

उपयोग के लिए निर्देश: उपयोग में आने वाले यंत्र: नेपसेक स्प्रेयर, फट स्प्रेयर, कम्प्रेशन नेपसेक बैटरी स्प्रेयर और एस.पी.ई.ई.-एच.टी.पी. पावर सोगर थाटि।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ : १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशओं के चारे से दर रखें। २. मह. त्वचा और आखों के सम्पर्क से बचायें। ३. छिडकाव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचाए। हवा की दिशा में छिडकाव करें। ४. छिडकाव के बाद दिषत कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोए। ५. छिडकाव के समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें।

पौध विशाक्तता : सझाव की मात्रा के अनसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविशाक्त नहीं है।

विष के लक्षण: घबराहट, परेशानी, कंपकंपी, झटके (मिरगी), त्वचा की एलर्जिक, छींक आना, नाक बहना और जलन हो सकते हैं।

पाथमिक चिकित्सा : 9 यदि निगल जाये तो जल्दी न करायें या कोई पदार्थ मृह द्वारा न दें। २. यदि कपड़े और त्वचा दिषत हो जाए तो दिषत कपड़े उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धीए। 3. यदि आखें दिषत हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग 90-94 मिनट तक धोए। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शद्ध हवा में ले जाएं।

विष नाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें। एलर्जी के लिए एन्टीहिस्टेमिन्स दिए जा सकते हैं।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. कीटनाशक निर्माताओं या उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि डिब्बों या पात्रों को तोडफोडकर आबादी से दर जमीन में गाढ़ देना चाहिए। २. प्रयोग किये गये डिब्बों को दबारा प्रयोग के लिए बाहर खुला न छोड़ें। ३. डिब्बों या बची हुई कीटनाशक या धोवन का निपटारा इस प्रकार करें कि जिससे आसपास की चीडें. पीने की पानी विषेला

संग्रहण की शर्तें : १. कीटनाशक के डिब्बों का संग्रहण अलग कमरे या स्थान पर अन्य वस्तओं विशेषकर खाद्य पदार्थों के संग्रहण कक्ष या स्थान से दर किया जाना चाहिए या कीटनाशक की मात्रा और स्वभाव पर निर्भर करते हुए इसका संग्रहण अलग अलमारी में ताला-चाबी लगाकर करें। २. कीटनाशक के डिब्बों का संग्रहण कक्ष या रोशनदारी, मजबूत, शुष्क, ठंडा हवादार तथा पर्याप्त लम्बाई चौडाई का होना चाहिए। जिससे बाष्प द्वारा प्रदषण नहीं हो।

रासा

रासायनिक संरचन			Lambdacyhal		5.0009
लैम्बडासायहैलोधीन	सक्रिय तत्व	५.०००% भार/भार	Emulsifers -		
सारफेक्टट - क्रिसलोक्स ए.ई.४	२०% एल्काइल बेन्जेन साल्फोनेट का कैलशियम साल्ट, का कैलशियम साल्ट, ५७% अल्काइल फेनोल इथोक्सीलेट		Creslox AE 4	Mixture of Calcium salt of Alkyl Benzene Sulphonate 20%, Alkyl phenol ethoxylate 57% and Solvents (Methanol, Isobutanol and Aromex 23%)	7.0009
क्रिसलोक्स ए.ई.५	तथा विलायक (मेथानोल, इसोबुटानोल व ऐरोमेक्स २३% ३६% एल्ळाइल बेन्जेन सल्फोनेट का कैल्शियम साल्ट, ३४% अल्काइल फेनोल इथोक्सीलेट तथा विलायक (मेथानोल, इसोबुटानोल व ऐरोमेक्स ३०%)		Creslox AE 5	Mixture of Calcium salt of Alkyl Benzene Sulphonate 36%, Alkyl phenol ethoxylate 34%, And Solvents (Methanol, Isobutanol and Aromex 30%)	3.0009
सोलवेंट (एरोमेक्स)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	पर्याप्त मात्रा भार/भार	Solvent (Aron	nax)	

छिडकाव के 48 घंटे बाद क्षेत्र में प्रवेश करें चेतावनी: लेबल/लीफलेट में दी गयी फसलों के अलावा अन्य फसलों व कीटों Lambda Cyhalothrin 5% EC **LOC 5% EC**

Lambda Cyhalothrin 5% EC is a contact and systemic insecticide which is effective for the control of pests like bollworms, jassids, thrips, leaffolder, stem and fruit borer etc. on cotton, rice,

Recommendations:

	Common name of weeds		Dosage/Ha			Waiting period	
Crop(s)			A.I. (gm)	Formu- lation (ml)	Dilution in water (Ltr)	between last spray to harvest (in days)	
Cotton	Bollworms		15-25	300-500	400-600	21	
	Jassids		15-25		400-600	21	
	Thrips		15-25		400-600	21	
Rice	Leaf folder, Stem Borer, Green leaf hopper, Gall midge, Thrips, BPH, WBPH Whort maggot		12.5	250	400-600	15	
Brinjal	Shoot & Fruit borer		15	300	400-600	4	
Tomato	Fruit Borer		15	300	400-600	4	

Directions of Use: Plant Protection Equipment Bucket sprayer, Rocking sprayer, Stirrup pump sprayer (Single and double barrel), Knapsack sprayer, Foot sprayer, Wheel barrow sprayer, Compression Knapsack sprayer, Compression Knapsack battery or ASPEE HTP Power sprayer.

Precaution: 1. Keep away from foodstuffs, empty food stuff containers and animal food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the directions of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and

Phytotoxicity: The product is not phytotoxicic when used as per field recommendation.

Symptoms of Poisoning: Nervousness, anxiety, trémor, convulsions, skin allergies, sneezing, running nose and stiffness of nose may occur.

First Aid: 1. If swallowed, do not induce vomiting or give liquid. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes, 4, If inhaled, remove the patient to fresh air.

Antidote : No specific antidote is known. Treat symptomatically. Antihistamines may be given to control allergies.

Disposal of Used Container: 1. Used packages or surplus materials and washings of the insecticides and container shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution, 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use, 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions: 1. The package containing the insecticides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly article of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticide. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticides shall be well-lit, well built, dry, cool, ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vanour

Chemical Composition:

Lambdacyhal		5.000%	w/w
Emulsifers -			
Creslox AE 4	Mixture of Calcium salt of Alkyl Benzene Sulphonate 20%, Alkyl phenol ethoxylate 57% and Solvents (Methanol, Isobutanol and Aromex 23%)	7.000%	whe
Creslox AE 5	Mixture of Calcium salt of Alkyl Benzene Sulphonate 36%, Alkyl phenol ethoxylate 34%, And Solvents (Methanol, Isobutanol		
	and Aromex 30%)	3.000%	w/w

Solvent (Aromax) 0.5Total 100.00% w/w Optimal re-entry period: 48 hrs.

Caution: Not to be used on Crops other than specified on this Label/Leaflet.

English

Read Instructions Leaflet before use उपयोग से पहले निर्देश पत्रिका पहे।

> For Agricultural use only केवल कषि उपयोग के लिए

Store in a cool, dry and well ventilated place

ठंडी, सखी और अच्छी तरह हवादार जगह में संग्रह करें।

Lambda Cyhalothrin 5% EC **LOC 5% EC** (Insecticide)

लैम्बडा सायहैलोथीन ५% ई.सी. एल ओ सी 5% ई सी (कीटनाशक)

Regn. No.: CIR-42.099/2003-Lambdacvhalothrin(EC)(227)-95



Manufactured and Marketed By

KR Lifesciences Pvt. Ltd.

29. LALA LAJPAT RAI SARANI KOLKATA - 700 020, INDIA E-mail: kr@krishirasayan.com

निर्माता एवं विपणनकर्ता

केआर लाईफसाईन्सेस प्रा.लि

29. लाला लाजपत राय सारनी. कोलकाता - 700020

For manufacturing unit address see first three characters of batch no, and see below

KRR:

Maitapur, P.O. Ranital Balasore, Orissa, PIN - 756 111 Mfg, Lic. No. e-Lic/INSECTI/MAN-PP-2

KRK:

Joykrishnapur, P.O. Bonhoogly II Sonarpur, South 24 Parganas, West Bengal, PIN - 700 103 Mfa. Lic. No. MPP/ILC/145/K-2

Customer Care Detail:

KR LIFESCIENCES PVT. LTD.

29. Lala Laipat Rai Sarani, Kolkata - 700 020 Toll Free No.: 18001211800

email: customercare@krishirasavan.com

Not to be used on crops other than specified on this leaflet

DANGEROUS TO REJUSE EMPTY CONTAINERS/PACKAGES

योग १००.००% भार/भार

Read Instructions Leaflet before use उपयोग से पहले निर्देश पत्रिका पर्छ।

> For Agricultural use only केवल कषि उपयोग के लिए

Store in a cool, dry and well ventilated place

ठंडी. सखी और अच्छी तरह हवादार जगह में संग्रह करें।

Lambda Cvhalothrin 5% EC **LOC 5% EC** (Insecticide)

लैम्बडा सायहैलोथीन ५% ई.सी. एल ओ सी 5% ई सी (कीटनाशक)

Regn. No.: CIR-42,099/2003- Lambdacyhalothrin(EC)(227)-95



Manufactured and Marketed By:

KR Lifesciences Pvt. Ltd.

29. LALA LAJPAT RAI SARANI KOLKATA - 700 020, INDIA E-mail: kr@krishirasayan.com

निर्माता एवं विपणनकर्ता

केआर लाईफसाईन्सेस प्रा.लि

29. लाला लाजपत राय सारनी. कोलकाता - 700020

For manufacturing unit address see first three characters of batch no. and see below

KRR:

Maitapur, P.O. Ranital Balasore, Orissa, PIN - 756 111 Mfg. Lic. No. e-Lic/INSECTI/MAN-PP-2

KRK:

Joykrishnapur, P.O. Bonhoogly II Sonarpur, South 24 Parganas. West Bengal, PIN - 700 103 Mfg. Lic. No. MPP/ILC/145/K-2

Customer Care Detail:

KR LIFESCIENCES PVT. LTD.

29, Lala Laipat Rai Sarani, Kolkata - 700 020 Toll Free No.: 18001211800

email: customercare@krishirasavan.com

Not to be used on crops other than specified on this leaflet



लॅम्बटा सायहॅलोथ्रिन ५% ई.सी. एलओसी 5% ई.सी.

(किटकनाशक)

लॅम्बटा सायहॅलोथिन ५% ई.सी. हे एक संपर्क आणि पोटावर काम करणारे कीटकनाशक आहे, जे कापुस, भात, वांगी आणि टोमॅटो पिकावर बोंडअळी, बोंडअळी, बोंडअळी, लीफ हॉपर्स आणि स्टेम आणि फट बोरर्स यासारख्या विविध पकारच्या कीटकांवर फवारले जाते

शिफारस

	किड्यांची नावे	मान्नेच	वं प्रमाण/हे	वटर	शेवटवी फवरणी आणि
पिक(के)		सक्रिय तत्व (ग्रॅम)	मिली प्रमाण (मि.सि.)	सँग्य करणसदी पण्याची मन्न (जिटर)	कामी दल्यन धबन्यवा कातवरी (दिसामध्ये)
कपाशी	बॉडअळी	94-24	300-400	¥00-€00	२१
	तुडतुडे	94-24		¥00-€00	२१
	फुलकिडें -	94-24		¥00-€00	२१
भात	पान गुडाकमारी अळी, खोड पोरक्रपारी अळी, चाडे गादनाशी, फुलकिडे, बीपीएच, डब्लूबीनिएच, चक्रिल माळी	92.4	240	¥00-€00	94
वांगं	फुटवे आणि फळे	94	300	¥00-€00	8
टोमॅटो	फळे पोखरणारी आळी	94	300	¥00−£00	8

वापरण्याची पद्धतः पिक संरक्षणेची साधनेः बकेट स्प्रेयर, रॉकिंग स्प्रेयर, स्टिररप पम्प स्प्रेयर (एकेरी आणि दहेरी बॅरल), नॅपसॅक स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, व्हील बॅरो स्प्रेयर, कॉम्प्रेशन नॅपसॅक स्प्रेयर, बॅटरीवर नियंत्रित कॉम्प्रेशन नॅपसॅक स्प्रेयर किंवा ॲस्पी एचटीपी पॉवरसप्रेयर.

सावधानता : १. खाद्यपदार्थ, रिकामी खाद्यपदार्थ भाडी आणि पशुखाद्य यापासून दुरे ठेवावे. २. तोंड, डोळे आणि त्वचा यांच्या संपर्कात आण नये. 3 फवारणी करताना फवारणी श्वसनात जारू देळ नये. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करावी ४ फवारणी केल्यानंतर वापरलेले कपडे आणि शरिराचा भाग अगदी खसखसन ध्वावेत. ५. फवारणी करतेवेळी ध्रम्रपान करणे, खाणे, पिणे अथवा चधळणे यास सक्त मनाई आहे. ६. मिश्रण तयार करतेवेळी आणि फवारणी करतेवेळी पूर्णपणे सुरक्षित कपडे घालावेत.

विषरीपणा : हे उत्पादन शिफारस केल्याप्रमाणे वापरल्यास हे विषबाधक

विषबाधेची लक्षणे : लक्ष न लगणे, अस्वस्थता, कंप सुटणे, आकडी, त्वचेवर ॲलर्जी. शिंक येणे. नाक वाहणे आणि नाक आकसण्याची शक्यता. प्राथमिक उपचार: १. जर पोटात गेले तर. उलटी करण्यास किंवा द्रवपदार्थ पिण्यास देव नये. २. जर कपड्यावर आणि अगावर पडले तर कपडे आणि शरिराचा भाग अगदी भरपुर पाण्याने आणि साबणाने धुवावे. डोळ्याच्या संपर्कात आल्यास, सलाईन अथवा स्वच्छ पाण्याचा १०-१५ मिनिटे भरपर प्रमाणात फवारा माग. ४. श्वसनावाटे आत गेल्यास रूग्णाला स्वच्छ हवेच्या ठिकाणी न्या.

विषबाधनाशक: कोणतेही विषबाधानाशक उपलब्ध नाही. लक्षणानुसार उपचार करावेत. ॲलर्जी नियंत्रणासाठी ॲन्टीहायस्टॅमिन्स दयावी.

वापरलेले कटेनरची वल्हेवाट : १. किटनाशकधारक पॅकेजेस किंवा इतर साधने आणि किटनाशके फवारणी वेळी वापरलेले कपडे आणि भांडी यांची सरक्षितरित्या विल्हेवाट लावावी जेणेकरून पर्यावरण किंवा पाणी दिषत होऊ नये. २. वापरलेले डबेत्याच्या पुनर्वापरासाठी कुठेही साभाळून ठेवू नये. ३. वापरलेले डबे संपूर्णपणे मोडतेड करून लोकवस्तीपासून दूर ठिकाणी जाळण टाकावीत.

साठवण पद्धतः १. किटनाशकधारक डबे स्वतंत्र खोलीत किंवा जागेत जी की खाद्यपदार्थ साठवणीच्या खोल्या किंवा जागा यापासून दूर असलेल्या ठिकाणी ठेवाबीत किंवा किटनाशकाच्या प्रमाणतेनुसार किंवा प्रकारानुसार त्याना कलपबंद कपाटात ठेवावीत. २. किटकनाशके साठवण्याची खोली किंवा जागा प्रकाशमान, व्यवस्थित बाधलेली, कोरडी, थंड, हवेशीर आणि व्यवस्थित रूद की जेथे हवा साचून राहणार नाही अशी असावी.

વ્યવા (વડા	1.10	लग	~1
_		_	
रासायनिव	न घट	क :	

लॅम्बडासायहॅलोथ्रिन सक्रीय तत्व ५ ०००%भार/भार ईम्यल्सीफायर्स क्रिसलॉक्स ए.ई.४ आल्किल बेंझेन सल्फोनेटचे कॅल्शिअम सॉल्ट २०% आल्कलि फिनॉल ईथॉक्सिलेट ५७% आणि सॉलव्हंट (मिथॉनॉल, इसॉब्टानॉल आणि एरोमॅक्स २३%)याचे मिश्रण ७.०००%भार/भार क्रिसलॉक्स ए.ई.५ आल्किल बेंझेन सल्फोनेटचे

कॅल्शिअम सॉल्ट ३६% आल्कलि फिनॉल ईथॉक्सिलेट ३४% आणि सॉल्व्हंट (मिथॉनॉल, इसॉबटानॉल

आणि ऐरोमॅक्स ३०%) याचे मिश्रण ३.०००%भार/भार योग्य प्रमाणात भार/भार सॉलव्हट सी-१ 900.00% भार /भार

डष्टतम री-एंटी कालावधी: 48 तास. खबरदारी: या लेबल/पत्रकावर दर्शविलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतः पिकांवर वापरू नका

ਲੈਂਬਡੀਾ ਸਾਈਹੈਲੋਥਿਨ ੫% ਈ.ਸੀ.

ਐਲਓਸੀ ੫ੰ% ਈ ਸੀ

(ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ)

ਲੈਂਬਡੀਾ ਸਾਈਹੈਲੋਥ੍ਰਿਨ ੫% ਈ.ਸੀ. ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਪੇਟ-ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੀਟਨਾਸਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਪਾਹ, ਝੋਨੇ, ਬੈਂਗਣ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਹਲ ਕੀਤੇ ਸੋਲਵਰਮ ਸੋਰਵਰਮ ਲੀਵ ਹੈਂਪਰ ਅਤੇ ਸਟੈਮ ਅਤੇ ਵਲ ਸੋਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ

		ਮਾਰ	ਮਾਤਰਾ/ਹੈਕਟੇਅਰ		
ਫ਼ਸਲ	ਕੀੜੇ ਦਾ ਆਮ ਨਾਂ	ਕ੍ਰਿ.ਤੱ. (ਗ੍ਰਾਮ)	ਦਵਾਈ (ਮਿ.ਬੀ.)	ਘੋਲ ਲਈ ਪਾਣੀ (ਲੀਟਰ)	ਅਤੇ ਚੁਗਾਈ/ ਤੁੜਾਈ/ਵਾਦੀ ਵਿਚਕਾਰਸਮਾਂ (ਦਿਨ)
ਕਪਾਹ/	ਟੀਡੇ ਦੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ	94-24	300-400	800-Ę00	২৭
ਨਰਮਾ	ਤੇਲਾ	94-24		800-É00	29
	ष्पिन्	94-24		800-Ę00	29
ਚਾਵਲ	ਪੱਤੀ ਮੌਡੂ, ਤਣਾ ਛੇਦਕ ਪੱਤੀ ਦਾ ਹਰਾ ਟਿੱਡਾ, ਚਿੰਦਕ, ਥ੍ਰਿਪਸ, ਬੀਪੀਐਚ, ਡਬਲਚੂਬੀਪੀਐਚ, ਵਰਲ ਮੈਕਟ	92,4	240	900-É00	9,4
ਵੈਂਗਣ	ਲਗਰ ਅਤੇ ਫਲ ਛੇਦਕ	૧૫	300	800-Ę00	8
ਟਮਾਟਰ	ਫਲਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹੀਆਂ	૧૫	300	800-Ç00	8

ਵਰਤਣ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ: ਪੰਦ ਸਰੱਖਿਆ ਔਜ਼ਾਰ: ਬਾਲਟੀ ਪੰਪ, ਰੋਕਿੰਗ ਪੰਪ, ਸਟਿੱਗਅੱਪ ਪੰਪ ਸਪਰੇਅਰ (ਇਕਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਹਰੀ ਨਾਲੀ ਵਾਲਾ). ਪਿੱਠ ਪੰਪ, ਪੈਰਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪੰਪ, ਵੀਲ ਬੈਰੋ ਪੰਪ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਪਿੱਠ ਪੰਪ, ਕੰਪੈਸ਼ਰ ਪਿੱਠ ਬੈਟਰੀ ਜਾਂ ਐਸਪੀ-ਐੱਚਟੀਪੀ ਪਾਵਰ ਪੰਪ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: ੧, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦਰ ਰੱਖੋ। ੨. ਮੰਹ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ੩. ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਧੜ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਹਵਾ ਦੇ ਰੱਖ ਵਲ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। ੪. ਫ਼ਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦਸ਼ਿਤ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ। ੫. ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤਮਾਖੁ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਓ, ਨਾ ਪੀਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਿੱਥੇ। ੬, ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਰੇ ਸਰੱਖਿਆ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨ।

ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਅਸਰ : ਜੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜ਼ਹਿਰ ਚੜਣ ਦੇ ਲੱਛਣ : ਘਬਰਾਹਟ, ਬੇਚੈਨੀ, ਕਾਂਬਾ, ਕੜਵਲਾਂ, ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਅਲਰਜ਼ੀਆਂ, ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਨੱਕ ਵਗਣਾ ਅਤੇ ਨੱਕ ਦਾ ਅਕਤਾਉ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ: ੧. ਜੇ ਨਿਗਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤਰਲ ਨਾ ਪਿਆਓ। ੨. ਜੇ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਪੜੇ ਲਾਹ ਦਿਓ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਿਤ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਬਣ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ। 3. ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਸਲਾਈਨ/ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ੧੦ ਤੋਂ ੧੫ ਮਿੰਟਾਂ ਤਕ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੋ। ੪. ਜੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੱਜਰੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਓ।

ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੋੜ : ਕਿਸੇ ਉਚੇਚੇ ਜ਼ਹਿਰਮਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਅਲੁਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਐਂਟੀ ਹਿਸਾਟਾਮਾਈਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਰਤੋਂ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ : ੧, ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਬਚੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਧੋਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਦਸ਼ਣ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਹੋ ਸਕੇ। ੨. ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰੇਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ੩, ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਨ੍ਹ-ਤੋੜ ਕੇ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾੱਭ-ਸੰਭਾਲ : ੧. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਅਹਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਅਹਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ੨. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਅਹਾਤੇ ਰੌਸ਼ਨ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਸੱਕੇ, ਠੰਡੇ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਲ ਨਾਲ ਦਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾੳ ਹੋ ਸਕੈ।

			1766
ਰਸਾਇਣਕ ਰਚਨਾ :			
ਲੈਂਬਡਾਸਾਈਹੈਲੋਬ੍ਰਿਨ ਕ੍ਰਿ.ਤੱ.		੫.०००% ਵ/ਵ	
ਗਾੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ			
ਕ੍ਰੈਸਲੈਕਸ ਏਈ-੪	ਅਲਕਾਈਲ ਬੈਂਨਜ਼ੀਨ ਸਲਫੋਨੇਟ ੨੦%		
	ਦੇ ਕੈਲਸੀਅਮ ਸਾਲਟ, ਅਲਕਾਈਲ		
	ਫਿਨੌਲ ਈਥੈਕਸੀਲੇਟ ੫੭% ਅਤੇ ਘੋਲ	वं	
	(ਮੈਥਾਂਲ, ਆਈਸੋਇਊਟਾਨੈਲ ਅਤੇ		(ক্র
	ਐਰੋਮੈਕਸ ੨੩%) ਦਾ ਮਿਸ਼ਣ	೨,೦೦೦% ₹/₹	
ਕੈਂਸਲੌਕਸ ਏਈ-੫	ਅਲਕਾਈਲ ਬੈਨਜੀਨ ਸਲਫੋਨੈਟ ੩੬%		
•	ਦੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਾਲਟ, ਅਲਕਾਈਲ		
	ਫਿਨੌਲ ਈਥੋਕਸੀਲੇਟ ੩੪% ਅਤੇ ਘੋਲ	a [†]	
	(ਮੈਥਾਨੋਲ, ਆਈਸੋਬਿਊਟਾਨੋਲ ਅਤੇ		
	ਐਰੇਮੈਕਸ ੩੦%) ਦਾ ਮਿਸ਼ਣ	3,000% ₹/₹	
ਘੋਲਕ (ਐਰੋਮੈਕਸ)		ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵ/ਵ	দ্রাবব

ਕੱਲ ੧੦੦ ੦੦% ਵ/ਵ

ਅਨੁਕੁਲ ਮੁ-ਪ੍ਵੇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ: ੪੮ ਘੰਟੇਲ ਸਾਵਧਾਨ: ਇਸ ਲੇਬਲ/ਲੀਫਲੈਂਟ 'ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਲ Puniabi লম্বেড়া সাইহালোথিন ৫% ঈ.সি.

এলওসি ৫% ই সি (কীটনাশক)

ল্যম্বড়া সাইহালোথ্রিন ৫% ঈ.সি. এটি একটি সংস্পর্শকারী এবং পদ্ধতিগত কীটনাশক যা তলা, চাল, বেগুন এবং টমেটোতে বোলওযার্ম, জাসিড, খ্রিপস, পাতার ফোল্ডার, স্টিম এবং ফলের পোকা ইত্যাদি পোকা নিযন্ত্রণের জন্য কার্যকব।

সুপারিশ:

	পোকার চলতি নাম	হেন্টর পিছু মাত্রা			শেষ শেলা ও ফালা
कञ्च		সঃ উঃ (গ্রাম)	কর্মেশন (মিঃদিঃ)	মেশানোর জল (লিটার)	তোলার মধ্যে অপেক্ষা কাল (দিন)
তুলো	বোল গুয়ার্ম	78-58	900-800	800-600	42
	শ্যামা পোকা	38-86		800-600	42
	মেদী পোকা	38-36		800-500	45
ধান	পাতামোত্র পোকা, মান্তরা পোকা, সবুজ শোষক পোকা, তেপু পোকা, তেমী পোকা, বাদামী পোষক পোকা, প্রেতপৃষ্ঠ পোষক পোকা, দাঁথী পোকা	34.8	260	800-600	Ж
বেগুন	ভাঁটা ও ফলছিন্তক পোকা	26	600	800-600	8
केटमटी ।	পাতার সবুজ শোষক পোকা	26	900	800-600	8

বাবহারের নির্দেশ: গাছ সরক্ষাকারী সরঞ্জাম: বাকেট স্প্রেয়ার, রকিং স্প্রেয়ার, ষ্টিরাপ পাম্প স্প্রেয়ার (সিঙ্গেল এবং ডবল ব্যারেল), ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, ফট স্প্রেয়ার, চাকাযক্ত ব্যারো স্প্রেয়ার, কম্প্রেশন ন্যাপস্যাক ম্প্রেয়ার, কম্প্রেশন ন্যাপস্যাক ব্যাটারী বা অ্যাম্পী এইচটিপি পাওয়ার

সতর্কতা: ১. খাদাপদার্থ, খালি বাসনপত্র ও পশুখাদা থেকে দরে রাখবেন। ২. মুখ, চোখ ও ব্লকের সংস্পর্শ এড়াবেন। ৩. স্প্রে-কণার শ্বাসে নেওয়া এডাবেন। বাতাসের অনকলে স্প্রে করবেন। ৪. স্প্রে করার পরে দৃষিত পোশাক এবং দেহাংশ ভালোভাবে ধুয়ে নেবেন। ৫. স্প্রে করার সময়, কোনরকম ধ্মপান, পানীয় পান করা, খাবার খাওয়া ও চেবানো নিষেধ। ৬. মেশানো ও স্প্রে করার সময় সম্পূর্ণ সুরক্ষাত্মক পোশাক

বিষাক্ততা: ক্ষেত্রের সপারিশ মতো বাবহারের ক্ষেত্রে উৎপাদনটি বিষাক্ত

বিষাক্ততার লক্ষণ: সায়দৌর্বলা, উৎকণ্ঠা, কাঁপনি, খেঁচনি, ছকের আলোজী হাঁচি নাক দিয়ে জল ঝবা এবং নাক বন্ধ হতে পাৰে।

পার্থমিক চিকিৎসা : ১. গিলে ফেললে, বমি করাবেন না বা তরল খেতে দেবেন না। ২. পোষাক ও ত্ৰক দ্বিত হলে, পোশাক বদলাবেন ও সাবান তথা প্রচুর জল দিয়ে দৃষিত ত্বক ধুয়ে নেবেন। ৩. চোখ সংক্রামিত হলে ১০ থেকে ১৫ মিনিট ধরে প্রচুর স্যালাইন / পরিস্কার জলের ঝাপ্টা দেবেন। ৪. শ্বাসে গেলে, রোগীকে মক্ত বাতাসে সরিয়ে নিয়ে যান।

প্রতিষেধক সুনির্দিষ্ট কোনও প্রতিষেধক জানা নেই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করাবেন। আলার্জি নিয়ন্ত্রণ করতে আণ্টিহিষ্টামাইন্স দেওয়া যে

ব্যবহৃত প্যাকের বিনষ্টিকরণ: ১. কীটনাশকের ব্যবহৃত প্যাক বা উদ্বত্ত পদার্থ এবং ধোয়ানি তরলাদি এমন নিরাপদ উপায়ে বিনষ্ট করতে হবে য াতে পরিবেশ বা জলের দুষণ প্রতিরোধ হয়। ২, ব্যবহৃত প্যাকের পনর্বাবহার রোধ করতে তা যত্রতত্র ফেলে রাখবেন না। ৬. প্যাক ভেঙ্গে জনবসতি থেকে দুরে পুঁতে ফেলতে হবে।

মজতকরণের পরিম্বিতি ১. কীটনাশক সম্বলিত প্যাক অন্যান্য পদার্থ, বিশেষতঃ খাদ্যবস্তু মজুতের জন্যে ব্যবহৃত ঘর বা স্থান থেকে দূরে পৃথক ঘর বা স্থান মজত করতে হবে অথবা কীটনাশকের পরিমাণ ও প্রতির ওপর নির্ভর করে পথক আলমারিতে তালা বন্ধ করে রাখতে হবে। ২. কীটনাশক মজুতের জন্যে ব্যবহৃত ঘর বা স্থানটি হতে হবে সুআচ্ছাদিত, সনির্মিত, শুকনো, ঠাণ্ডা, বাতায়িত এবং বাষ্পাতার দ্বারা হতে পারা দ্বাণ এডাতে পর্যাপ্ত পরিসরযক্ত।

রাসায়নিক সংমিশণ : ল্যান্ডদোসাইহ্যালাথিন সং দৈঃ

অবদাবক -

ক্রেসমন্ত্র এই ৪ আলকাইল বেঞ্জিন সালফোনেট ২০%, আলকাইল ফেনল ইথক্সিলেট ৫৭% এবং দ্রাবকের (মেথানল, আইসোবটানল এবং আবোমেক ২৬%) ক্যালসিয়াম লবগের মিশ্বর 7 000% w/w অ্যালকাইল বেঞ্জিন সালফোনেট ৬৬%, আলকাইল ফেনল ইথক্সিলেট ৩৪% এবং দ্রাবকের (মেথানল, আইসোবটানল এবং আবোমের ৬০%) 3.000% w/w

ভাবক(আারোমেক) কালসিয়াম লবণের মিশণ পর্যাপ্ত পরিমাণে w/w মোট 100.00% w/w ছিটিয়ে দেওয়ার ৪৮ ঘণ্টা পর এলাকায় প্রবেশ করুন। সতর্কতাঃ এই লেবেল / লিফলেটে নির্দিষ্ট ভাবে লিখিত শস্য ছাড়া অন্য

பிரத்யேக மறு நுழைவு காலம்: 48 மணி நேரம். எச்சரிக்கை: லீஃப்லெட்டில் கூறியது தவிர কোন শস্যে এই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না। பயிரிலும் பிரயோகம் செய்வது கூடாது.

5.000% w/w

லாம்ப்டா சைவாலோக்ரின் 5% ஈ.சி. எல்ஒஸி 5% ஈ சி (பூச்சிக்கொல்லி)

லாம்ப்டா சைஹலோத்ரின் 5% ஈ.சி. பருத்தி, நெல், கத்தரிக்காய் மற்றும் தக்காளி பயிர்களில் காய்ப்பு-ழுக்கள், காய்ப்புழுக்கள், காய்ப்புழுக்கள், இலைத் தண்டுகள் மற்றும் தண்டு மற்றும் பழம் துளைப்-பான்கள் போன்ற பல்வேறு வகையான பூச்சிகளுக்கு எதிராக இது ஒரு தொடர்பு மற்றும் வயிற்றில் செயல்படும் பூச்சிக்கொல்லியாகும்.

பரிந்துரைகள் :

uidit (sat)	பூச்சியின் போதுப் பேயர்	அளவு/தேறக்டேர்			sau.As Garlodo
		தீ.மு. (கிராம்)	(மிலி) மருந்து	கரைக்கும் தீர் (விட்டர்)	இருந்து அறுவன்ட வரை நாத்திருப்பு (நாட்கள்)
பருத்தி	காப்புழு	1525	300500	400600	21
	தத்துப் பூச்சி	1525		400600	21
	g) en er ú Cu dir	1525		400600	21
Gpá	මුතා පටසිම්, ඉන්හලි පුණාවයන් පටසන මුතාද්යුගේ, සැකසේ ජෝවයක්, මුතාවේවයන්නේ, පුකාපොත් පිහිසේ, පටස්පුල්පිසේ, ලෙස්සුණ	12.5	250	400600	15
aġafl	குருத்து மற்றும் காப் தனைப்பாள்	15	300	400600	4
<u>p</u> éarel	துளைப்பாள்	15	300	400600	4

உபயோகிக்கும் முறை : பயிர் பாதுகாப்பு பகரனம் வாளி கெளிப்பான், ராகிங் கெளிப்பான், பைப் மூலம் கலந்து கெளிப்பான் (களி மற்றும் இரண்டு போல் கொண்டது) கைக் கெளிப்பான், பாக தெளிப்பான், கைவண்டி தெளிப்பான், காற்றமுத்த முறையில் இயங்கும் கைத் தெளிப்பான், காற்றமுத்த முறையில் பேட்டரிமூலம் இயங்கும் கைத் தெளிப்பான் அல்லது விசை தெளிப்பான்.

முன்னெச்சரிக்கை: 1. உணவு வகைகள், உணவு வைக்கப்படும் பாத்திரங்கள், கால்நடை தீவனங்கள், போன்றவற்றிலிருந்து தூரத்தில் வைக்கவும். 2. வாய், கண்கள் மற்றும் உடலில் தோல்களில் படுவதைத் தவிர்க்கவும். 3. மருந்தின் தெளிப்பு புகையை உறிஞ்சுவதைத் தவிர்க்கவும். மருந்தை காற்றடிக்கும் திசையில் தெளிக்கவும். 4. மருந்து தெளித்தபிறகு மருந்து கலந்துவிட்ட ஆடைகளையும், உடம்பின் பாகங்களையும் சுத்தமாகக் கழுவவும். 5. மருந்து தெளிக்கும்போது புகை பிடித்தல், தண்ணீர் அருந்துவது, உணவு உண்வது, சுவைப்பது கூடாது. 6. மருந்து கலக்கும் பொழுதும், தெளிக்கும் பொழுதும் உடலை முழுவதுமாக மறைத்துக் கொள்ளும்படியான கவச உடை அணிந்து கொள்ளவும். ப**யிர் நச்சுதன்மை** : இந்த மருந்தை சரியான முறையில்

உபயோகிக்கும் பொழுது இது பயிரை பாதிக்காது. விஷத்தன்மையின் அறிகுறி : பதட்டம், ஒவ்வாமை தள்ளாடுதல், உடல் தளர்ச்சி, தோள்களில் அரிப்பு, தும்மல் மூக்கில் தண்ணீர் வடிதல் மற்றும் மூக்கு அடைத்தல் போன்றவை ஏற்பட

முதல் உதவி: 1. தவறுதலாக இந்த மருந்தைக் குடித்துவிட்டால் வாந்தி எடுக்க முயற்சிப்பதோ, தண்ணீர் ஆகாரமோ கொடுத்தல் கூடாது. 2. துணி மற்றும் உடலில் மருந்து பட்டுவிட்டால் துணிகளை உடம்பில் இருந்து கலைந்துவிட்டு உடம்பையும், துணிகளையும் கணிசமான அளவு சோப்பு கலந்து தண்ணீரில் துவைத்து எடுக்கவும் 3. கண்களில் மருந்து பட்டுவிட்டால் கண்களை சலைன்/சுத்தமான தண்ணீர் கொண்டு சுமார் 10ல் இருந்து 15 நிமிடங்களுக்கு

ஆன்படிய ந**ச்சு முறிவு :** குறிப்பிடத்தக்க நச்சு முறிவு மருந்து கிடையாது. அறிகுறிக்கு ஏற்ப பொதுவான முறையில் சிகிச்சை செய்து கொள்ளவும். ஆண்டிஹிஸ்டாயின் கொடுத்து உடல் அரிப்பை

உபயோகித்த மருந்து கலன்களை அப்புறப்படுத்தல் : 1. உபபோகப்படுத்திய மருந்து கலன் களையும், மருந்து மீதம் உள்ள கலவையையும் சுத்தம் செய்த பின்பு அதனால் உண்டான கலவையையும் சுற்றுப்புறச் சூழல் மாசபடாத அளவிற்கு பத்திரமாக அப்புறப்படுத்தவும். 2. உபயோகப்படுத்திய பேக்கிங்குகளை வெளியில் வைக்காமல் இருப்பம் அதன் மறு உபயோகத்தைத் தடுக்கும். 3. உபயோகப்படுத்தப்பட்ட கலன்களை உடைத்து ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத இடத்தில் புதைத்து விட வேண்டும்.

சேமிப்பு விதிமுறைகள் : 1. மருந்து கலன்களை தனி அறைகளில் அல்லது தொலைவில் வைக்கல் நலம். அல்லது மாந்கின் மொக்க அளவைப் பொறுத்து தனி அலமாரியில் பூட்டி வைப்பது நல்லது. 2. மாந்து டப்பாக்கள் சேமித்து வைத்துள்ள இடம் நல்ல வெளிச்சம், நன்கு கட்டப்பட்ட, உலர்ந்த, குளிர்ந்த காற்றோட்டமுள்ள மற்றும் நிறைவான பரப்பளவு உள்ளதாக இருத்தல் அவசியம். அதன்மூலம் மருந்து ஆவியாகாமல் தடுக்க முடியும்.

மருந்து உள்ளடக்கம்: லாம்ப்டாசைஹலோத்ரின் மூலப்பொருள் எ.ஜ. ကောက်မြေား မျက်တဲ့ -க்ரெஸ்ஹோக்ஸ் AE4 கால்சியல் அல்லைல் உப்பு பெள்சென்

சல்போனேட் 20%, அல்லகல் பினோல் எத்தாசைலேட் 57% மற்றும் கால்வெண்ட்ஸ் மேதனால், இசோபுடனால் அரோமாக்ஸ் 23%) க்ளென்னோக்ஸ் AE5 கால்சியம் அல்கைல் உப்பு பெள்சென் சுற்போனேட் 36% அற்கைற் புணேற் எக்காரைவேட் 34% மற்றும் கால்வெண்ட்ஸ் (மேதனால், இசோபுடனால்

மெக்கம் : 100,000% எ/எ வேறு எந்த Tamil

Q.S. et/et

લેમ્બડા સાયહેલોથ્રિન ૫% ઈસી એલઓસી ૫% ઈ સી (જંતનાશક)

લેમ્બડા સાયહેલોથ્રિન ૫% ઈસી તે એક સંપર્ક અને પેટમાં અસર કરતી જંતનાશક છે, જે કપાસ, ડાંગર. રીંગણ અને ટામેટાના પાક પર વિવિધ પ્રકારના જંતુઓ જેમ કે બોલવોર્મ્સ, બોલવોર્મ્સ, બોલવોર્મ્સ, લીફ હોપર અને સ્ટેમ અને ફ્રટ બોરર્સ સામે છાંટવામાં આવે છે.

		માત્રા/હેક્ટર			છજ્ઞા છેટકાવથી
પાક (કો)	જીવાતનું સામાન્ય નામ	સ.ઘ. (ગ્રામ)	દ્રાવણ (મિ.લી.)	પાસીમાં દ્રાવસ (લીટર)	લણણી વચ્ચેનો સમધ દિવસમાં)
કપાસ	જીંડવાની ઈચળો	14-54	300-400	800-800	58
	ગોલો-મરી,	૧૫-૨૫		900-900	ર૧
	શ્રિપ્સ	૧૫-૨૫		900-500	99
ચોખા	વર્ગીયા, ડખ છેદક, પાનના લીલા તીતીઘોડા, ગાલ મીજ, ક્રિપ્સ, બીપીએચ, ડબલ્યુપીપીએચ, વર્લ મેગટ	19.3	5/10	¥00-900	14
રીંગણા	શૂટ અને કળછેલ્ક	14	300	900-900	Å
ટમેટા	ફળ છેદક ઈચળો	14	300	900-500	, ,

વપરાશ માટેના સચનો: પાક સંરક્ષણના સાધનો ઉપકરણો : બકૅટ સ્પ્રેયર, રૉકિંગ સ્પ્રેયર, સ્ટીરપ પમ્પ સ્પ્રેયર (સિંગલ અને ડબલ બેરલ), નૅપસેક સ્પ્રેયર, ફટ સ્પ્રેયર, વ્હીલ બેરૉ સ્પ્રેયર, કમ્પ્રેશન નૅપસેક સ્પ્રેયર, કમ્પ્રેસન નૅપસેક બેટરી અથવા અસ્પી એચટીપી પાવર સ્પ્રેયર.

સાવચેતી : 1. ખાદ્યપદાર્થો, ખાદ્યપદાર્થના ખાલી પાત્રો અને પશચારાથી દર રાખો. 2. મોં. આંખ અને ત્વચા સાથે સંપર્ક થતો ટાળો. 3. છાંટને શ્વાસમાં ન આવવા દો. પવનની દિશામાં જ છંટકાવ કરો. 4. છંટકાવ કર્યા પછી દૂષિત કપડાં અને શરીરના ભાગો બરોબર ધુઓ. 5. છંટકાવ કરતી વખતે ખાવું પીવું આવવું કે ધૂમ્રપાન કરવું નહીં. 6. મિશ્રણ બનાવતી અને છાંટતી વખતે સંપર્ણ સંરક્ષાત્મક વસ્ત્રો પહેરો.

વનસ્પતિ પર ઝેરી અસર : ખેતર પ્રમાણે ભલામણ કરાયા મુજબ ઉપયોગ કરવામાં આવે તો આ ઉત્પાદન વનસ્પતિ પર ઝેરી અસર નથી કરતું.

ઝેર ચઢયાના લક્ષણો : બેચેની, વ્યાકળતા, ચક્કર આવવા, આંચકી આવવી, ત્વચા પર એલર્જિ થવી, છીંકો આવેવી, નાકમાંથી પ્રવાહી ઝરવું અને નાક બંધ થવું ઇત્યાદિ થઈ શકે છે.

પ્રાથમિક સારવાર : 1. જો ગળી જવાય તો ઊલટી કરાવવા પ્રયત્ન ન કરો અથવા પ્રવાહીન આપો. 2. જો ત્વચા અને વસ્ત્રો દષિત થાય તો વસ્ત્રો કાઢી નાખી દૂષિત ત્વચા પૃષ્કળ સાબુ અને પાણીથી બરોબર ધુઓ. 3. જો આંખો દૃષિત થાય તો 10-15 મિનિટ સુધી પૃષ્કળ સલાઈન/સ્વચ્છ પાણીની છાલક મારી સાફ કરો. 4. જો શ્વાસમાં જાય તો દરદીને શદ્ધ હવામાં લઈ જાઓ.

વિષનાશક : કોઈ ચોક્કસ વિષનાશક જણાતા નથી, લક્ષણો અનુસાર સારવાર કરો. એલર્જિ નિયંત્રિત કરવા એન્ટીહિસ્ટામિન્સ આપી શકાય છે.

ખાલી પાત્રોનો નિકાલ : 1. ખાલી પાત્રો કે વધારાના દ્વાવણ નિકાલ તમ જ પાત્રોની સફાઈ જળ કે પર્યાવરણ પ્રદૂષિત ન થાય તેમ સુરક્ષિત રીતે કરવી જોઈએ. 2. ખાલી પાત્રોનો ફરી ઉપયોગ થતો ટાળવા તેને બહાર રખડતા ન રાખો. 3. ખાલી પાત્રોને તોડી વસતિવાળા પ્રદેશથી દૂર જમીનમાં દાટી દો.

સંગ્રહ માટેની શરતો : 1. જંતનાશક ધરાવતા પાત્રોને અન્ય પદાર્થો ખાસ કરીને ખાદ્યપદાર્થી સંગ્રહ કરાતી જગ્યા કે ઓરડીથી દૂર અલગ જગ્યા કે ઓરડીમાં અથવા તેના પ્રકાર કે માત્રા આધારે અલગ કબાટમાં તાળં-ચાવી મારીને સંગ્રહ કરવા જોઈએ. 2. જંતુનાશકના સંગ્રહ માટેની ઓરડી કે જગ્યા યોગ્ય હવા ઉજાસ, યોગ્ય બાંધકામ ધરાવતી, સકી, ઠંડી અને પરતા વિસ્તારવાળી હોવી જોઈએ જેથી વરાળનો ભરાવો ન થાય.

ગગાયણિક સંયોજન:

કરવો નહીં

S	કુલ	100.00% w/w
સોલ્વંટ (એરોમેક્સ)	બનાવ	યવા પ.મા. w/w
	34% સોલ્વંટ્સ (મીથેનોલ, આઇસોબ્યૂટાનોલ અને એરોમેક્સ 30%)	3.000% w/w
ક્રેસલોક્સ એઈ-5	અલ્કાઈલ બેન્ઝીન સલ્ફોનેટ 36% નું મિશ્રણ, અલ્કાઈલ ફિનોલ ઈથોક્સિલેટ	
	મિશ્રણ, અલ્કાઈલ ફિનોલ ઈથોકિસલેટ 57%, સોલ્વંટ્સ મીથેનોલ,આઈસો- બ્યૂટાનોલ અને એરોમેક્સ 23%)	7.000% w/w
ક્રેસલોક્સ એઈ-4	અલ્કાઈલ બેન્ઝીન સલફોનેટ 20%	
સ.ઘ. ઇમલ્સિફાયર્સ		5.000% w/w
લમ્બડા સાયહલાશ્ર	ન	

સાવધાન: આ લેબલ/પત્રિકા પર ઉદ્ઘોખિત સિવાયના અન્ય પાક પર ઉપયોગ