

अँट्राजीन 50% डब्ल्यु.पी

रसायनझोन

50% डब्ल्यु.पी.

तणनाशक

हे एक असे तणनाशक आहे ज्या मध्ये 50% डब्ल्यु.पी. सक्रीय तत्व आहे आणि अन्य सहायक घटक आहेत. वापरासाठीचे

प्रमाण :

वीक	तणचे नाव	प्रति हेक्टर / प्रमाण			मॅग्रीन पीकेड शेतीत किमान आणि तुलसी (टौनर)
		सायनायड (कि.ग्राम)	ग्लोफॉस्फॉरेट (कि. ग्राम)	पायरोथ्रि (लिटर)	
उसर	शोध, माठ चिमणपथारा दुशी	0.50 -2.00	1.00-4.00	500 -700	-
मका	पावस काटा माठ, शिंपी चिमणपथारा गोखरू, चवळी काळी गवता बंशी जंगली गाू	0.5 - 1.0	1.0 - 2.0	500 -700	-

फवारणीची वेळ: मका: रोप लावणी नंतर लगेच (उत्पावण्या आधी) उस: उगवण्या आधी उस नसलेल्या शेतात वापरावे.उपयोगासाठी शिफारस : फवारण्याची **आउटकरणे** : नॅप्सक स्प्रेयर, कॅप्रेशन नॅप्सक स्प्रेयर, कॅप्रेशन नॅप्सक बॅटरी स्प्रेयर, पर्लेट फॅन किंवा पलंड जेट नोझल सोबत. **काळजी** : १. खाण्याच्या वस्तु किंवा प्राण्यांच्या खाद्यापासून दूर ठेवा. २. तोटा, डोळे व त्वचेच्या संपर्कात आणु नका. ३. श्वसनाद्वारे आत घ्याव्याचे टाळा, सर्वदा वाराच्या दिशेने वापरा. ४.

रासायन शरीरावर किंवा कपड्यावर पडल्यास त्याला भरपुर पाण्याने धुऊन काढा. 5. रासायन वापर करताना काहीही खाणे पीणे धूमपान अथवा पान खाणे टाळा.

6. रासायन वापर करताना सुरक्षीत कपड्यांचा वापर करा, जेणेकरून तुमच्या रासायनाशी प्रत्यक्ष संपर्क होणार नाही. **झाड** : हे उत्पादन शिफारसी प्रमाणे वापरल्यास झाडास हानिकारक नाही. **विषबाधेचे लक्षण**

: डोके दुखने, सर्दी, ऊलटी येणे, चक्कर हे प्राथमिक लक्षण होऊ शकतात. **प्राथमिक उपचारासाठी उपाय :**

1. जर रसायन गिळले असल्यास उलटी करण्यास सांगा. 2. रासायन डोळ्याच्या संपर्कात आले असल्यास

भरपुर स्वच्छ पाण्याने/मिठाळ्या पाण्याने १० ते १५ मिनिटे धुवा. ३. रासायन शरीरावर किंवाकण्डहावर पाण्याने धुऊन घ्यावेत असल्यास त्याला खुप सावया पाण्याने धुऊन घ्यावेत काढा. ४. रासायन वशनाद्वारे आत गेले असल्यासासायन व्यक्तीस मोकळ्या हवेत घेऊन जा. **अॅन्टीजेंट**: कोणतेही विशिश अँटिडोट नाही. दक्षणात्मक उपायय करणे. सुचना: १. ज्या जमीनीत पाण्याचे प्रमाण जास्तसे असलेल अथवा जमीनीत ह्या तगनाशकाचा वापर करण्याधानपूरक करा. २. माहिती पत्रिकेत दिलेल्या पीकांच्यात्तीरीक कोणत्याही पाकावर वापर करू नये.

रिकाभ्या इड्याची विव्हेटाट : १. रिकाभे झालेले डाबून करुन खडयात पुरावे, जेणेकरुन ते लोकवस्ती पुरावा दूर राहतील व त्यांचा पुराहा उपयोग टाळाला जाईल. २. अतिरिक्त सामान्य व फवारणी साठी वापरलेली सामग्री धुउन सामान्यांतर असले पाण्याची वायव्य विव्हेटाट करा जेणेकरुन पाणी आणि पर्यावरण प्रदुषण टाळता येईल.**भंडारा :** १. वरील सामान्यांच्या मूळ अवस्थेत वेळामुळा खोलीत किंवा वेळामुळा जमगेत ठेवा. २. साठवणुकर करण्याची खोली व्यवस्थीत बांधलेली, थंड, हवेशीर, असावी जेणेकरुन त्याचे प्रदुषण होणार नाही. **रासायनिक संरचना :** अंदाजीत तांत्रिकी : ८०% भार/भार, सक्रीय तत्वांवर निगडीत : ६२.५००% भार/भार, एनआयोनिक बेडिंग आणि डिस्पॉझिग घटक (टॅमोल, एन एप ओ) : ३.०००% भार/भार, एनआयोनिक सरपेडिंग घटक (डेडेनॉल-जी) : ५.०००% भार/भार, नॉन आयोनिक ईथीलीन ऑक्सईड अडवट ऑफ अलकॉल फेनॉल (आर एच जी-३११३) : ५.०००% भार/भार, आंतरिक वाहक (चायना माती) : २४.५००% भार/भार. पूर्णतः १००.०००% भार/भार.

इष्टतम री-एंट्री कालावधी: 24 तास.

खबरदारी: या लेबल/पत्रकावर दर्शविलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापरू नका.

அட்ராஜின் 50% டபிள்யு.பி.

இரஸாயன்ஜின்
50% டபிள்யூ.பி.

இது ஒரு செலக்டிவ் களைக்கொல்லி. இதில் இராசாயசைன் 50% எ.ஐ. மற்றும் மீதும் ஏட்ஜுவென்ட்ஸ் உள்ளது.

பரிந்துரைகள் :

[illegible][illegible]

3. **சுருளி:** 1. பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உடனடியாக அட்ரோபின் மருந்தை நாம் உதரியாக ஒவ்வொரு நாளும் 5 முதல் 10 நிமிடங்கள் இடைவெளியில் அட்ரோபின் சல்பேட்டை 2 முதல் 4 மி.கிராம் என்ற அளவில் நாம் உதரியாக உட்கொடுத்துவோம். ஒரு நாளைக்கு நாம் 25 முதல் 50 மி.கிராம் அட்ரோபின் சல்பேட்டையும், நச்சுப்பட்டு அறுகுறிக்கின்ற மூன்று உயிழ்க்கைக்கான பொருத்து அட்ரோபின் தேவையை முடியுமா என்பதையும், 2.2 பி.எம். மருந்தை 1 முதல் 2 கிராம் 10 நிமிடங்களுக்கு ஒரு நிரிசு கணினி, மதுவாக 10-15 மி.கிராம் அளவில் நாம் உதரியாக பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உட்கொடுத்துவோம். **மேயித்து வைத்து:** 1. பூச்சி செலவிட மருந்தின் உள்ள பகுதிகளையும் பட்டாக்களையும் தனித்தனியாக அல்லது பட்டாக்களில் வைத்து பொருட்டாக அல்லது கால்நடைத் தீவனங்கள் வைத்து மிகச்சுருக்கமாக அப்பாக்களின் பாதுகாத்து வைக்கவும். அல்லது தனி அப்பாக்களில் அளவளாவி பூச்சி செலவிடவில்லை என்பதைப் பொறுத்து பூச்சுக் கொல்லிகளை கொலிவை வைப்பதற்கான அந்தக் மருந்து கட்டடங்கள், பேரூது பரிமாணங்களுடனும் நெஞ் கட்டடப்பட்டு, காலத்து, நல்ல வெளிக்சு மற்றும் அட்ரோபினை மருந்தாக திரிபுக்கோடு வேண்டும். ஆகவே காலப்போது கணினிப் பகுதிப்பகுதி இவ்வாறு இருக்க வேண்டும். **நச்சுப்பட்டு அறுகுறிக்க:** தலைவலி, நாசியா, நெஞ்சம், வாந்தி மற்றும் வடிகோரியா. **கவனிக்க:** 1. மிகுந்த நீர் மருந்து அருகில் வைக்க உள்ள இருக்களில் பிறகு கருத்துடன் பயன்படுத்தவும். 2. அப்பகுதிகளில் உள்ள விளக்க குறிப்பிட உள்ள பகுதிகளைத் தவிர வேறு பயிர்களில் பயன்படுத்தக் கூடாது. **இதரபாச கலவை:** அட்ரோபின் டெக்ளின் (பாராஜென்) 80% எது. ஆதாரம்: 62.500 பி.எம்.பி.பி.எம். என் அப்போதிச் சேயுக் கல்பாஸியா என்.என்.என். (டெமோ) என்.என்.என். 3.000 பி.எம்.பி.பி.எம். அஞ்சுதின் ஸல்பேட்டை என்.என்.என். (டெமோ-ஜி): 5.000 பி.எம்.பி.பி.எம். நோன் அப்போதிச் இதழைத் ஆகஸ்டை எட்.ஆப் அப்போதிச் பி.என்.என். (ஆ.ரி.சி 3113) : 5.000 பி.எம்.பி.பி.எம். இரூட் (சைனக்): 24.500 பி.எம்.பி.பி.எம். நெருத்து 100.00% பி.எம்.பி.பி.எம். பி.எம்.பி.எம். மறு நுழைவு காலம்: 24 மணி நேரம்.

అట్రాజిన్ 50% డబ్బూ.పి.

రసాయన్ జిన్
50% డబ్బా.పి.

కలుపు నాశిని

ఇందులో 50% డబ్బాపి డబ్బా/డబ్బా
వద్దాగ్గం మరియు సమతుల్య సహాయకాలను కలిగి
న మోతాదు:

ವಿವರಣೆ	ಕಬ್ಬಿಡುಮಾಕು ನಿಮಿ (ಸಾಧಾರಣ ನಿಮಿ)	ಮಾಪದ/ಪ್ರಾಕೃತಿಕ			ಎಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಘನಗಣಿತ ನಿಮಿ (ಸಾಕಾರಿ)
		ಮಿ.ಮಿ. (ಗ್ರಾ.)	ಪ್ರಾಕೃತಿಕ (ಮಿ.ಮಿ.)	ಪ್ರಾಕೃತಿಕ (ಗ್ರಾ.)	
ಪರಕಪ	ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಕಬ್ಬಿಡುಮಾಕು ನಿಮಿ (ಸಾಕಾರಿ) ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಕಬ್ಬಿಡುಮಾಕು)	0.50-2.00	1.00-4.00	500-700	-
ಮಾಕು ಕಬ್ಬಿಡುಮಾಕು	ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಕಬ್ಬಿಡುಮಾಕು ನಿಮಿ (ಸಾಕಾರಿ) ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಕಬ್ಬಿಡುಮಾಕು)	0.5-1.0	1.0-2.0	500-700	-

[illegible]

ಅಟಾ,ಜಿನ್ 50% ಡಬ್ಬು.ಪಿ.

ರಸಾಯನ್‌ಜಿನ್

ಕಛಿನಾಶಕ

ಇದು ಒಂದು ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 50% ಡಬ್ಲ್ಯು.ಪಿ. ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು ಅಟ್ರಾಜೆನ್ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾವಸ್ತು ಇದ್ದು ಉಳಿದಂತೆ ಇತರ ಅಡ್ಡುವೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

અધ્યારસંગ્રહ:

ವರ್ಗ ಗುಣ	ಕಳೆದ ವರ್ಷದ	ಪ್ರಮಾಣ/ಪ್ರಕೇಶ			ಕೊಡು ಬಂದ ವಿವರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅವಧಿ (ಮಾಸಗಳು)
		ಎ.ಎ. (ರೂ. ಲ.)	ಭಾರ್ತವರ್ಷ (ರೂ. ಲ.)	ಕೊಡು ಬಂದ ಪ್ರಮಾಣ (ರೂ. ಲ.)	
ಕೆಎಸ್	ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ, ಒಟ್ಟು 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದದಡಿ	0.5-1.0	1.0-2.0	500-700	—
ಜೊಳಗ	ಒಟ್ಟು 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದದಡಿ	0.50-2.00	1.00-4.00	500-700	—

[illegible]

অ্যট্রাজিন ৫০% ডব্লু.পি.

রাসায়নজ্ঞান
50% ডব্লু.পি.

আগাছানাশক

এটি একটি আগাছানাশক, যাতে রয়েছে 50% ডব্লিউ.পি. অ্যাট্রাজিন এর সক্রিয় উপাদান ও সহায়ক ভারসাম্যযুক্ত অবস্থায়।

সুপারিশ :

আমার নাম		মাতা/পৈতৃক প্রতি			ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান
শাখা	নাম	মহিলা উপাধায় (কেবল)	মাতৃসমন্বিত (কেবল)	অন্য কোন (সমস্ত)	কর্মের প্রকার (কোন প্রকার নগরী ব্যবসায় নিবাসে চাকরিতে)
আম	পূর্ণিমা রায়চৌধুরী জি.এম.পি. কোম্পানীর বিভিন্ন উপাধায় কর্মরত কর্মচারী	0.50-2.00	1.00-4.00	500-700	
মেজ বা ভূঁট	ইন্দ্রকান্ত রায়চৌধুরী জি.এম.পি. কোম্পানীর বিভিন্ন উপাধায় কর্মরত কর্মচারী প্রতিষ্ঠানের ক্রী.নি.সি. ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ক্রী.নি.সি. নিবাসে চাকরিতে জি.এম.পি. কোম্পানীর কর্মচারী	0.5-1.0	1.0-2.0	500-700	

[illegible]

ছিটিয়ে দেওয়ার ২৪ ঘণ্টা পর এলাকায় প্রবেশ করুন।
সতর্কতা : এই লেবেল / লিফলেটে নির্দিষ্ট ভাবে লিখিত শস
ছাড়া অন্য কোন শস্যে এই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না।

રાસાયનજ્ઞન
50% ડબલ્યુ.પી.

પાક	નિંદાપાત્ર નામ	ફેરફારક પ્રમાણ			છેસા ડાંગર નામ પાક પરખી વાવેલી અનુર (કેવળ)
		કે.આમ. (કે.ગ્રામ)	કે.આમ. (કે.ગ્રામ)	પાણીન પ્રમાણ (લિટર)	
શેરડી	લણી આસો નામ પાકો કૃષકની કૃષી દાખલા/૧૪/૧૩	0.50-2.00	1.00-4.00	500-700	-
પકાઈ	આસોડી કરણીયા, લાલો માવેલીનું ગાંધી દાખલા/૧૪/૧૩ લાલો ગંગોત્રી નામ આસોડી-પરખી અનુર-પરખી અનુરની પકી	0.5-1.0	1.0-2.0	500-700	-

Gujarati

ਰਾਮਾਯਨਜੀਨ
50% ਡਬਲਿਓ.ਪੀ.

ਭਾਸ਼ਾ	ਨਵੀਂ ਰੇ ਵਾਮ	ਪੁਰੀ ਏਕਸ ਮਾਂਗੂ	ਅਗੇਰਲਾ ਸਾਹੀ		
	ਏ.ਆਈ. (ਕਿ.ਯੂ.)	ਭਾਗੁਪਤੀ ਕਿ.ਯੂ.	ਮਾਹੀ ਸੀ ਮਾਂਗੂ (ਕਿ.)		
ਹਿੰਦੀ	ਇੰਸਟਿਟੂਟ, ਖੰਨਾ, ਦੁਆਰ, ਊਲਾ	0.50 - 2.00	1.00 - 4.00	500 - 700	—
ਮੌਲੀ	ਇੰਸਟਿਟੂਟ, ਸਮਾਧੀ, ਜੰਗਲੀ ਭੁਲਾਈ ਭੁਲਾਈ, ਭੁਲਾਈ, ਭੁਲਾਈ	0.5 - 1.0	1.0 - 2.0	500 - 700	—

Punjabi

रासायनजीन
50% डब्ल्यू.पी.

फरकल	खुरपतलारों के नाम	प्रति हेक्टेयर/माणा			औसत फिक्रकल प्रति फरकल फरकल के बीच अंतराल (फिटो मी.)
		रा. कुवाम (कि.फा.),	रामना (कि.फा.),	पानी की माणा	
गन्ना	येक धारा सिंधु खुरप साइदा पुडी, वीली	0.50 - 2.00	1.00 - 4.00	500 - 700	-
मक्का	लखतुल सायदा मालदा, गेफक बंली, येक धारा जिला पीलाव इलावा जिला मीहू	0.5 - 1.0	1.0 - 2.0	500 - 700	-

Hind

RASAYANZINE

50% WP

Crop(s)	Name of Weeds	DOSAGE/ HA			Waiting period between last spray to harvest (in days)
		A.I. (Kg)	Formulation (kg)	Dilution in water (litres)	
Sugar-cane	<i>Portulaca oleracea</i>	0.50-2.00	1.00-4.00	500 -700	—
	<i>Digitaria spp</i>				
	<i>Bathypgia diffusa</i>				
	<i>Euphorbia spp</i>				
Maize	<i>Tribulus terrestris</i>	0.5- 1.0	1.0 -2.0	500 -700	—
	<i>Trianthema monogyna</i>				
	<i>Digera arvensis</i>				
	<i>Echinochloa spp</i>				
	<i>Xanthium strumarium</i>				
	<i>Brachiaria spp</i>				
	<i>Amaranthus viridis</i>				
	<i>Croton viscosus</i>				
	<i>Digitaria spp</i>				
	<i>Polygonum spp</i>				

English

RASAYANZINE
50% WP
HERBICIDE
