ட்ரைஸைக்லாஸோல் 75% w/w

டிரிக்™

(ஸிஸ்4டெமிக் காளான் நாசினி)

ட்ரைஸைக்லாஸோல் 75% டபிள்யுபி மற்றும் மீதி அட்ஜுவன்டஸ் செயல்படும் கூட்டுப் பொருளை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு ஸிஸ்டெமிக் காளான் நாசினி.

ரசாயன கலவை :

ட்ரைஸைக்லாஸோல் டெக்னிகல் (குறைந்த பட்ஸ் தூய்மை 95% w/w a.i.)	78.900% w/w
ஸோடியம் லிக்னோஸல்ஃபனேட்	3.000% w/w
ஸோடியம் லியூரைல் ஸல்ஃபனேட்	3.000% w/w
ஹிஸில் (ஸிந்தெடிக் ஹைட்ரேடெட் ஸிலிகா)	5.000% w/w
பிரெஸிபிடேட் ஸிலிகா)	10.100% w/w
சைனா மண்	10.100% w/w
மொத்தம்	100,000 % w/w

பரிந்துரை :

பயிர்	நோயின் பொதுப் பெயர்	அளவு பிரதி ஹெக்டர் a.i. (g/%)	சூத்திரம் (g)	தண்ணீரில் கடைசி (லிட்)	கடைசி தெளிப்பு முதல் அறுவடை நாள் வரை காத்து இருக்கும் காலம் (நாட்கள்)
நெற்	பயிர் பிளாஸ்ட்	225-300	300-400	500	30

செதி பாதுகாப்பு உபகரணம் :

பிளாட் ஃபேன் மற்றும் ஜெட் நாசில் பொருந்திய நேப்ஸேக் ஸ்பிரேயர்

பாதுகாப்பு :

1. சிறுவர்கள், உணவு பண்டம், காலி உணவு பண்ட பாத்திரம் மற்றும் கால்நடை உணவுகளில் இருந்து தள்ளி வைக்கவும்.
2. வாய், கண் மற்றும் சருமத்துடன் தொடர்பு ஏற்படுவதை தவிர்க்கவும்.
3. தெளிப்பின் புகையை உட்சுவாசிப்பதை தவிர்க்கவும். காற்றின் திசைபயிலேயே தெளிக்கவும்.
4. களங்கப்பட்ட துணிகளையும் உடலின் அங்கங்களை தெளிப்பிற்கு பிறகு நன்கு கழுவவும்.
5. தெளிக்கும் பொழுது புகைக்கவோ அருந்தவோ, உண்ணவோ, சுவைக்கவோ கூடாது.
6. தெளிக்கும்பொழுதும் கலக்கும் பொழுதும் முழுவதும் பாதுகாப்பான உடைகளை அணியவும்.

லீஷத்தன்மை :

பரிந்துரைக்கு ஏற்ப உபயோகம் செய்தால் இந்த பிராடக்ட் விஷமில்லை.

விஷமேறியதன் அறிகுறி :

தலைவலி, தலை சுற்றல், வாந்தி உணர்வு, மற்றும் வாந்தி, மூச்சிழப்பு நேரலாம்.

முதலுதவி நடவடிக்கைகள் :

1. விஷம் ஏறும் பட்ஷத்தில் பாதிக்கப் பட்ட நபர் மயக்கத்தில் இல்லாவிட்டால் அவரை வாந்தி எடுக்க வையுங்கள். நோயாளியை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு கலந்த நீரை குடிக்க வைத்து விட்டு நோயாளியின் தொண்டையின் பின்புறத்தை விரலால் சிலிர்ப்பூட்டி வாந்தி எடுக்க தூண்டுங்கள்.
2. சரும களங்கம் : மாசுபட்ட துணிகளை களைந்து விட்டு பாதிக்கப்பட்ட பாகங்களை கவனமாக சோப் மற்றும் தண்ணீரால் கழுவவும்.
3. கண்ணில் களங்கம் ஏற்பட்டால் : 10 முதல் 15 நிமிடத்திற்கு நிறையை உப்புகலந்த/சுத்தமான தண்ணீரால கழுவவும்.
4. உட்கவாசித்தல் : நோயாளியை காற்றோட்டமான இடத்திற்கு நகர்த்தி உடனடியாய் மருத்துவரை அழைக்கவும்.

மாற்றுமருந்து :

எந்தவித மாற்று மருந்தும் இல்லை. அறிகுறிக்கு ஏற்றவாறு சிகிச்சை அளிக்கவும்.

உபயோகப்படுத்தப்பட்ட பெட்டிகளை களைதல் :

1. உபயோகப்படுத்தப்பட்ட பேக்கேஜ்களோ மீதமு போன பொருட்களோ மற்றும் பூச்சி கொல்லி கழுவிய தண்ணீரோ, பெட்டிகளோ, பாதுகாப்பான முறையில் கற்றுப்புறம் மற்றும் தண்ணீரை களங்கப்படுத்தாது கலைந்து எரியப்பட வேண்டும்.
2. உபயோகப் படுத்தப்பட்ட பேக்கேஜுகள் அவை மறுபடியும் உபயோகம் ஆவதை தடுக்க வெளியே விட்டு வைக்கப்படக் கூடாது.
3. பேக்கேஜுகள் உடைக்கப்பட்டு மனித நடமாட்டம் இல்லாத இடத்தில் புதைக்கப்பட வேண்டும்.

ஸ்டோரேஜ் நிபந்தனைகள் :

1. காளான் நாசினி அடங்கிய இந்த பேக்கேஜுகள் தனிப்பட்ட அறையிலோ அல்லது இடத்திலோ, வேறு பொருட்கள் குறிப்பாக உணவு பண்டங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு இருக்கும் அறைகளோ மற்றும் இடங்களிலிருந்து தள்ளி வைக்கப்பட வேண்டும். காளான் நாசினியின் பரிமாணம் மற்றும் சக்திக்கு தகுந்தவாறு தனிப்பட்ட அலமாரிகளில் பூட்டிவைக்கப்பட வேண்டும்.
2. இந்த காளான் நாசினி மருந்தை சேகரித்து வைக்கும் இடம் நன்கு கட்டப்பட்டு, காய்ந்த, குளுமையான காற்றுவசதி உள்ள இடமாய் தேவைக்கேற்ற அளவில், நீராவியுடன் தொடர்பு ஏற்படாத வாறு இருக்க வேண்டும்.

பிரத்யேக மறு நுழைவு காலம்: 48 மணி நேரம். எச்சரிக்கை: லீஃப்லெட்டில் கூறியது தவிர வேறு எந்த பயிரிலும் பிரயோகம் செய்வது கூடாது.

Tamil

ట్రైసైక్లాజోల్ 75% డబ్ల్యుపి

ట్రిక్™

(వ్యవస్థాగత ఫంగిసైడ్)

ట్రైసైక్లాజోల్ 75% డబ్ల్యు పి, త్వరితంగా ఫలితాన్నిచ్చే ట్రైసైక్లాజోల్ 75% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు మరియు ఇతర సదార్థాలతో తయారైన ఒక వ్యవస్థాగత ఫంగిసైడ్.

రసాయన కూర్పు :

ట్రైసైక్లాజోల్ టెక్నికల్ (కనీస శుద్ధత 95% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు ఎ.ఐ.)	78.900% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
సోడియం లిగ్నోసల్ఫోనేట్	3.000% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
సోడియం లారిల్ సల్ఫేట్	3.000% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
సిసిల్ (సింథెటిక్ హైడ్రేటెడ్ సిసిలికా)	5.000% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
చైనా క్లే	10.100% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
మొత్తం :	100,000% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు

సిఫార్సు :

పంట	పేరు	హెక్టారుకు తగిన మోతాదు సాధారణంగా వచ్చు రోగం	ఎ.ఐ. (గ్రా/%)	మోతాదు (గ్రా)	నీటిలో నలపిన పరిమాణం (లీటర్)	చివరి స్ప్రే మరియు పంట చివరిదశకి మధ్య ఉండవలసిన సమయం (రోజులలో)
వరి	బ్లాస్ట్		225 - 300	300 -400	500	30

మొక్కను రక్షణ సంచితో పరిశీలనము :

సమతల సంకా మరియు జెట్ నాజిల్ కలిగిన న్యాప్ శ్యాక్ స్ప్రేయర్.

జాగ్రత్తలు :

1. పిల్లలు, తినబందారాలు, తినే సదార్థాలకి నాడబడిన కంటెయినర్లు మరియు జంతువులు తినే సదార్థాల నుండి తగలకుండా దూరంగా ఉంచాలి.
2. నోటికి, కళ్ళకి మరియు చర్మానికి తగల్చరాదు.
3. స్ప్రే పొగని పీల్చరాదు. గాలివాటు వైపుకి స్ప్రే చేయండి.
4. స్ప్రే చేసిన తరువాత కలుషితమైన బట్టలు, శరీర భాగాలను శుభ్రంగా నీటితో కడగండి.
5. స్ప్రే చేసే సమయంలో పొగ త్రాగడం, తాగడం, తినడం, నమలటం వంటి పనులు చేయరాదు.
6. నిక్స్ చేసేటప్పుడు, స్ప్రే చేసేటప్పుడు పూర్తి రక్షణ నిచ్చే దుస్తులు వేసుకోవాలి.

సైడోఎఫెక్ట్స్ :

సిఫార్సు చేసిన విధంగా వాడినచో ఇది మొక్కలకు నష్టపూరితం కాదు.

విష లక్షణాలు :

తలదొప్పి, తలతిరగడం, వాంతులు, వికారం మరియు మూర్ఛ వంటివి రాగలవు.

ప్రథమ చికిత్స :

1. ఇది నోటిలోనికి పోయినట్లయితే, రోగికి తెలివి తప్పనట్లయితే వారిచే వాంతి చేయించాలి. రోగి చేత ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు కలిపిన గ్లాసు నీటిని తాగించి, గొంతులో వేళ్ళు దూర్చయినా వాంతి చేయించాలి.
2. చర్మానికి తాకినచో : తడిసిన గుడ్డని తొలగించి, తాకిన భాగాలను జాగ్రత్తగా సబ్బుతో మరియు నీటితో శుభ్రంగా కడగాలి.
3. కంటికి తాకినచో : 10 నుండి 15 వియిషాల పాటు సెలైను లేదా శుభ్రమైన నీటితో బాగా కళ్ళు కడగాలి.
4. పీల్చినచో : రోగిని తాజా గాలి తగిలే చోటుకి చేర్చి తక్షణం వైద్యున్ని పిలవాలి.

విరుగుడు :

ప్రత్యేక విరుగుడు లేదు. నిపుణులను బట్టి చికిత్స చేయాలి.

వాడిన కంటెయినర్ల తొలగింపు :

1. వాడిన ప్యాకేజీలు లేదా మిగిలిన సదార్థాలను, ఫంగిసైడు మరియు కంటెయినర్లు కడుగగా వెలువడిన నీటిని సరియైన మరియు నీటి కాలువ్యం నుండి రక్షించడానికి జాగ్రత్తగా పారవేయవలెను.
2. నాడబడిన ప్యాకేజీలు తిరిగి నాడబడకుండా బయట వదలివేయరాదు.
3. తిరిగి వాడుకకు వీలులేకుండా ప్యాకేజీలు విరగ్గొట్టి పాతిపెట్టవలెను.

నిలువకు నిబంధనలు :

1. ఫంగిసైడ్‌లు కలిగిన ఈ ప్యాకేజీలను ప్రత్యేక గదులు లేక ఆవరణలో అనగా ఇతర వస్తువులు నిల్వ చేయుట గదులు లేక ఆవరణలకు సమ్ముఖంగా తినబందారాలకు దూరంగా, ఈ ఫంగిసైడ్ యొక్క పరిమాణం మరియు తత్త్వాన్ని బట్టి విడిగా అలమారులో తాళం వేసి ఉంచాలి.
2. ఈ ఫంగిసైడు నిల్వ చేయు గదులు మరియు ఆవరణలు కాలువ్యం మరియు ఆవిరి రాకుండా పాడిగా, చల్లగా ఉండి వెలుతురు మరియు గాలి బాగా వచ్చేలా తగిన కొంతలు కలిగి యుండాలి.

పీఏకారి చేసిన పిదప ప్రవేశించు వ్యవధి : 48 గంటలు

హెచ్చరిక : **లేబల్/లీఫ్‌లెట్‌లో పేర్కొన్న పంటలకు కాకుండా ఇతర పంటలకు దీనిని వాడకూడదు.**

Telugu

ট্ৰাইসাইক্লাজোল ৭৫% ডব্লু পি

ট্ৰিক™

(শস্যের সকল অংশে কার্য্যকর ছত্রাকনাশক)

ট্রাইসাইক্লাজোল ৭৫% ডব্লু পি যার মূল কার্য্যকর উপাদান ট্রাইসাইক্লাজোল ৭৫% ডব্লু/ ডব্লু, শস্যের সকল অংশে কার্য্যকর এক ছত্রাকনাশক।

রাসায়নিক গঠন :

ট্রাইসাইক্লাইজোল টেকনিক্যাল (সর্বনিম্ন ৯৫% ডব্লু/ ডব্লু এ. আই.)	৭৮.৯০০% ডব্লু/ ডব্লু
সোডিয়াম লিগনোসালফোনেট	৩.০০০% ডব্লু/ ডব্লু
সোডয়াম লিইউরাইল সালফোনেট	৩.০০০% ডব্লু/ ডব্লু
হিসিল (সিন্থেটিক হাইড্রেটেড প্রেসিপেটেড সিলিকা)	৫.০০০% ডব্লু/ ডব্লু
চিনা মাটি	১০.১০০% ডব্লু/ ডব্লু
মোট :	১০০.০০০% ডব্লু/ ডব্লু

নির্দেশিকা :

শস্য	রোগের সাধারণ নাম	প্রতি হেক্টরে মাত্রার পরিমাণ এ.আই. (গ্রাম/%)	ফর্মুলেশন (গ্রাম)	জলে তরলীকরণ (লিটারে)	শেষবার ছোটানো থেকে ফসল প্রাপ্তির সময় (দিন সংখ্যায়)
ধান	ব্লাস্ট	২২৫–৩০০	৩০০–৪০০	৫০০	৩০

শস্যরক্ষার যন্ত্রাদি :

ফ্ল্যাট ফ্যান ও জেট নজল-সহ ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার

সাবধানতা :

১. শিশু, খাবার জিনিস, খালি খাবারের পাত্র এবং জীবজন্তুর খাবার থেকে দূরে রাখুন।
২. মুখ, চোখ ও ত্বকের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকুন।
৩. স্প্রে থেকে বেরোনো অতি ছোটো কণাগুলি নাকে টেনে নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। হাওয়ার দিকে স্প্রে করুন।
৪. ছেটানোর পর দূষিত হয়ে যাওয়া জামা-কাপড় এবং শরীরের অংশগুলি খুব ভালো করে ধুয়ে নিন।
৫. যখন স্প্রে করবেন ধূমপান, পান, কিছু খাওয়াদাওয়া করবেন না বা চিবাবেন না।
৬. মেশানো বা স্প্রে করার সময় সম্পূর্ণ সুরক্ষিত জামাকাপড় পরে নেবেন।

শস্যের উপর বিষক্রিয়া :

নির্দেশিকা অনুযায়ী ব্যবহার করলে ছত্রাকনাশকটি শস্যের উপর বিষক্রিয়া করে না।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ :

মাথা ধরা, ঝিমঝিম ভাব, বমি এবং খিঁচুনি হতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা পদ্ধতি :

১. গলাধঃকরণ হয়ে গেলে, যদি রোগী অজ্ঞান না হয়ে থাকে রোগীকে বমি করাতে হবে। রোগীকে এক টেবিল-চামচ নুন দিয়ে এক গ্লাস জল খাওয়াতে হবে এবং বমি করাতে একটি আঙ্গুল দিয়ে রোগীর গলার পিছনে হালকা চাপ দিতে হবে।
২. ত্বক-দূষণ: দূষিত জামা কাপড় খুলে ফেলতে হবে এবং শরীরের যেসব অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেগুলি সাবান ও জল দিয়ে সাবধানে ধুয়ে ফেলতে হবে।
৩. চোখ-দূষণ: চোখে ১০ থেকে ১৫ মিনিট প্রচুর নুনজল/পরিষ্কার জলের ঝাপটা দিতে হবে।
৪. শ্বাসবায়ুর সাথে প্রবেশ : রোগীকে নির্মল বাতাসে সরিয়ে নিতে হবে ও সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসককে ডেকে পাঠাতে হবে।

প্রতিষেধক :

কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষেধক জানা নেই। লক্ষণ অনুযায়ী করতে হবে।

ব্যবহৃত পাত্র বর্জনের পদ্ধতি :

১. প্যাকেট / পাত্রগুলি অথবা বাড়তি কীটনাশক ও যন্ত্রাদি ও পাত্র ধোয়া জল বর্জন পদ্ধতি এমন হবে তা যেন পরিবেশ বা জলদূষণ না করে।
২. পুনরায় ব্যবহার করা আটকাতে ব্যবহৃত প্যাকেট / পাত্রগুলি বাইরে ফেলে রাখা উচিত নয়।
৩. প্যাকেট / পাত্রগুলি ভেঙ্গে ফেলতে হবে ও বসতি থেকে দূরে কোথাও মাটির নীচে পুঁতে ফেলতে হবে।

রাখার পদ্ধতি :

১. ছত্রাকনাশকের প্যাকেট/পাত্রগুলি এমন আলাদা ঘরে বা জায়গায় রাখতে হবে যেটি অন্যান্য জিনিসপত্র বিশেষ করে খাদ্যসামগ্রী রাখার ঘর বা জায়গা থেকে দূরে হয় অথবা ছত্রাকনাশকের পরিমাণ ও প্রকৃতি বুঝে সম্পূর্ণ আলাদা আলমারিতে তালা দিয়ে দিয়ে রাখা উচিত।
২. নির্গত বিষাক্ত বাতাসের দূষণ এড়ানোর জন্য যে ঘর বা জায়গা কীটনাশক রাখার জন্য ব্যবহৃত হবে সেটিকে পোক্ত, শুকনো, যথেষ্ট আলো ও বাতাসযুক্ত এবং আকারে যথেষ্ট বড় হতে হবে।

ছিটিয়ে দেওয়ার ৪৮ ঘণ্টা পর এলাকায় প্রবেশ করুন।

সতর্কতা ঃ এই লেবেল / লিফলেটে নির্দিষ্ট ভাবে লিখিত শস্য ছাড়া অন্য কোন শস্যে এই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না।

Bengali

ট্রাইসাইক্লাজোল ৭৫% ডব্লু পি

ট্রিক™

(সুব্যবস্থিত ফিঙ্গিনাশক)

সক্রিয় উপাদান ট্রাইসাইক্লাজোল ৭৪% ডব্লু/ডব্লু এবং প্রবশিষ্ট আডজুভান্ট্স্ আধাধিরি ট্রাইসাইক্লাজোল ৭৪% ডব্লু পি হেডজি এক সুব্যবস্থিত ফিঙ্গিনাশক।

রাসায়নিক মিশ্রণ :

ট্রাইসাইক্লাজোল টেকনিকাল (সর্বনিম্ন বিশুদ্ধতা ৯৫% ডব্লু/ডব্লু এ আই)	৭৮.৫০০% ডব্লু/ডব্লু
সোডিয়াম লিগ্নোসলফোনেট্	৩.০০০% ডব্লু/ডব্লু
সোডিআম লুরিল সলফোনেট্	৩.০০০% ডব্লু/ডব্লু
হিসিল (সিন্থেটিক হাইড্রেটেড প্রিসিপেটেড সিলিকা)	৫.০০০% ডব্লু/ডব্লু
চায়না ক্লে	১০.৫০০% ডব্লু/ডব্লু
মোট:	১০০.০০০% ডব্লু/ডব্লু

অনুমোদন :

শস্য	রোগের সাধারণ নাম	হেক্টরের প্রতি মাত্রা এ.আই. (গ্রা:/%)	ফর্মুলেশন (গ্রা:)	পানিতে দ্রবন (লিটর)	শেষ স্প্রে এবং আসন্ন সময়ের অপেক্ষা বসয় (দিন)
ধান	ব্লাষ্ট	২২৫–৩০০	৩০০–৪০০	৫০০	৩০

গরুর সুরক্ষা উপকরণ :

ফ্ল্যাট ফ্যান ও ডেজ় নোজল সহ স্যুল্ন ন্যাপস্যাক স্প্রেয়র।

সাবধানতা :

১। পিনামালকতাঁরু, খাদ্যসামগ্রীতাঁরু, খাদ্যসামগ্রীর খালি পাত্রতাঁরু এবং প্রস্তুত খাদ্যতাঁরু দূরেরে রখন্তু।
২। মুখ, চক্ষু আক গাব–ছালব সৈতে সংস্পর্শব পৰা আঁতৰত থাকিব।
৩। স্প্রেৰ পৰা ওলোৱা বব সৰু সৰু কণাবোৰ নাকেৰে টানি লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক। বতাহ যি ফালে বৈছে সেই ফালে স্প্রে কৰক।
৪। ছটিওৱাৰ পিচত দূষিত হৈ যোৱা কাপোৰ–কানি আৰু শৰীৰৰ অংশবোৰ ভালকৈ ধুই লব।
৫। যেতিয়া স্প্রে কৰিব তেতিয়া পান কৰা, ধূমপান, খোৱা–বোৱা নকৰিব। আনকি একোকে নোচোবাব।
৬। মিহলোৱা বা স্প্রে কৰাৰ সময়ত সম্পূর্ণ সুৰক্ষিত কাপোৰ–কানি পিন্ধিব।

বিষক্রিয়াৰ লক্ষণ ঃ

মূৰ কামোৰাণি, টিংটিঙুৱা, বমি, খিচনি হ'ব পাৰে।

প্রাথমিক চিকিৎসা পদ্ধতি :

১। গলাধঃকৰণ হৈ গ'লে, যদি ৰোগী অজ্ঞান নহৈ থাকে তেন্তে ৰোগীক বমি কৰাব লাগি। ৰোগীক এচামুচ নিমখ মিহলাই এগিলাচ পানী খোৱাব লাগিব আৰু বমি কৰোৱাবলৈ আঙ্গুলিৰে ডিঙিব পিচফালে লাহেঁকে হেঁচা মাৰক।
২। গাৰ ছাল দূষণ : দূষিত কাপোৰ–কানি খুলি পেলাব লাগিব আৰু শৰীৰৰ যি যি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে সেইবোৰ ঠাই চাবোল আৰু পানীৰে সাৱধানে ধুই পেলাব লাগিব।
৩। চকু–দূষণ : চকুত ১০–ৰ পৰা ১৫ মিনিট লোণীয়া / পৰিষ্কাৰ পানীৰে ছটিয়াব লাগিব।
৪। শ্বাস–বায়ুৰ সৈতে প্রবেশ : ৰোগীক নিৰ্মল মুকলি বতাহত আঁতৰাই নিব আৰু লগে লগে ডাক্তৰক মাতি পঠিয়াব।

প্রতিষেধক :

কোনো নিৰ্দিষ্ট প্রতিষেধক নাই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা কৰাব লাগিব।

ব্যৱহৃত পাত্র বর্জনৰ পদ্ধতি :

১। পেকেট / পাত্রবোৰ বা উপকৰা কাঠফুলানাশক আৰু যন্ত্রাদি আৰু পাত্র ধোৱা পানী বর্জন পদ্ধতি এনেকুৱা হ'ব লাগিব সেইটোৱে যেন পৰিবেশ বা পানী দূষণ প্রতিবোধ কৰে।
২। পুনৰ ব্যৱহাৰ বোধ কৰিবলৈ ব্যৱহৃত পেকেট / পাত্রবোৰ বাহিৰত পেলাই ৰখাটো উচিৎ নহয়। সেই ফালে চকু ৰাখিব।
৩। পেকেট / পাত্রবোৰ ভাঙি পেলাব লাগিব আৰু বসতিৰ পৰা দূৰেত মাটিত পুতি পেলাব লাগিব।

ৰখাৰ পদ্ধতি :

১। কাঠফুলানাশকৰ পেকেট / পাত্রবোৰ বেলেগ কোঠালি বা ঠাইত ৰাখিব লাগিব যি আন আন বস্তু–বাহানি বিশেষকৈ খাদ্যসামগ্রী ৰখাব ঘৰ বা ঠাইৰ পৰা যেন দূৰেত হয় বা কাঠফুলানাশকৰ পৰিমাণ আৰু প্রকৃতি বুজি সম্পূর্ণ বেলেগ আলমাৰিত তলা–চাবি মাৰি ৰখা উচিৎ।
২। নির্গত বিষাক্ত বতাহৰ দূষণ এৰাবৰ বাবে যি ঘৰ বা ঠাই কাঠফুলানাশক ৰাখিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব সেইটো মজবুত, শুকান, যথেষ্ট পোহৰ আৰু বতাহযুক্ত আৰু আকাৰক যথেষ্ট ডাঙৰ হ'ব লাগিব।

ছটিয়াই দিয়াৰ ঃ ৪৮ ঘণ্টা পিছত এলেকাত প্রবেশ কৰিব।

এয়াহ নির্দিষ্ট কৰা এৰি আন শস্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। লেবেল/লিফলেট

Oriya

ট্রাইচাইক্লাজ'ল ৭৫% ডব্লিউ পি

ট্রিক™

(শস্যৰ সকলো অংশতে কাৰ্যকৰী কাঠফুলানাশক)

ট্রাইচাইক্লাজ'ল ৭৫% ডব্লিউ পি যাৰ মূল কাৰ্যকৰী উপাদান ট্রাইচাইক্লাজ'ল ৭৫% ডব্লিউ / ডব্লিউ, শস্যৰ সকলো অংশতে কাৰ্যকৰী এক কাঠফুলানাশক।

ৰাসায়নিক গঠন :

ট্রাইচাইক্লাজ'ল টেকনিকল (সৰ্বনিম্ন বিশুদ্ধতা ৯৫% ডব্লিউ / ডব্লিউ এ. আই.)	৭৮.৯০০% ডব্লিউ/ডব্লিউ
ছ'ডিয়াম লিগন'ছালফ'নেট	৩.০০০% ডব্লিউ/ডব্লিউ
ছ'ডিয়াম লিইউৰাইল ছালফ'নেট	৩.০০০% ডব্লিউ/ডব্লিউ
হিছিল (ছিন্থেটিক হাইড্ৰেটেড প্ৰেচিপেটেড ছিলিকা)	৫.০০০% ডব্লিউ/ডব্লিউ
চীনা মাটি	১০.১০০% ডব্লিউ/ডব্লিউ
মূঠ :	১০০.০০০% ডব্লিউ/ডব্লিউ

নিৰ্দেশিকা :

শস্য	ৰোগৰ সাধাৰণ নাম	প্ৰতি হেক্টৰত মাত্ৰাৰ পৰিমাণ এ. আই (গ্ৰা/%)	ফৰ্মুলেশ্বন (গ্ৰা/%)	পানীত তৰলীকৰণ (লিটাৰ)	শেষবাৰ ছটিওৱাৰ পৰা শস্য প্ৰাপ্তি সময় (দিন সংখ্যাত)
ধান	ব্লাষ্ট	২২৫–৩০০	৩০০–৪০০	৫০০	৩০

শস্য বক্ষাৰ যন্ত্ৰাদি :

ফ্লেট ফেন আৰু জেট নজল সহ নেপছেক স্প্রেয়াৰ।

সাৱধানতা :

১। শিশু, খোৱা বস্তু, খালি খোৱা বস্তুৰ পাত্ৰ আৰু জীৱ–জন্তুৰ আহাৰৰ পৰা দূৰেত ৰাখিব।
২। মুখ, চকু আৰু গাৰ–ছালৰ সৈতে সংস্পৰ্শৰ পৰা আঁতৰত থাকিব।
৩। স্প্রেৰ পৰা ওলোৱা বব সৰু সৰু কণাবোৰ নাকেৰে টানি লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক। বতাহ যি ফালে বৈছে সেই ফালে স্প্রে কৰক।
৪। ছটিওৱাৰ পিচত দূষিত হৈ যোৱা কাপোৰ–কানি আৰু শৰীৰৰ অংশবোৰ ভালকৈ ধুই লব।
৫। যেতিয়া স্প্রে কৰিব তেতিয়া পান কৰা, ধূমপান, খোৱা–বোৱা নকৰিব। আনকি একোকে নোচোবাব।
৬। মিহলোৱা বা স্প্রে কৰাৰ সময়ত সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত কাপোৰ–কানি পিন্ধিব।

বিষক্রিয়াৰ লক্ষণ ঃ

মূৰ কামোৰাণি, টিংটিঙুৱা, বমি, খিচনি হ'ব পাৰে।

প্রাথমিক চিকিৎসা পদ্ধতি :

১। গলাধঃকৰণ হৈ গ'লে, যদি ৰোগী অজ্ঞান নহৈ থাকে তেন্তে ৰোগীক বমি কৰাব লাগি। ৰোগীক এচামুচ নিমখ মিহলাই এগিলাচ পানী খোৱাব লাগিব আৰু বমি কৰোৱাবলৈ আঙ্গুলিৰে ডিঙিব পিচফালে লাহেঁকে হেঁচা মাৰক।
২। গাৰ ছাল দূষণ : দূষিত কাপোৰ–কানি খুলি পেলাব লাগিব আৰু শৰীৰৰ যি যি অংশ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে সেইবোৰ ঠাই চাবোল আৰু পানীৰে সাৱধানে ধুই পেলাব লাগিব।
৩। চকু–দূষণ : চকুত ১০–ৰ পৰা ১৫ মিনিট লোণীয়া / পৰিষ্কাৰ পানীৰে ছটিয়াব লাগিব।
৪। শ্বাস–বায়ুৰ সৈতে প্ৰবেশ : ৰোগীক নিৰ্মল মুকলি বতাহত আঁতৰাই নিব আৰু লগে লগে ডাক্তৰক মাতি পঠিয়াব।

প্ৰতিষেধক :

কোনো নিৰ্দিষ্ট প্ৰতিষেধক নাই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা কৰাব লাগিব।

ব্যৱহৃত পাত্ৰ বৰ্জনৰ পদ্ধতি :

১। পেকেট / পাত্ৰবোৰ বা উপকৰা কাঠফুলানাশক আৰু যন্ত্ৰাদি আৰু পাত্ৰ ধোৱা পানী বৰ্জন পদ্ধতি এনেকুৱা হ'ব লাগিব সেইটোৱে যেন পৰিবেশ বা পানী দূষণ প্ৰতিবোধ কৰে।
২। পুনৰ ব্যৱহাৰ বোধ কৰিবলৈ ব্যৱহৃত পেকেট / পাত্ৰবোৰ বাহিৰত পেলাই ৰখাটো উচিৎ নহয়। সেই ফালে চকু ৰাখিব।
৩। পেকেট / পাত্ৰবোৰ ভাঙি পেলাব লাগিব আৰু বসতিৰ পৰা দূৰেত মাটিত পুতি পেলাব লাগিব।

ৰখাৰ পদ্ধতি :

১। কাঠফুলানাশকৰ পেকেট / পাত্ৰবোৰ বেলেগ কোঠালি বা ঠাইত ৰাখিব লাগিব যি আন আন বস্তু–বাহানি বিশেষকৈ খাদ্যসামগ্ৰী ৰখাব ঘৰ বা ঠাইৰ পৰা যেন দূৰেত হয় বা কাঠফুলানাশকৰ পৰিমাণ আৰু প্ৰকৃতি বুজি সম্পূৰ্ণ বেলেগ আলমাৰিত তলা–চাবি মাৰি ৰখা উচিৎ।
২। নিৰ্গত বিষাক্ত বতাহৰ দূষণ এৰাবৰ বাবে যি ঘৰ বা ঠাই কাঠফুলানাশক ৰাখিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব সেইটো মজবুত, শুকান, যথেষ্ট পোহৰ আৰু বতাহযুক্ত আৰু আকাৰক যথেষ্ট ডাঙৰ হ'ব লাগিব।

ছটিয়াই দিয়াৰ ঃ ৪৮ ঘণ্টা পিছত এলেকাত প্ৰবেশ কৰিব।

এয়াহ নির্দিষ্ট কৰা এৰি আন শস্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। লেবেল/লিফলেট

Assamese

ട്രൈസൈക്ലാസോൾ 75% ഡബ്ലിയു പി.

ട്രിക്ക് TM

(സിസ്റ്റെമിക് ഫൻഗിസൈഡ്).

ട്രൈസൈക്ലാസോൾ 75% ഡബ്ലിയു പി, ട്രൈസൈക്ലാസോൾ 75% W/W വും ബാക്കി സഹായകരമായ വസ്തുക്കളുമുള്ള സജീവമായ ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റെമിക് ഫൻഗിസൈഡ് ആണ്.

കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ :

ട്രൈസൈക്ലാസോൾ ടെക്നിക്കൽ

(ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശുദ്ധി 95 W/W a.i)	78.900% W/W
സോഡിയം ലിഗ്നോസൾഫോനേറ്റ്	3.000% W/W
സോഡിയം ലൂറൈൽ സൾഫോനേറ്റ്	3.000% W/W
ഹിസിൽ (സിന്തെറ്റിക്ക് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് സിലിക്ക)	5.000% W/W
ചൈന ക്ലെ	10.100% W/W
ആകെ :	100.000%W/W

നിർദ്ദേശം :

	ഓരോ ഹെക്ടറിനുമുള്ള അളവ്				
വിളവ്	രോഗത്തിന്റെ സാധാരണ പേര്	എ.ഐ. (ഗ്രാം /%)	ഫോർമുലേഷൻ (ഗ്രാം)	വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിക്കൽ (ലിറ്റർ)	അവസാനത്തെ സ്പ്രേ മുതൽ വിളവെടുപ്പു വരെയുള്ള കാത്തിരിപ്പു സമയം (ദിവസങ്ങളിൽ)
നെല്ല്	ബ്ലാസ്റ്റ്	225-300	300-400	500	30

സസ്യ സംരക്ഷണ ഉപകരണം :

ഫ്ലാറ്റ് ഫാനും ജെറ്റ് നോസിലും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നാപ്സാക്ക് സ്പ്രെയർ

മുൻകരുതലുകൾ :

1. കുട്ടികൾ, ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ, ഒഴിഞ്ഞ ഭക്ഷണ സാധന പാത്രങ്ങൾ, കാലിത്തീറ്റകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും ദൂരെ സൂക്ഷിക്കുക.
2. വായ, കണ്ണുകൾ, ത്വക്ക് എന്നിവയിൽ തട്ടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
3. സ്പ്രെ ധൂളികൾ ശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കാറ്റിന്റെ ഗതിക്കനുസരിച്ച് സ്പ്രെ ചെയ്യുക.
4. സ്പ്രെ ചെയ്തതിനുശേഷം മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങളും ശരീരഭാഗങ്ങളും നന്നായി കഴുകുക.
5. സ്പ്രെ ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ പുകവലിക്കുകയോ, കുടിക്കുകയൊതിന്നുകയൊ എന്തെങ്കിലും വായിലിട്ടു നുണയുകയോ ചെയ്യരുത്.
6. കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും സെപ്ര ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുഴുനീള സംരക്ഷണ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

ഫൈറ്റൊ ടോക്സിസിറ്റി :

പ്രവർത്തനമണ്ഡല നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഉല്പന്നം ഫോട്ടോടോക്സിക്ക് അല്ല.

വിഷബാധാലക്ഷണങ്ങൾ :

തലവേദന, തലകറക്കം, വയറുവേദന, കണ്ണുവിക്കം, വിറയൽ, കിടുക്കം

പ്രഥമ ശുശ്രൂഷാഉപാധികൾ :

1. ഭക്ഷണത്തിൽക്കൂടിയാണെങ്കിൽ ആൾക്ക് ബോധക്കേടില്ലെങ്കിൽ ഛർദ്ദിപ്പിക്കുക. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ ഉപ്പു കലർത്തി രോഗിയെ കുടിപ്പിക്കുകയും തൊണ്ടയിൽ വിരലുപയോഗിച്ച് ഛർദ്ദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.
2. ത്വക്ക് മലിനീകരണം : അഴുക്കു വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റുകയും ബാധിച്ച ശരീരഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സോപ്പും വെള്ളവുമുപയോഗിച്ച് കഴുകുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.
3. കണ്ണിലെ മലിനീകരണം : ഉപ്പുവെള്ളമോ ശുദ്ധജലമോ ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ച് 10 മുതൽ 15 മിനിട്ടുവരെ കണ്ണിലടിച്ചു കഴുകുക.
4. ശ്വാസത്തിലൂടെ അകത്തു കടന്നാൽ : രോഗിയെ ശുദ്ധവായു ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുകയും ഒരു ഡോക്ടറെ ഉടനെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യുക.

മറുമരുന്ന് :

പ്രത്യേക മറുമരുന്നകളൊന്നും അറിയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചികിത്സിക്കുക.

ഉപയോഗിച്ച കണ്ടെയ്നറുകൾ ഉപേക്ഷിക്കൽ :

1. പരിസ്ഥിതിയും വെള്ളവും മലിനമാകുന്നത് തടയാൻ ഉപയോഗിച്ച പാക്കേജുകളും അധികം വന്ന സാധനങ്ങളും ഫംഗിസൈഡും പാത്രങ്ങളും കഴുകിയതു വളരെ സുരക്ഷിതമായി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
2. വിണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടയാൻ ഉപയോഗിച്ച പാക്കേജുകൾ പുറത്തിടരുത്.
3. പാക്കേജുകൾ തുണ്ടുകളാക്കി ജനവാസമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ദൂരെ കുഴിച്ചിടണം.

സംഭരണ വ്യവസ്ഥകൾ :

1. ഫഗിസൈഡുള്ള പാക്കേജുകൾ മറ്റു സാധനങ്ങളുള്ള മുറികളിൽ നിന്നും ചുറ്റുപാടുകളിൽനിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവയിൽ നിന്നും മാറ്റി വേറെ മുറികളിൽ സംരംഭിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഫൻഗിസൈഡിന്റെ അളവും പ്രകൃതവുമനുസരിച്ച് വേറെ അലമാരകളിൽ പൂട്ടി വെക്കേണ്ടതാണ്.
2. ആവികൊണ്ട് മലിനമാകുന്നതകു ഒഴിവാക്കാൻ മുറികളും പരിസരവും ആവശ്യത്തിനു വലിപ്പമുള്ളതും നനവില്ലാത്തതും കാറ്റും വെളിച്ചവുമുള്ളതും തണുമുള്ളതും ആയി പണിയേണ്ടതാണ്.

തിരികെ പ്രവേശിക്കേണ്ട സമയം : 48 മണിക്കൂർ

ശ്രദ്ധിക്കുക : ഈ ലിഫ് ലെറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിളകളിൽ മാത്രം അല്ലാതെ മറ്റു വിളകളിൽ ഇത് ഒരു കാരണവശാലും ഉപയോഗിക്കരുത്

Malayalam

ಟ್ರೈಸಿಕ್ಲಾಜೋಲ್ 75% ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ

ಟ್ರಿಕ್ TM

(ಸಿಸ್ಟೆಮಿಕ್ ಶಿಲೀಂದ್ರ ನಾಶಕ)

ಟ್ರೈಸಿಕ್ಲಾಜೋಲ್ 75% ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿಯಾ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಟ್ರೈಸಿಕ್ಲಾಜೋಲ್ 75% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲ ಸಹಾಯಕ ದ್ರವ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಿಲೀಂದ್ರ ನಾಶಕವಾಗಿದೆ.

ರಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ :

ಟ್ರೈಸಿಕ್ಲಾಜೋಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್

(ಕನಿಷ್ಠ ಶುದ್ಧತೆ 95% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ.ಐ.)	78.900% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಸೋಡಿಯಂ ಲಿಗ್ನೋಸಲ್ಫೋನೇಟ್	3.000% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಸೋಡಿಯಂ ಲೂರಿಲ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್	3.000% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಹಿಸಿಲ್ (ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೆಟೆಡ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೆಡ್ ಸಿಲಿಕಾ)	5.000% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಚೈನಾ ಕ್ಲೇ	10.100% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಒಟ್ಟು :	100.000% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ

ಶಿಫಾರಸು :

		ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಪರಿಮಾಣ			
ಬೆಳೆ	ರೋಗದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು	ಎ.ಐ. (ಜಿ/%)	ಸಂಯೋಜನೆ (ಜಿ)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸುವಿಕೆ (ಲೀಟರ್)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆ ಹಾಗೂ ಕೊಯ್ಲಿನ ನಡುವಿನ ಅಂತರ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
ಭತ್ತ	ಬ್ಲಾಸ್ಟ್	225-300	300-400	500	30

ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಉಪಕರಣ :

ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಜೆಟ್ ನಾಸಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ :

1. ಮಕ್ಕಳು, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಆಹಾರದ ಖಾಲಿ ಸಂಗ್ರಾಹಕಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಿನ್ನುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಿ.
2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಇದು ಬಾರದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿರಿ.
3. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಂಪರಣೆಯ ಆವಿಯ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿರಿ.
4. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಧೂಷಣೆಗೊಂಡ ಉಡುಪು ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
5. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನನ್ನಾದರೂ ತಿನ್ನುವುದು, ಅಗಿಯುವುದು, ಕುಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ.
6. ದ್ರಾವಣ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಗೂ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿರಿ.

ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಷದ ಪರಿಣಾಮ :

ಜಮೀನಿನ ಎಳತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ವಿಷದ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು :

ತಲೆನೋವು, ತಲೆ ಸುತ್ತುವಿಕೆ, ಹೊಟ್ಟೆತೊಳಸುವುದು, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಳೆತದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ :

1. ದ್ರಾವಣ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ನೇರಿದ್ದಲ್ಲಿ, ರೋಗಿಯು ಮೂರ್ಛಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲದೇ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಿರಿ. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದ, ಒಂದು ಲೋಟಾ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ರೋಗಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಹಿಂಬಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಕಚಗುಳಿ ಕೊಡಿ.
2. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೋಕಿದ್ದಲ್ಲಿ : ತೊಟ್ಟಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾಕಿ, ದ್ರಾವಣ ಸೋಕಿರುವ ದೇಹದ ಭಾಗವನ್ನು, ಸೋಪು ಬಳಸಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
3. ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ : ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಉಪ್ಪು /ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
4. ಉಸಿರಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ : ರೋಗಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಕೂಡಲೆ ಡಾಕ್ಟರರಿಗೆ ಕರೆಕಳುಹಿಸಿರಿ.

ವಿಷನಿವಾರಕ :

ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಪರಿಹಾರಕ ತಿಳಿಯುದು. ರೋಗಿ ಲಕ್ಷಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿರಿ.

ಬಳಸಿದ ಸಂಗ್ರಾಹಕಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ :

1. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಳಿದ ವಸ್ತು (ದ್ರಾವಣ) ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕ ಸಂಗ್ರಹಕಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀರು ಅಥವಾ ಪರಿಸರವು ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗದಂತೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರಿ.
2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಳಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು.
3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು, ಜನವಸತಿಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು.

ಶೇಖರಣೆಯ ರೀತಿ :

1. ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕ ಇರುವ ಸಂಗ್ರಾಹಕಗಳನ್ನು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇರುವ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸದೆ, ಬೇರೆಯದೇ ಆದ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ ದ್ರಾವಣದ ಪರಿಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅದರ ಗುಣಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಅಲ್ಮಿರಾದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇರಿಸ ಬಹುದು.
2. ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುವ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಶಕಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಬೆಳಕಾಜ್ಞ ಬರುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಶುಷ್ಕವಾಗಿ ಆದರೆ ತಂಪಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕವು ಆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ನೇರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಷ್ಟು ಕೊಠಡಿಯು ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು.

ಆತ್ಯುತ್ತಮ ಮರು–ಪ್ರವೇಶ ಅವಕಾಶ: 48 ಗಂಟೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಸಸ್ಯನಾಶಕವನ್ನು ಲೇಬಲ್ / ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

Kannada

ट्राइसाइक्लाजोल 75% डब्ल्यू पी

ट्रिक TM

(व्यवस्थित फंगसनाशक)

ट्राइसाइक्लाजोल 75% डब्ल्यू पी एक व्यवस्थित फंगस नाशक है जो कि सक्रिय उपादान ट्राइसाइक्लाजोल 75% डब्ल्यू /डब्ल्यू आधारित है तथा सन्तुलित एडजूवेन्ट है ।

रासायनिक संयोजन (केमिकल कम्पोजिशन) :

ट्राइसाइक्लाजोल टेकनिकल (न्यूनतम शुद्धता 95% डब्ल्यू/ डब्ल्यू ए.आई)	78.900% डब्ल्यू /डब्ल्यू
सोडियम लिग्नो सल्फोनेट	3.000% डब्ल्यू /डब्ल्यू
सोडियम लिओरिल सल्फोनेट	3.000% डब्ल्यू /डब्ल्यू
हिसिल (सिन्थेटिक हाइड्रेटेड प्रीसिपेटेड सिलिका)	5.000% डब्ल्यू /डब्ल्यू
चायना क्ले	10.100% डब्ल्यू /डब्ल्यू
कुल :	100.000% डब्ल्यू /डब्ल्यू

सिफारिश :

		प्रति हेक्टर खुराक (डोजेजस)				
फसल	रोग का साधारण नाम	ए.आई. (ग्रा./%)	फॉर्मूलेशन (ग्रा.)	पानी में पतला किया गया (लीटर)	प्रतीक्षा का समय पिछले स्प्रे से लेकर फसल तैयार होने तक (दिनों से)
धान	ब्लैस्ट	225-300	300-400	500	30

पौधों की रक्षा के लिए उपकरण :

फ्लैट फैन तथा जेट नॉजल लगे हुए नैपसैक स्प्रेयर्स।

सावधानी :

1. बच्चों से, खाद्य वस्तुएँ, भोजन परोसने के खाली बर्तन एवं पशुओं के खाद्य वस्तुओं से दूर रखें।
2. मुँह, आँख एवं त्वचा के सम्पर्क में न आने दें।
3. स्प्रे के कणों को श्वास द्वारा न लें। हवा की ओर स्प्रे करें।
4. स्प्रे करने के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के हिस्सो को अच्छी तरह से धो लें ।
5. स्प्रे करते वक्त धुम्रपान, किसी तरह का खाना पीना न करें, न चबाएँ ।
6. मिश्रण और स्प्रे करते वक्त सम्पूर्ण रक्षक पोशाक पहनें।

फाइटो टॉक्सिसिटी :

खेतों के लिए सलाह के अनुसार व्यवहार करने पर यह वस्तु फाइटोटोक्सिसिटी नहीं है।

विषक्रिया के लक्षण :

सिर दर्द, चक्कर आना, जी मिचलाना, उल्टी और ऐंठन हो सकते हैं।

फर्स्ट एड की व्यवस्थाएँ :

1. बदहजमी की हालत में व्यक्ति को उल्टी कराना चाहिए, बेहोश की हालत में ऐसा न करें। रोगी को एक बड़ा चम्मच नमक एक ग्लास पानी में मिला कर पिला दें और उसके गले के अन्दर उगलियाँ डाल कर उल्टी कराएँ।
2. त्वचा दूषित होने पर : गन्दे कपड़े उतार दें और प्रभावित शरीर के अंश साबुन लगा कर सावधानी से धो डालें।
3. आँखो में खराबी : पर्याप्त मात्रा में सैलाइन वाटर या साधारण पानी से 10 से 15 मिनट तक आँखों को अच्छी तरह से साफ करें ।
4. साँस लेना : रोगी को ताजे हवा में ले जाएँ और तुरंत डाक्टर को बुलाएँ।

विषघ्न औषधि :

निर्धारित विषघ्न औषधि की जानकारी नहीं है। रोग के लक्षण देखकर इलाज की जाय।

व्यवहृत पात्रों को हटाना :

1. पैकेजेस अथवा व्यवहृत पात्रों के अवशेष पदार्थ और कीटनाशक के धुले कपड़े धोने के बाद जो अवशेष रह जाता है उन्हें तथा पात्रों को इस प्रकार से सुरक्षित रूप से हटा देना चाहिए जिससे कि पर्यावरण और पानी प्रदूषित न हो ।
2. व्यवहृत पैकेजों को इस प्रकार से हटाया जाय जिससे कि उनके दुबारा व्यवहार पर रोकथाम हो।
3. पैकेजों को तोड़ मरोड़ कर उन्हें निवास स्थानों से दूर मिट्टी के अंदर गाढ़ देना चाहिए।

कीटनाशक रखरखाव :

1. फंगसनाशक धारक पैकेजेस ऐसे अलग कमरों या परिसरों में रखने चाहिए जो उन कमरों या परिसरों से दूर में स्थित हों जहाँ पर अन्य विशेषकर खाद्य पदार्थ रखें हो, या फंगसनाशक की मात्रा और प्रकृति के आधारपर उन्हें अलग अलमारी में ताले चाबी बन्द करके रखने चाहिए ।
2. स्टोर कमरे या परिसरों जहाँ पर कीटनाशक रखे जाते है वहाँ पर अच्छी रोशनी होनी चाहिए तथा वह स्थान अच्छी तरह से निर्मित होना चाहिए, सूखा ठंडा हो, हवा का आवागमन और पर्याप्त आवतन युक्त हो जिससे आर्द्रता के कारण वह स्थान दूषित न हो सके।

छिडकाव के 48 घंटे बाद क्षेत्र में प्रवेश करें।

चेतावनी: लेबल/लीफलेट में दी गयी फसलों के अलावा अन्य फसलों व कीटों पर इसका उपयोग न करें।

Hindi

Tricyclazole 75% WP

TRIC TM

(Systemic Fungicide)

Tricyclazole 75% WP is a systemic fungicide based on the active ingredient, Tricyclazole 75% w/w and balance adjuvants.

Chemical composition :

Tricyclazole technical (min. purity 95% w/w a.i.)	78.900%w/w
Sodium Lignosulphonate	3.000%w/w
Sodium Leuryl Sulphonate	3.000%w/w
Hisil (synthetic hydrated precipated silica)	5.000%w/w
China Clay	10.100%w/w
Total :	100.000%w/w

Recommendations :

		Dosage per hectare			
Crop	Common name of Disease	a.i. (g/%)	Formu-lation (g)	Dilution in water (Ltrs.)	Waiting period between last spray and harvest (in days)
Paddy	Blast	225-300	300-400	500	30

Plant protection equipment :

Knapsack sprayer fitted with flat fan and jet nozzle.

Precaution :

1. Keep away from children, foodstuffs, empty foodstuff containers and animal food.
2. Avoid contact with mouth, eyes and skin.
3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind.
4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.
6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Phytotoxicity :

The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Symptoms of poisoning :

Headache, giddiness, nausea, vomiting and convulsions may occur.

First Aid measures:

1. In case of ingestion, make the patient vomit, except if person is unconscious. Make the patient drink a glass of water containing one table spoon of salt and tickle the back of the patient's throat with a finger to induce vomiting.
2. Skin contamination : Take off soiled clothing and wash affected parts carefully with soap and water.
3. Eye contamination : Flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes.
4. Inhalation : Remove the patient to fresh air and call physician immediately.

Antidote :

No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal of used container :

1. Used packages or surplus materials and washings of the insecticides and containers shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage conditions :

1. The packages containing the fungicides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly food articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and the nature of the fungicides.
2. The store rooms or premises for storing the insecticides should be well lit, well built, dry, cool, ventilated and of sufficient dimensions, to avoid contamination with vapour.

Optimal re-entry period : 48 hrs.

Caution: Not to be used on Crops other than specified on this Label/Leaflet.

English

Read Instructions Leaflet before use

उपयोग से पहले निर्देश पत्रिका पढ़े।

For Agricultural use only

केवल कृषि उपयोग के लिए

Store in a cool, dry and well ventilated place.

ठंडी, सूखी और अच्छी तरह हवादार जगह में संग्रह करें।

Tricyclazole 75% WP

TRIC TM

Systemic Fungicide

ट्राइसाइक्लाजोल 75% डब्ल्यू पी

ट्रिक TM

(व्यवस्थित फंगसनाशक)

CIR-45,279/2003-Tricyclazole (WP) (237)-100

TRADITION • INNOVATION • TRUSTEESHIP

KRISHI RASAYAN GROUP

SINCE 1966 IN AGROCHEMICALS

Manufactured and Marketed By:

KR Lifesciences Pvt. Ltd.

29, LALA LAJPAT RAI SARANI,

KOLKATA - 700 020, INDIA

E-mail : kr@krishirasayan.com

निर्माता एवं विपणनकर्ता :

केआर लाईफसाईन्सेस प्रा.लि.

29, लाला लाजपत राय सारनी, कोलकाता – 700020

For manufacturing unit address see first three characters of batch no. and see below :

KRR :

Maitapur, P.O. Ranital, Balasore,

Orissa, PIN - 756 111

Mfg. Lic. No. e-Lic/INSECTI/MAN-PP-2

KRK :

Joykrishnapur, P.O. Bonhoogly II

Sonarpur, South 24 Parganas,

West Bengal, PIN - 700 103

Mfg. Lic. No. MPP/ILC/145/K-2

Customer Care Detail :

KR LIFESCIENCES PVT. LTD.

29, Lala Lajpat Rai Sarani, Kolkata - 700 020

Toll Free No. : 18001211800

email : customercare@krishirasayan.com

Not to be used on crops other than specified on this leaflet

DANGEROUS TO RE-USE EMPTY CONTAINERS/PACKAGES